

2024 年公共卫生与预防医学题库

第一部分 单选题(300 题)

1、碘伏属于【单选题】——

- A. 中效消毒剂
- B. 低效消毒剂
- C. 以上都不是
- D. 高效消毒剂 中低效消毒剂

【答案】：A

2、手术间通常保持的温度【单选题】——

- A. 22~26℃
- B. 18~20℃
- C. 22~25℃
- D. 20~22℃ 16~18℃

【答案】：C

3、使用戊二醛达到灭菌的时间是【单选题】——

- A. 6 小时
- B. 2 小时
- C. 10 小时以上
- D. 8 小时以上 4 小时

【答案】：C

4、压力蒸汽灭菌时器械包的重量【单选题】——

- A. 8kg
- B. 7kg
- C. 5kg
- D. 6kg 10kg

【答案】：B

- 5、有关紫外线消毒效果监测下列哪项规定是错误的【单选题】——
- A. 对灯管应用时间、照射累计时间进行记录并签名
 - B. 对紫外线灯管在安装后、使用前应进行强度监测
 - C. 使用中的灯管的强度监测应每个月监测1次
 - D. 新购灯管强度大于 $100 \mu\text{W}/\text{cm}^2$,使用中灯管强度大于 $70 \mu\text{W}/\text{cm}^2$ 为合格灯管 照射前后人工染菌杀灭率达到 99.9%以上为合格灯管

【答案】：C

- 6、对门诊胃镜室使用过的纤维胃镜进行消毒,应该选择的消毒溶液是【单选题】——

- A. 1%氯胺溶液
- B. 5%碘伏
- C. 0.1%苯扎溴铵溶液
- D. 2%碱性戊二醛溶液 0.2%过氧乙酸溶液

【答案】：D

- 7、供应室无菌区【单选题】——

- A. 空气 $\leq 10\text{cfu}/\text{m}^3$,物体表面 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^3$,医护人员手 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$
- B. 空气 $\leq 200\text{cfu}/\text{m}^3$,物体表面 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^3$,医护人员手 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$
- C. 空气 $\leq 500\text{cfu}/\text{m}^3$,物体表面 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^3$,医护人员手 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$
- D. -,物体表面 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^3$,医护人员手 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$ 空气 $\leq 1000\text{cfu}/\text{m}^3$,物体表面 $\leq 8\text{cfu}/\text{cm}^3$,医护人员手 $\leq 8\text{cfu}/\text{cm}^2$?下列各医疗区的细菌学指标是

【答案】：B

- 8、普通手术室医护人员手表面细菌菌落总数卫生标准应【单选题】——

- A. $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$
- B. $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$
- C.

$\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$

D. $\leq 200\text{cfu}/\text{cm}^2$ $\leq 500\text{cfu}/\text{cm}^2$

【答案】：A

9、一级医院【单选题】——

A. 医院感染发生率 $\leq 8\%$

B. 切口感染率 $\leq 0.5\%$

C. 两者均是

D. 两者均不是

【答案】：D

10、治疗室的管理中下列哪项是错误的【单选题】——

A. 注射治疗时要铺无菌盘,抽出的药液存放不能超过2小时

B. 治疗室中开启的各种溶酶不能超过24小时

C. 治疗室中开启的无菌溶液需在4小时内使用

D. 碘酒、乙醇瓶应保持密闭,每周更换并灭菌容器1~2次
经消毒后的棉球、纱布包,一经打开,保存时间不能超过48小时

【答案】：E

11、血液-体液隔离应用的标志是【单选题】——

A. 红色标志

B. 棕色标志

C. 黄色标志

D. 绿色标志 灰色标志

【答案】：A

12、对一次性卫生用品、消毒药械的购置查检许可证,对其抽检进行细菌学检查【单选题】——

A. 卫生部医政司医院感染管理委员会

B. 省市卫生行政部门医院感染管理委员会

C. 医院的医院感染管理委员会

D. 医院感染管理科 临床科室以下各项工作是哪个部门的职

责

【答案】：D

13、下列关于交叉感染描述正确的是【单选题】——

- A. 在诊疗过程中,由于器械消毒不严或制剂不纯引起的感染
- B. 病人在家中已发生的感染
- C. 病人入院时已处于另一种传染病的潜伏期,入院后发病,并传给其他病人
- D. 病原体来源于病人本身的感染 病人与医生及其他病人通过直接或间接传播引起的感染

【答案】：E

14、医院内最多见的多重耐药菌株是【单选题】——

- A. 耐甲氧西林/苯唑西林的金黄葡萄球菌(MRSA)
- B. 耐万古霉素肠球菌(VRE)
- C. 耐万古霉素金黄葡萄球菌(VRSA)
- D. 产超广谱酶大肠埃希菌 耐青霉素的肺炎链球菌

【答案】：A

15、有关医院感染预防与控制的概念,错误的是:【单选题】——

- A. 外源性感染是可以预防的
- B. 洗手是预防医院感染的重要措施
- C. 做好消毒隔离就可杜绝医院感染的发生
- D. 内源性医院感染是难以预防的 滥用抗菌药物可致二重感染

【答案】：C

16、穿过皮肤或黏膜进入无菌组织或器官内部的器材应采用的消毒方式【单选题】——

- A. 杀灭结核杆菌的消毒剂或中、低效消毒剂
- B. 杀灭细菌繁殖体的消毒剂
- C. 应用灭菌剂或高效消毒剂
- D. 灭菌剂或物理、化学灭菌方法 应用物理灭菌方法

【答案】：D

17、输液反应中属于医院感染的是【单选题】——

- A. 由液体或输液通路中的毒素引起的发热
- B. 由于液体被细菌污染引起的发热
- C. 由于输注液体中药物引起的发热
- D. 由于输液管中的内毒素引起的发热 由于输液的血管、导管的感染引起的发热

【答案】： B

18、医院感染最常发生的疾病是【单选题】——

- A. 肠道传染病
- B. 泌尿道感染
- C. 外伤感染
- D. 表皮传染病 呼吸道感染

【答案】： E

19、需要采取血液-体液隔离的疾病是【单选题】——

- A. 肺结核
- B. 艾滋病
- C. 器官移植者
- D. 肺鼠疫 霍乱

【答案】： B

20、肾移植患者应采取【单选题】——

- A. 保护性隔离
- B. 呼吸道隔离
- C. 严密隔离
- D. 消化道隔离 接触隔离

【答案】： A

21、对怀疑医院内感染的病例取标本进行病原体检查,下述描述中错误的是【单选题】——

- A. 在使用抗菌药物前送标本
- B.

为节约经费,应该在抗感染治疗效果不佳时取标本做病原体检查

- C. 采集标本后及时送检
- D. 采集标本时防止污染 接到临床标本后及时正确接种

【答案】： B

22、接触传染病患者后隔离衣应放在【单选题】——

- A. 治疗区,清洁面向外
- B. 走廊,清洁面向外
- C. 走廊,清洁面向内
- D. 办公室,清洁面向外 病室,清洁面向外

【答案】： B

23、取无菌溶液时下列哪项是错误的【单选题】——

- A. 倒溶液时瓶签向下
- B. 用前核对瓶签
- C. 检查药液有无沉淀
- D. 保持瓶盖内面无菌 用后立即盖上

【答案】： A

24、根据我国卫生标准回答以下问题:使用中的消毒剂【单选题】——

- A. 必须无菌
- B. 细菌菌落总数应 $\leq 20\text{cfu/g}$ 或 $\leq 20\text{cfu}/100\text{cm}^2$,致病性微生物不得检出
- C. 细菌菌落总数应 $\leq 200\text{cfu/g}$ 或 $\leq 200\text{cfu}/100\text{cm}^2$,致病性微生物不得检出
- D. 细菌菌落总数应 $\leq 100\text{cfu/mL}$,致病性微生物不得检出 细菌菌落总数应 $\leq 300\text{cfu/mL}$,致病性微生物不得检出

【答案】： D

25、重症监护病房【单选题】——

- A. $\leq 10 \leq 5 \leq 5$
- B. $\leq 200 \leq 5 \leq 5$
- C.

$\leq 500 \leq 10 \leq 10$

D. $= - \leq 15 \leq 15$

【答案】： B

26、下列哪项不是医院感染的特点【单选题】——

- A. 易感人群抵抗力低,病死率高
- B. 医院中流行的菌株大多为多重耐药性
- C. 医院中病原体来源广泛
- D. 在医院感染中人群的病死率很低 在医院内一旦发生感染很容易播散

【答案】： D

27、关于消毒灭菌方法的选择,错误的是【单选题】——

- A. 耐热耐湿的物品首选压力蒸气灭菌法灭菌
- B. 手术器具与物品首选压力蒸气灭菌法灭菌
- C. 消毒首选物理方法,不能用物理方法消毒时选择化学消毒方法消毒
- D. 不耐热的物品如各种导管、精密仪器、人工移植物可以选择化学灭菌方法,如环氧乙烷灭菌 化学灭菌剂浸泡灭菌方便实用,应加以推广

【答案】： E

28、下列哪项不是医院感染病原学的特点【单选题】——

- A. 细菌是最常见的病原体,细菌的种类和分布因感染类型、医院类别、患者具体情况和治疗措施不同
- B. 目前以革兰阴性杆菌为主,如肠杆菌和非发酵菌,这些细菌常有耐药性
- C. 近年来随着抗生素的大量使用,革兰阳性球菌感染,特别是耐甲氧西林金黄色葡萄球菌感染、凝固酶阴性葡萄球菌感染正在增加
- D. 厌氧菌和深部真菌是机体正常菌群常引起内源性感染 真菌感染正在减少

【答案】： E

29、关于医院内感染的概念,错误的是【单选题】——

- A. 医院内感染是指在医院内获得的感染
- B. 与上次住院有关的感染是医院内感染
- C. 出院之后发生的感染可能不是医院内感染
- D. 入院时处于潜伏期的感染一定不是医院内感染
婴幼儿经胎盘获得的感染是医院内感染

【答案】： E

30、对患者或怀疑患者传染病的产妇用过的一次性用品及胎盘必须【单选题】——

- A. 放入黄色塑料袋内,密闭运送,无害化处理
- B. 放入红色塑料袋内,密封后丢弃
- C. 放入黑色塑料袋内,按垃圾处理
- D. 放入黑色塑料袋内,密闭运送,无害化处理
放入白色塑料袋内,标记处理

【答案】： A

31、普通病房物体表面细菌菌落总数卫生标准应【单选题】——

- A. $\leq 500\text{cfu}/\text{cm}^2$
- B. $\leq 200\text{cfu}/\text{cm}^2$
- C. $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$
- D. $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$ $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$

【答案】： D

32、护理人员为术前清洁洗肠准备所需肛管,采取煮沸消毒法,以下那项不正确【单选题】——

- A. 肛管腔内注水,用纱布包好
- B. 在沸水中持续煮沸 10min 以上
- C. 冷水时即放入计时
- D. 水沸后开始计时 先将肛管洗刷干净

【答案】： C

33、关于刷手的注意事项,其中正确的是【单选题】——

- A. 手刷 48 小时高压消毒 1 次
- B. 刷手的时间为 4 分钟
- C. 手刷放在洗手盆中
- D. 肥皂液每日更换 1 次 刷洗的范围限于被污染的部位

【答案】： D

34、有关内镜消毒下列哪项是错误的【单选题】——

- A. 腹腔镜用环氧乙烷消毒
- B. 消化内镜用 500×10^{-6} 有效氯的含氯消毒剂消毒
- C. 直肠镜采用高压灭菌
- D. 内镜活检钳使用过频时,采用 2%戊二醛消毒 45 分钟 磷
苯二甲醛消毒内镜 5 分钟可灭菌

【答案】： B

35、取无菌溶液时,先倒去少量溶液的的目的是【单选题】——

- A. 冲洗瓶口
- B. 练习操作,以便从原处倒出
- C. 减少瓶内溶液
- D. 检查液体是否清亮 检查瓶口是否有裂缝

【答案】： A

36、低效消毒剂【单选题】——

- A. 0.5%碘伏
- B. 2%戊二醛
- C. 两者均是
- D. 两者均否

【答案】： D

37、在我国医院内感染中,病人最常发生感染的部位是【单选题】——

- A. 泌尿道
- B. 外科切口
- C.

血液

D. 呼吸道 胃肠道

【答案】：D

38、有关抗生素管理下列哪项错误【单选题】——

A. 把抗菌药物分成一线、二线药物,二线药物应控制使用

B. 二线药物毒副作用大、价贵、疗效低

C. 在同类抗生素中应留有替代性药,在必要时再启用

D. 无药敏结果参考时,可按经验选药原则用药 定期全院菌株的
药敏统计结果公布,为临床用药与药剂科进药提供信息

【答案】：B

39、关于医院感染的概念错误的是:【单选题】——

A. 入院时处于潜伏期的感染不是医院感染

B. 医院感染是指在医院内获得的感染

C. 慢性感染急性发作是医院感染

D. 与上次住院有关的感染是医院感染 婴幼儿经胎盘获得的
感染不是医院感染

【答案】：C

40、避污纸的正确使用方法为【单选题】——

A. 污染的手取避污纸可掀页撕取

B. 从页面抓取

C. 随便撕取

D. 掀开页面抓取第一页 清洁手取避污纸需他人传递

【答案】：B

41、AFB 隔离指的是【单选题】——

A. 空气隔离

B. 接触隔离

C. 结核菌(病)隔离

D. 严密隔离 血液-体液隔离

【答案】：C

42、用紫外线灯做空气消毒时有效距离为【单选题】——

- A. <3.5m
- B. <4m
- C. <2m
- D. <3m <2.5m

【答案】：C

43、在医院中幽门螺杆菌的传播以下列哪种方式最多见【单选题】——

- A. 空气传播
- B. 接触传播
- C. 血液传播
- D. 唾沫传播 内镜操作传播

【答案】：E

44、根据我国卫生标准回答:进行医院内感染管理的策略研究,为国家提供咨询意见的应是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：A

45、张某,大面积烧伤病人,创面出现铜绿假单胞菌感染,创面换药后敷料的正确处理方法为【单选题】——

- A. 扔入污物桶
- B. 焚烧
- C. 清洗后放日光下曝晒
- D. 清洗后再消毒 灭菌后再清洗

【答案】：B

46、一次性使用无菌医疗用品用后的处理正确的是【单选题】——

- A.

进行消毒、毁形、进行无害化处理

- B. 经消毒灭菌后重复使用
- C. 集中管理,统一交废品公司回收利用
- D. 经管理部门统一进行消毒处理后可重复使用 先浸泡,再清洗,然后再进行灭菌处理

【答案】： A

47、B-D 试验只适用于【单选题】——

- A. 下排气压力蒸汽灭菌器检测
- B. 预真空压力蒸汽灭菌器监测
- C. 流动蒸汽灭菌器的监测
- D. 环氧乙烷灭菌器的监测 化学消毒液浸泡消毒时

【答案】： B

48、下列内镜需灭菌,但除外【单选题】——

- A. 纤维支气管镜
- B. 腹腔镜
- C. 脑室镜
- D. 关节镜 胸腔镜

【答案】： A

49、为预防医院感染的发生新生儿病房每张床位占地面积不应少于【单选题】——

- A. 5m²
- B. 4m²
- C. 3m²
- D. 2m² 1m²

【答案】： C

50、术前皮肤消毒应由【单选题】——

- A. 巡回护士完成
- B. 未洗手的手术医生完成
- C.

手术护士完成

D. 已洗手的手术医生完成 麻醉医生完成

【答案】：D

51、关于锐器伤后的预防措施,错误的是【单选题】——

A. 如不慎发生锐器伤,应立即采取相应的保护措施,清创、对创面进行严格消毒处理

B. 对发生锐器伤者进行血源性疾病的检查和随访

C. 被 HBV 阳性病人血液、体液污染锐器刺伤,应在 1 周内注射乙型肝炎高效价免疫球蛋白

D. 被 HBV 阳性病人血液、体液污染的锐器刺伤,应及时进行血液乙肝标志物检查 被 HBV 阳性病人血液、体液、污染锐器刺伤,血液乙肝标志物阴性者按规定接种乙肝疫苗

【答案】：C

52、高效消毒剂是【单选题】——

A. 醋酸氯己定

B. 新洁尔灭

C. 两者均是

D. 两者均否

【答案】：D

53、下述哪项不属于微生物【单选题】——

A. 病毒

B. 支原体

C. 细菌

D. 衣原体 钩虫

【答案】：E

54、无菌盘铺好后有效期不超过【单选题】——

A. 8h

B. 2h

C.

16h

D. 12h 4h

【答案】：E

55、我国艾滋病最常见的传播途径是【单选题】——

A. 输血和血制品

B. 静脉注射毒品

C. 母婴垂直传播

D. 性传播 儿童疫苗注射

【答案】：B

56、当被沾有 HBsAg 阳性血的针头刺伤时,立即应做的主要处理是【单选题】——

A. 伤口立即涂以碘酊

B. 给受伤者立即注射丙种球蛋白

C. 受伤者立即抽血作乙型肝炎病毒全套抗原抗体检测

D. 乙型肝炎病毒高价免疫血清注射 乙型肝炎病毒疫苗注射

【答案】：D

57、下列消毒剂中属中效消毒剂的是【单选题】——

A. 戊二醛

B. 过氧乙酸

C. 氯己定

D. 臭氧 碘伏

【答案】：E

58、传染病院应设置在【单选题】——

A. 靠近综合性医院

B. 城市中心

C. 远离公共场所

D. 交通便利的地方 水源充足的地方

【答案】：C

59、下列细菌是目前医院感染常见的细菌,但除外【单选题】——

- A. 葡萄球菌特别是金黄色葡萄球菌和凝固酶阴性葡萄球菌
- B. 大肠埃希菌
- C. 沙门菌
- D. 铜绿假单胞菌 克雷伯肺炎杆菌

【答案】：C

60、标准预防针对体内物质的隔离预防不包括【单选题】——

- A. 血液
- B. 体液
- C. 汗液
- D. 排泄物 分泌物

【答案】：C

61、HICPAC 隔离预防指南第一部分最重要,主要是指对所有患者均实施

【单选题】——

- A. 基础预防
- B. 标准预防
- C. 接触隔离
- D. 空气隔离 飞沫隔离

【答案】：B

62、手术室的医院感染管理错误的是【单选题】——

- A. 手术器具及物品能压力蒸汽灭菌的应避免使用化学灭菌剂浸泡灭菌
- B. 洗手刷应一用一灭菌
- C. 隔离手术间应远离手术室入口处
- D. 隔离病人手术术后器械及物品双消毒 手术室必须湿式清洁

【答案】：C

63、外科刷手时间每次【单选题】——

- A. 3 分钟以上
- B.

1 分钟以上

C. 2 分钟以上

D. 5 分钟以上 4 分钟以上

【答案】：A

64、I 类、II 类区域工作人员卫生手及物体表面的合格标准为【单选题】——

A. 细菌总数 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$, 未检出致病菌

B. 细菌总数 $\leq 20\text{cfu}/\text{cm}^2$, 未检出致病菌

C. 细菌总数 $\leq 25\text{cfu}/\text{cm}^2$, 未检出致病菌

D. 细菌总数 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$, 未检出致病菌 细菌总数 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$, 未检出致病菌

【答案】：D

65、传染病院应设置在下列哪个地方【单选题】——

A. 远离公共场所

B. 交通便利的地方

C. 城市中心

D. 靠近综合性医院 水源充足的地方

【答案】：A

66、需要采取肠道隔离的疾病是【单选题】——

A. 肺结核

B. 艾滋病

C. 器官移植者

D. 肺鼠疫 霍乱

【答案】：E

67、免疫功能低下病人的医院感染预防,下列哪项错误【单选题】——

A. 保护皮肤粘膜的完整性

B. 广谱抗生素肠道预防感染

C. 保护性隔离

D. 治疗局部感染病灶 疫苗注射

【答案】：B

68、保管无菌物品哪项是错误的【单选题】——

- A. 无菌物品应放在清洁干燥、固定的地方
- B. 取出的无菌物品不得放回无菌容器内
- C. 无菌包必须注明灭菌日期
- D. 无菌物与非无菌物应分别放置 已启用的无菌包,48h 后必须重新灭菌

【答案】：E

69、下列隔离操作中哪项是错误的【单选题】——

- A. 操作过程中应用手扶好露出鼻部的口罩
- B. 用避污纸打开床旁桌上的瓶塞灌开水
- C. 测脉搏时持手表放入塑料袋内
- D. 用避污纸取回病人用过的药杯 用过的体温表放于消毒液中

【答案】：A

70、下列哪种情况属于医院感染【单选题】——

- A. 烧伤创面培养出金黄色葡萄球菌
- B. 经产道感染的乙型肝炎
- C. 红霉素静脉滴注后发生静脉炎;拔出的导管在血平皿上滚动培养,细菌菌落数 8 个
- D. 羊肠线吸收不佳的炎症反应 入院后 5 天发生的甲型肝炎

【答案】：B

71、灭菌速度快、灭菌效果好、经济、环境污染小的灭菌方法是【单选题】——

- A. 环氧乙烷灭菌法
- B. 戊二醛浸泡灭菌法
- C. 辐射灭菌法
- D. 过氧乙酸浸泡灭菌法 压力蒸汽灭菌法

【答案】：E

72、医源性感染【单选题】——

- A. 病原体来源于病人本身的感染
- B. 在诊疗过程中,由于器械消毒不严或制剂不纯引起的感染
- C. 病人与医生及其他病人通过直接或间接传播引起的感染
- D. 病人入院时已处于另一种传染病的潜伏期,入院后发病,并传给其他病人 病人在家中已发生的感染

【答案】： B

73、医疗废物【单选题】——

- A. 使用过的注射针头
- B. 带血的敷料
- C. 两者均是
- D. 两者均否

【答案】： C

74、密闭式潴留导尿系统引起感染的危险因素中,哪一项最常见【单选题】——

- A. 潴留导尿持续 1 周
- B. 集尿袋位处膀胱水平之上
- C. 抗生素膀胱冲洗
- D. 集尿管扭结或阻塞 密闭系统的接头反复打开

【答案】： E

75、下列不属于内源性感染情况的是【单选题】——

- A. 寄居部位的改变
- B. 宿主的局部或全身免疫功能下降
- C. 菌群失调和二重感染
- D. 通过空气或水源的感染 潜在感染活化:如疱疹病毒、结核等

【答案】： D

76、医务人员发生艾滋病职业暴露后预防性用药最迟不得超过【单选题】——

- A. 72h
- B. 48h
- C. 24h
- D. 12h 4h

【答案】：D

77、关于洗手指征,下述哪项是错误的【单选题】——

- A. 接触病人前后
- B. 进行无菌技术操作前后
- C. 戴口罩和穿、脱隔离衣前后
- D. 接触血液、体液和被污染的物品前后 脱手套后无须洗手

【答案】：E

78、根据我国下列卫生标准回答:监督、指导医务人员严格执行无菌技术操作规程,合理应用抗感染药,实施对一次性医疗用品的管理等有关医院内感染管理的制度的是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：E

79、根据我国卫生标准回答以下问题:接触皮肤的医疗用品【单选题】——

- A. 必须无菌
- B. 细菌菌落总数应 $\leq 20\text{cfu/g}$ 或 $\leq 20\text{cfu}/100\text{cm}^2$,致病性微生物不得检出
- C. 细菌菌落总数应 $\leq 200\text{cfu/g}$ 或 $\leq 200\text{cfu}/100\text{cm}^2$,致病性微生物不得检出
- D. 细菌菌落总数应 $\leq 100\text{cfu/mL}$,致病性微生物不得检出 细

菌菌落总数应 $\leq 300\text{cfu/mL}$,致病性微生物不得检出

【答案】： C

80、患者出院后,需将其用过的被褥在阳光下曝晒 6 小时,可达到哪种效果【单选题】——

- A. 隔离
- B. 清洁
- C. 灭菌
- D. 灭虱 消毒

【答案】：E

81、进行医院感染管理的策略研究,为卫生部提供咨询意见【单选题】——

- A. 卫生部医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：A

82、经血液、体液传播的病原体不包括【单选题】——

- A. 乙型肝炎病毒
- B. 丙型肝炎病毒
- C. 人类免疫缺陷病毒
- D. 麻疹病毒 疟原虫

【答案】：D

83、治疗室的管理中下列哪项错误【单选题】——

- A. 注射、治疗时,应辅无菌盘,抽出的药液存放不能超过 2 小时
- B. 治疗室中开启的各种溶媒不得超过 24 小时
- C. 治疗室中开启的无菌溶液需要 4 小时内使用
- D. 碘酊、乙醇瓶应保持密闭,每周更换及灭菌 1~2 次 经消毒后的棉球、纱布包,一经打开,保存时间不得超过 48 小时

【答案】：E

84、减少免疫功能低下者发生医院感染的措施不正确的是【单选题】

——

- A. 尽量减少侵入性操作
- B. 大量应用广谱抗菌作用预防感染
- C. 积极发现和治疗局部病灶和潜在性感染
- D. 采取保护性隔离措施,切断感染途径 采用选择性脱污染措施,减少内源性感染

【答案】： B

85、紫外线消毒的有效距离是【单选题】

——

- A. 10m
- B. 2m
- C. 1m
- D. 5m 15m

【答案】： B

86、抗菌药物应用中,下列哪项属错误【单选题】

——

- A. 病毒感染不用抗菌药物
- B. 疑为细菌感染,应先送培养标本而后经验性选药
- C. 培养结果出来,根据其药敏结果调整药物
- D. 当应用抗菌药物 24 小时未见效立即改选其他药物 一般感染抗菌药物用至症状体征消失后 3~4 天

【答案】： D

87、有关医院感染预防与控制的错误概念是【单选题】

——

- A. 洗手是预防医院感染的重要措施
- B. 滥用抗感染药物可致二重感染
- C. 部分医院感染是可以预防的
- D. 内源性医院感染是医院感染的重要原因 医院感染一定是由于消毒隔离缺陷所致

【答案】： E

88、医院必须对消毒、灭菌效果定期进行监测,灭菌合格率必须达到【
单选题】——

A.

0.8

B. 1

C. 0.85

D. 0.95 0.9

【答案】：B

89、取无菌溶液时,下列哪项是错误的【单选题】——

A. 倒溶液时可不顾及瓶签的朝向

B. 用前核对瓶签

C. 保持瓶盖内侧面无菌

D. 用后立即盖上 检查药液是否有沉淀

【答案】：A

90、灭菌速度快、灭菌效果好、经济、环境污染小的是【单选题】——

A. 过氧乙酸浸泡灭菌法

B. 辐射灭菌法

C. 戊二醛浸泡灭菌法

D. 环氧乙烷灭菌法 压力蒸汽灭菌法

【答案】：E

91、李某,以“急性甲型肝炎”收住院治疗,病人正在治疗期间。他要将自己的病情告知外地的家人,他的信件应该怎样处理后方可寄出【单选题】——

A. 含氯消毒液喷雾

B. 甲醛熏蒸柜熏蒸

C. 紫外线照射

D. 过氧乙酸擦拭 高压蒸汽灭菌

【答案】：B

92、妇产科检查室【单选题】——

A. 空气 $\leq 10\text{cfu}/\text{m}^3$,物体表面 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^3$,医护人员手 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$

- B. 空气 $\leq 200\text{cfu}/\text{m}^3$, 物体表面 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^3$, 医护人员手 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$
- C.

空气 $\leq 500\text{cfu}/\text{m}^3$, 物体表面 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^3$, 医护人员手 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$
D. 空气 $\leq 1000\text{cfu}/\text{m}^3$, 物体表面 $\leq 8\text{cfu}/\text{cm}^3$, 医护人员手 $\leq 8\text{cfu}/\text{cm}^2$? 下列各医疗区的细菌学指标是

【答案】： C

93、紫外线灯做空气消毒时,照射时间不少于【单选题】——

- A. 35 分钟
- B. 25 分钟
- C. 15 分钟
- D. 30 分钟 20 分钟

【答案】： D

94、三级综合医院的医院感染管理机构每月发布发生率最高的医院感染性疾病是【单选题】——

- A. 泌尿道感染
- B. 表皮传染病
- C. 呼吸道传染病
- D. 外伤感染 肠道传染病

【答案】： C

95、下列哪种情况属于医院感染:【单选题】——

- A. 皮肤、粘膜的开放性伤口只有细菌定植而无临床症状或体征者
- B. 由损伤而产生的炎症或由非生物因子刺激产生的炎症
- C. 婴儿经胎盘获得的感染,如 CMV、弓形虫病发生在出生后 48 小时以内者
- D. 住院中由于治疗措施而激活的感染 由于输注苏打外渗引起的局部炎症

【答案】： D

96、层流洁净病房【单选题】——

- A. $\leq 10 \leq 5 \leq 5$
- B.

$\leq 200 \leq 5 \leq 5$

C. $\leq 500 \leq 10 \leq 10$

D. $= - \leq 15 \leq 15$

【答案】：A

97、对高压蒸汽灭菌效果的监测,最可靠的方法是【单选题】——

A. 化学指示卡法

B. 生物测试法

C. 化学指示管法

D. 化学指示胶带法 留点温度计法

【答案】：B

98、有关医院内感染预防与控制的概念,错误的是【单选题】——

A. 部分医院内感染是可以预防的

B. 洗手是预防医院内感染的重要措施

C. 医院内感染一定是由于消毒隔离缺陷所致

D. 内源性医院内感染是医院内感染的重要原因 滥用抗菌药物可致二重感染

【答案】：C

99、发现医院感染流行趋势时,医院感染科应在多长时间内报告医院主管领导和主管部门【单选题】——

A. 48h

B. 36h

C. 24h

D. 12h 6h

【答案】：C

100、张某,以“急性甲型肝炎”收住院治疗,病人正在治疗期间。对该病人应做何种隔离【单选题】——

A. 保护性隔离

B. 消化道隔离

C.

严密隔离

D. 昆虫隔离 呼吸道隔离

【答案】：B

101、手术台上器械护士需要增加无菌纱布,巡回护士取用的正确方法是【单选题】——

A. 用消毒的手指拿取纱布

B. 其他都不对

C. 用灭菌换药镊子夹取纱布

D. 戴手套拿取纱布 用无菌持物钳夹取纱布

【答案】：E

102、医院污物的处理原则错误的是【单选题】——

A. 防止污染扩散

B. 分类收集

C. 分别处理

D. 少量医疗垃圾可与生活垃圾一同处理 尽可能采用焚烧处理

【答案】：D

103、对传染性非典型肺炎无效的公众预防措施是【单选题】——

A. 讲究个人卫生

B. 不接触传染性非典型患者或临床诊断患者

C. 在通风不好或人群密集的场所戴口鼻罩

D. 勤洗手 注射丙种球蛋白

【答案】：E

104、某霍乱患者在行严密隔离时,其具体措施不包括【单选题】——

A. 只能在休息日探视

B. 病人住单人病室,门窗关闭,病人不外出

C. 接触病人需戴口罩、帽子,穿隔离衣、裤、鞋

D. 病室每天消毒1次 病人的一切用物应严格消毒处理

【答案】：A

105、手术部位感染的常见诱因【单选题】——

- A. 留置导尿管
- B. 气管切开
- C. 两者均是
- D. 两者均否

【答案】：D

106、对洗衣房的医院感染管理,下列哪项错误【单选题】——

- A. 布局上要求洁、污分区,路线由污到洁,不能逆行
- B. 运送车辆应洁、污分开,浸有血液、体液的布类应置于防水袋内封闭运送
- C. 洗衣房应有定期清洁消毒制度
- D. 各类衣服应分类清洗,感染病人与普通病人的衣物应分开清洗对血污布类应区分其感染性,必要时按感染性布类处理

【答案】：E

107、医院感染管理中,应重点管控的传染来源是【单选题】——

- A. 动物
- B. 血液制品
- C. 各种病人
- D. 食品 病原携带者

【答案】：C

108、内镜室的医院感染管理,下列哪项错误【单选题】——

- A. 内镜室应设检查区和清洗消毒区
- B. 病人进行检查前必须先做肝功能、HBV、HCV等标记物检查
- C. 需要隔离者留于最后作检查
- D. 每例内镜使用后应用高效消毒剂进行消毒处理,每天工作结束后对内镜进行终末消毒 每天清洗消毒容器

【答案】：C

109、下列情况属于医院感染的是【单选题】——

- A.

在皮肤、粘膜开放性伤口只有细菌定植而无临床症状或体征者

- B. 由损伤而产生的炎症或由非生物因子刺激产生的炎性反应
- C. 婴儿经胎盘获得的感染,如 CMV,弓形虫发生在出生后 48 小时以内者
- D. 住院中由于治疗措施而激活的感染 由于输注碳酸氢钠溶液(苏打)外渗引起的局部炎性反应

【答案】： D

110、医院发现一次性使用无菌医疗用品不合格产品或质量可疑产品时,应【单选题】——

- A. 立即停止使用,与供应商联系进行退、换货处理
- B. 立即停止使用,并报告医院管理部门进行退、换货处理
- C. 可继续使用,但应注意密切观察有无不良反应发生
- D. 立即停止使用,并及时报告当地药品监督管理部门,不得自行作退、换货处理 立即停止使用,并及时报告医院管理部门,就地销毁不合格产品

【答案】： D

111、传染病房每间病室的病人数不应超过【单选题】——

- A. 6 人
- B. 5 人
- C. 4 人
- D. 3 人 2 人

【答案】： C

112、判断某传染病患者是否为医院感染引起的主要依据是【单选题】——

- A. 临床症状期
- B. 检查结果
- C. 病程
- D. 潜伏期 传染期

【答案】： D

113、医院工作中洗手指征不正确的是【单选题】——

- A. 在进入和离开病房前洗手
- B. 处理干净的物品前,处理污染的物品后洗手
- C. 在高危病房中接触同一患者的不同部位前、后不必洗手
- D. 与任何患者长时间和密切接触后洗手 护理特殊易感患者前、后及在接触伤口前、后洗手

【答案】：C

114、对于医院感染控制指标描述错误的是【单选题】——

- A. 100~500张病床的医院,一类切口手术部位感染率应低于0.5%
 - B. 100~500张病床的医院,医院感染发病率应低于8%
 - C. 500张病床以上的医院,医院感染发病率应低于10%
 - D. 100张病床以下的医院,一类切口手术部位感染率应低于2%
- 100张病床以下的医院,医院感染发病率应低于7%

【答案】：D

115、根据我国下列卫生标准回答:对医院发生的医院内感染流行、暴发流行进行调查分析,提出控制措施,并组织实施的是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：D

116、关于使用中的灭菌剂的监测正确的是【单选题】——

- A. 生物监测每周一次
- B. 生物监测每天一次
- C. 生物监测不得检出致病微生物
- D. 化学监测每月一次 灭菌后的物品不得检出任何微生物

【答案】：E

117、根据我国下列卫生标准回答:进入组织、器官或接触破损皮肤、黏膜的医疗用品的卫生标准是【单选题】——

- A. 必须无菌
- B. 细菌菌落总数应 $\leq 20\text{cfu/g}$ 或 $\leq 20\text{cfu}/100\text{cm}^2$,致病性微生物不得检出
- C. 细菌菌落总数应 $\leq 200\text{cfu/g}$ 或 $\leq 200\text{cfu}/100\text{cm}^2$,致病性微生物不得检出
- D. 细菌菌落总数应 $\leq 100\text{cfu/mL}$,致病性微生物不得检出 细菌菌落总数应 $\leq 300\text{cfu/mL}$,致病性微生物不得检出

【答案】: A

118、根据我国卫生标准回答以下问题:进行医院内感染管理的策略研究,为国家提供咨询意见的应是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】: A

119、烧伤病房【单选题】——

- A. $\leq 10 \leq 5 \leq 5$
- B. $\leq 200 \leq 5 \leq 5$
- C. $\leq 500 \leq 10 \leq 10$
- D. $=- \leq 15 \leq 15$

【答案】: B

120、做洁净手术间空气培养,培养皿暴露时间【单选题】——

- A. 10 分钟
- B. 20 分钟
- C. 15 分钟
- D. 30 分钟 40 分钟

【答案】: D

121、下列情况不是医院感染【单选题】——

A.

病人发生的感染是上次住院期间获得的

- B. 有明确潜伏期的感染,自入院时计算起。超过其常见潜伏期而发生的感染
- C. 在原有医院感染的基础上又出现其他部位新的感染(除外脓毒症的迁徙病灶)
- D. 没有明确潜伏期的感染,发生在入院 48 小时以后者 新生儿经胎盘获得的感染

【答案】： E

122、属半污染区的区域是【单选题】——

- A. 治疗室. 值班室
- B. 走廊及病区化验室
- C. 配餐室与更衣室
- D. 浴室. 洗涤间 病室及厕所

【答案】： B

123、根据我国卫生标准回答以下问题:接触黏膜的医疗用品【单选题】——

- A. 必须无菌
- B. 细菌菌落总数应 $\leq 20\text{cfu/g}$ 或 $\leq 20\text{cfu}/100\text{cm}^2$,致病性微生物不得检出
- C. 细菌菌落总数应 $\leq 200\text{cfu/g}$ 或 $\leq 200\text{cfu}/100\text{cm}^2$,致病性微生物不得检出
- D. 细菌菌落总数应 $\leq 100\text{cfu/mL}$,致病性微生物不得检出 细菌菌落总数应 $\leq 300\text{cfu/mL}$,致病性微生物不得检出

【答案】： B

124、ICU 的医院感染管理措施错误的是【单选题】——

- A. 探视者进入 ICU 应更衣、换鞋
- B. 工作人员进入 ICU 要穿专用工作服、换鞋、戴帽子、口罩、洗手
- C. ICU 应布局合理,分治疗室(区)和监护区
- D.

病人的安置应感染病人与非感染病人分开,特殊感染病人单独安置
监护区每床使用面积不少于 9.5m²

【答案】：A

125、下列消毒剂中哪一种不能达到灭菌水平【单选题】——

- A. 甲醛
- B. 戊二醛
- C. 含氯消毒剂
- D. 环氧乙烷 过氧化氢

【答案】：C

126、下列情况属于医院感染【单选题】——

- A. 住院中由于治疗措施而激活的感染
- B. 在皮肤.粘膜开放性伤口只有细菌定植而无临床症状或体征者
- C. 婴儿经胎盘获得的感染,如 CMV,弓形虫发生在出生后 48 小时以内者
- D. 由于输注苏打外渗引起的局部炎症 由损伤而产生的炎症或由非生物因子刺激产生的炎症

【答案】：A

127、黏膜消毒可使用下列哪一种药液【单选题】——

- A. 苯扎溴铵(新洁尔灭)
- B. 聚维酮碘(碘伏)
- C. 乙醇
- D. 碘酊 氯己定

【答案】：B

128、胃镜、肠镜、十二指肠镜采用 2%碱性戊二醛消毒浸泡时间应不少于【单选题】——

- A. 10h
- B. 4h
- C. 60min

D. 30min 10min

【答案】： E

129、新生儿重症监护室对每张床位占地面积的要求是不少于一般新生儿床位的【单选题】——

- A. 1 倍
- B. 2 倍
- C. 3 倍
- D. 4 倍 5 倍

【答案】： B

130、和破损皮肤、黏膜相接触，而不进入无菌的组织内的器材【单选题】——

- A. 应用物理灭菌方法
- B. 杀灭细菌繁殖体的消毒剂
- C. 灭菌剂或物理、化学灭菌方法
- D. 杀灭结核杆菌的消毒剂或中、低效消毒剂 应用灭菌剂或高效消毒剂

【答案】： E

131、使用紫外线照射消毒，关灯后至再使用前须间隔【单选题】——

- A. 3~4min
- B. 5~6min
- C. 1~2min
- D. 7~8min 9~10min

【答案】： A

132、传染病区中划分为清洁区的是【单选题】——

- A. 走廊
- B. 洗漱室
- C. 配餐室
- D. 化验室 浴室

【答案】： C

133、目前引起输血后肝炎的主要的肝炎病毒为【单选题】——

- A.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/758002114135006066>