

妇产科学（本）期末复习题

注：可利用查找功能复制部分题干查询对应题目和解析。

查找按键：Ctrl+F

一、单选题（超越高度）

1.以下哪种疾病是多囊卵巢综合征患者的易感疾病()

- A、子宫肌瘤
- B、卵巢肿瘤
- C、子宫颈癌
- D、子宫内膜息肉
- E、子宫内膜癌

正确答案:E

2.月经周期为 40 天的妇女，其排卵日应大约在月经来潮后的（ ）

- A、第 14 天
- B、第 18 天
- C、第 20 天
- D、第 26 天
- E、第 30 天

正确答案:D

3.最易引起出血的子宫肌瘤类型（ ）

- A、肌壁间肌瘤
- B、粘膜下肌瘤
- C、阔韧带肌瘤
- D、浆膜下肌瘤
- E、宫颈肌瘤

正确答案:B

4.患者于吸宫人流手术中，突感胸闷，头晕，血压 70/50mmHg，脉搏 50 次/分，应首先考虑（ ）

- A、心力衰竭
- B、呼吸困难窘迫症
- C、子宫穿孔
- D、人工流产综合反应
- E、卵巢破裂

正确答案:D

5.临产后肛查了解胎头下降程度时，最常用作标记的是()

- A、骶岬
- B、坐骨棘
- C、坐骨结节
- D、耻骨联合后面
- E、以上都不是

正确答案:B

6.下列肿瘤与梅格斯综合症有关的（ ）

- A、子宫肌瘤
- B、输卵管癌

- C、子宫内膜癌
- D、库肯勃瘤
- E、卵巢纤维瘤

正确答案:E

7.胎方位是指()

- A、最先进入骨盆入口的胎儿部分
- B、胎儿先露部的指示点与母体骨盆的关系
- C、胎儿纵轴与母体纵轴的关系
- D、胎儿身体各部分的相互关系
- E、胎儿先露部与胎儿身体各部分的相互关系

正确答案:B

8.月经来潮后，子宫内膜的再生来自（）

- A、致密层
- B、海绵层
- C、基底层
- D、功能层
- E、子宫肌层

正确答案:C

9.治疗中、重度妊高征孕妇，首选的治疗药物是()

- A、降压药
- B、镇静药
- C、解痉药
- D、利尿药
- E、扩容剂

正确答案:C

10.切除子宫送病理，病理提示子宫壁深肌层内见大量异型滋养细胞浸润，并有绒毛结构，应诊断为（）

- A、水泡状胎块
- B、子宫内膜癌
- C、侵蚀性葡萄胎
- D、绒毛膜癌
- E、子宫颈癌

正确答案:C

11.当前认为子宫肌瘤的形成可能与下列哪项因素有关（）

- A、生活环境
- B、心情抑郁
- C、生育过多
- D、接触有害物质
- E、体内雌激素水平过高

正确答案:E

12.女性不孕因素中最常见的病因是()

- A、子宫内膜异位症
- B、无排卵
- C、输卵管因素

- D、宫颈柱状上皮异位
- E、月经不调

正确答案:C

13.下列哪项不是先兆子宫破裂的临床表现（ ）

- A、孕妇烦躁不安
- B、胎心听不清
- C、腹壁下清楚扪及胎体
- D、病理性缩复环
- E、排尿困难

正确答案:C

14.26岁已婚女性，有洁癖，一日两次用冲洗液冲洗阴道，近日感外阴搔痒，分泌物多来诊，下列说法正确的是()

- A、可能的诊断为滴虫性阴道炎
- B、常规化验如未发现异常，可送细菌培养
- C、首选的治疗药物是甲硝唑
- D、应改为一日三次冲洗阴道，以减少细菌生长
- E、应选用制霉菌素治疗

正确答案:E

15.正常分娩最主要的产力()

- A、子宫收缩力
- B、肛提肌收缩力
- C、腹肌收缩力
- D、膈肌收缩力
- E、肋间肌收缩力

正确答案:A

16..产后出血是指胎儿娩出 24 小时内阴道分娩者出血量超过（ ）

- A、200ml
- B、300ml
- C、400ml
- D、500ml
- E、1000ml

正确答案:D

17.怀孕 2 个月出现难免流产，首选的治疗原则是()

- A、注射催产素
- B、保胎
- C、抗生素抗感染
- D、尽快清宫
- E、大量雌激素止血

正确答案:B

18.早期宫颈癌的确诊方法是：（ ）

- A、宫颈活检
- B、碘试验
- C、细胞学检查
- D、阴道镜检查

E、血清学检查

正确答案:A

19.正常产后，子宫在腹内逐日下降，降至真骨盆内所需的时间为：（ ）

- A、产后 6 天
- B、产后 10 天
- C、产后 14 天
- D、产后 18 天
- E、产后 21 天

正确答案:B

20.女性，22 岁，平素月经规律，停经 90 天，近日阴道有少量不规则出血，下腹隐痛，妇科检查见子宫底平脐，未触及胎体，B 型超声子宫腔内为落雪状图像，则应考虑为()

- A、葡萄胎
- B、羊水过多
- C、先兆流产
- D、子宫肉瘤
- E、子宫肌瘤

正确答案:A

21.我国控制人口增长的主要措施是()

- A、人工流产
- B、节育
- C、绝育
- D、综合避孕
- E、引产

正确答案:D

22.妊娠 8 周出现难免流产，首选的治疗原则是：（ ）

- A、注射缩宫素
- B、保胎
- C、抗生素抗感染
- D、尽快清宫
- E、大量雌激素止血

正确答案:D

23.女性，29 岁，停经 42 天阴道少量流血 7 天，吸宫后病理报告为“蜕膜组织”，则首先应考虑为（ ）

- A、异位妊娠
- B、先兆流产
- C、稽留流产
- D、子宫性闭经
- E、月经期子宫内膜

正确答案:A

24.下列属于子宫内膜癌前病变的是()

- A、萎缩型子宫内膜
- B、增生期子宫内膜
- C、子宫内膜单纯性增生

- D、子宫内膜不典型增生
- E、子宫内膜复杂性增生

正确答案:D

25. Bishop 宫颈成熟度评分. 下列哪项应得 2 分()

- A、宫口开大 2cm
- B、宫口位置在前
- C、宫颈管消退 80%
- D、宫颈中等硬度
- E、胎头位置为-2

正确答案:B

26. 子宫内膜异位症最多见的部位是: ()

- A、输卵管
- B、卵巢
- C、宫骶韧带
- D、子宫后壁下段
- E、子宫直肠凹陷

正确答案:B

27. 张女士, 52 岁, 在查体时发现子宫如孕 6 周大小, B 超检查示子宫肌瘤, 目前无明显症状, 最好的处理方法是: ()

- A、子宫全切术
- B、子宫次全切术
- C、雌激素治疗
- D、定期严密随访
- E、孕激素治疗

正确答案:D

28. 性激素对下丘脑垂体的反馈是()

- A、雌激素——负反馈, 孕激素——正反馈
- B、雌激素——正反馈, 孕激素——负反馈
- C、雌激素——负反馈, 孕激素——负反馈
- D、雌激素——正、负反馈, 孕激素——负反馈
- E、雌激素——负反馈, 孕激素——正、负反馈

正确答案:D

29. 维持子宫于正常位置, 主要依靠 ()

- A、子宫的韧带
- B、盆底组织支持
- C、子宫韧带及盆底组织支持
- D、腹肌和盆底肌肉
- E、膀胱、直肠支持

正确答案:A

30. 滴虫性阴道炎最典型的临床表现是 ()

- A、白色豆渣样白带, 外阴奇痒
- B、血性白带, 外阴奇痒难忍
- C、脓性白带, 外阴灼痛

- D、灰黄泡沫样白带，伴外阴痒
- E、黄色白带,外阴不痒

正确答案:D

31.关于输卵管妊娠的病理，以下错误的是()

- A、输卵管妊娠流产多见于8~12周输卵管壶腹部妊娠
- B、输卵管妊娠破裂多见于妊娠6周左右输卵管峡部妊娠
- C、间质部妊娠破裂常发生于孕6~8周
- D、陈旧性宫外孕机化性包块可存在多年，甚至钙化形成石胎
- E、继发性腹腔妊娠的胚胎多数死亡

正确答案:C

32.最常用于诊断卵巢肿瘤的辅助手段为（）

- A、CT检查
- B、磁共振检查
- C、腹腔镜检查
- D、B超
- E、腹部平片检查

正确答案:D

33.绒毛膜癌的治疗，哪项是恰当的()

- A、单纯子宫切除
- B、免疫疗法
- C、广泛性子宫切除+盆腔淋巴结清扫术
- D、单纯中药治疗
- E、以化疗为主手术为辅

正确答案:E

34.王女士，25岁，产后2个月，哺乳期，无月经来潮，应采用何种方式避孕（）

- A、宫内节育器
- B、复方短效口服避孕药
- C、复方长效口服避孕药
- D、阴茎套
- E、探亲避孕药

正确答案:D

35..产后出血病人的护理措施不正确的是：（）

- A、积极查找出血原因
- B、迅速建立静脉通道
- C、因宫缩乏力引起的出血应立即按摩子宫
- D、软产道裂伤者，及时准确修补缝合
- E、胎盘残留者，应作子宫次全切除术

正确答案:E

36.有关产科腹部四步触诊目的，错误的是：（）

- A、第一步了解宫底高度及宫底部是胎头还是胎臀
- B、第二步分辨胎背及胎儿肢体位置
- C、第三步可查清先露是头还是臀
- D、第四步是再一次核对先露及先露入盆程度
- E、还可了解有无胎儿畸形

正确答案:E

37.属于卵巢上皮性肿瘤的是：（ ）

- A、浆液性囊腺瘤
- B、无性细胞瘤
- C、畸胎瘤
- D、颗粒细胞瘤
- E、内胚窦瘤

正确答案:A

38.脐带中动脉有几根（ ）

- A、5
- B、4
- C、3
- D、2
- E、1

正确答案:D

39.子宫肌瘤最常见的变性是()

- A、玻璃样变
- B、囊性变
- C、脂肪样变
- D、红色样变
- E、肉瘤样变

正确答案:A

40.异位妊娠是指()

- A、精卵着床于子宫以外
- B、受精卵着床于子宫+附件以外
- C、受精卵着床于子宫体腔以外
- D、受精卵着床于腹腔以外
- E、受精卵着床于宫颈管以外

正确答案:C

41.妊娠高血压疾病应用硫酸镁治疗时，最早出现中毒反应是()

- A、呼吸减慢
- B、心率减慢
- C、尿量减少
- D、膝反射迟钝或消失
- E.血压下降

正确答案:D

42.人工流产综合反应的发生原因主要是()

- A、疼痛刺激
- B、精神过度紧张
- C、迷走神经兴奋
- D、术中出血过多
- E、吸宫时负压过大

正确答案:C

43.鉴别输卵管妊娠破裂与黄体破裂，最主要是：（ ）

- A、有无停经

- B、彩超检查
- C、后穹窿穿刺
- D、妊娠试验
- E、有无阴道流血

正确答案:D

44.妊娠期母体内分泌系统的变化正确的是()

- A、皮质醇轻度减少
- B、垂体催乳素增多
- C、甲状腺功能低下
- D、腺垂体不增大
- E、促黑素细胞刺激激素减少

正确答案:B

45.下列哪项与痛经无关()

- A、子宫内膜异位症
- B、子宫腺肌病
- C、无排卵性功能失调性子宫出血
- D、子宫颈管狭窄
- E、卵巢子宫内膜异位囊肿

正确答案:C

46.不全流产有活动性出血伴休克，应如何处理（）

- A、立即清宫
- B、一边纠正休克一边清宫
- C、输血纠正休克
- D、抗感染
- E、肌注缩宫素，促使残留排出

正确答案:B

47.有关葡萄胎病人的护理，不正确的是：（）

- A、一经确诊，应尽快清宫
- B、必要时行二次刮宫
- C、宫腔内刮出物检查
- D、术后严密随访至妊娠试验阴性为止
- E、嘱病人术后可靠避孕1年

正确答案:D

48.下列哪项不是急性生殖器官炎症后病变（）

- A、输卵管积液
- B、慢性盆腔炎
- C、慢性输卵管卵巢炎
- D、慢性盆腔结缔组织炎
- E、卵巢巧克力囊肿

正确答案:E

49.无排卵型功血（）

- A、经前诊断性刮宫子宫内膜呈分泌不良
- B、子宫内膜为蜕膜
- C、经前诊断性刮宫呈分泌型

- D、经前诊断性刮宫呈增生型
- E、经期内刮宫为混合型

正确答案:D

50.能使子宫内膜产生增生期改变的激素是()

- A、孕激素
- B、雄激素
- C、雌激素
- D、绒毛膜促性腺激素
- E、生乳素

正确答案:C

51.有关分娩的临床经过,叙述错误的是: ()

- A、规律宫缩由弱到强
- B、宫口扩张分潜伏期和活跃期
- C、胎膜多在临产前破裂
- D、活跃期平均 4 小时
- E、潜伏期约需 8 小时

正确答案:C

52.心脏病孕妇容易发生心衰的时期是()

- A、妊娠 28-30 周
- B、妊娠 24-26 周
- C、妊娠 20-22 周
- D、妊娠 32-34 周
- E、妊娠 36-38 周

正确答案:D

53.子宫肌瘤的症状与下列哪项关系最密切()

- A、肌瘤大小
- B、患者年龄
- C、肌瘤生长部位
- D、肌瘤有无玻璃样变
- E、肌瘤数目

正确答案:C

54.子宫肌瘤发生红色样变常见于()

- A、妊娠期
- B、生育期
- C、月经期
- D、绝经前期
- E、红斑狼疮治疗期

正确答案:A

55.产后出血原因当中,下列哪项首先考虑以切除子宫止血()

- A、宫缩乏力
- B、胎盘嵌顿
- C、胎盘植入
- D、胎盘粘连
- E、凝血功能障碍

正确答案:C

二、多选题 ()

1.下列哪项与羊水栓塞的诊断有关 ()

- A、分娩时出现典型的临床表现
- B、抽取下腔静脉血镜检有无羊水成分
- C、胸部 X 平片了解肺部情况
- D、ECG 检查
- E、纤溶全套检查

正确答案: A,B,C,D,E

2.无排卵功血属于()

- A、雌激素撤退出血
- B、孕激素撤退出血
- C、雌激素突破出血
- D、孕激素突破出血
- E、雌孕激素撤退出血

正确答案: A,C

3.估计胎儿体重在 3200~3500g 之间, 需剖宫产的是()

- A、均小骨盆
- B、宫颈水肿
- C、骨盆坐骨结节间径+出口后矢状径=13.5cm
- D、骨盆入口平面绝对性狭窄
- E、中骨盆狭窄

正确答案: A,C,D,E

4.关于子宫肌肉的排列, 哪些是正确的 ()

- A、外层为纵行
- B、外层为环行
- C、中间层为斜行
- D、中间层各方交织
- E、内层为环形

正确答案: A,D,E

5.产后 2 小时在产房观察 ()

- A、阴道流血
- B、血压
- C、脉搏
- D、子宫高度
- E、膀胱是否充盈

正确答案: A,B,C,D,E

三、判断 ()

1.骨盆出口平面狭窄不宜阴道分娩。 ()

正确答案: 正确

2.孕激素对下丘脑产生正负反馈作用。 ()

正确答案: 错误

3.高危妊娠孕妇卧床休息时取左侧卧位为宜 ()

正确答案: 正确

- 4.骨盆是由骶骨、尾骨和左右两块髋骨构成。（ ）
正确答案:正确
- 5.避孕药物的类早孕反应是因孕激素刺激胃黏膜引起。（ ）
正确答案:错误
- 6.妊高征患者使用镇静药为了达到较好效果首选冬眠合剂。（ ）
正确答案:错误
- 7.绒毛膜癌最常见的转移方式是血行转移。（ ）
正确答案:正确
- 8.乙肝表面抗原阳性的产妇产后禁止哺乳。（ ）
正确答案:错误
- 9.前置胎盘的孕妇在控制出血后尽可能让其阴道分娩。（ ）
正确答案:错误
- 10.妊娠高血压综合征发生抽搐是因为病人颅内血管病变（ ）
正确答案:错误
- 11.羊水能通过形成前羊水囊，而加速产程的进展。（ ）
正确答案:正确
- 12.NST 反应阳性代表胎儿宫内缺氧。（ ）
正确答案:错误
- 13.避孕药物的类早孕反应是因孕激素刺激胃黏膜引起。（ ）
正确答案:错误
- 14.肩难产只会见于巨大儿。（ ）
正确答案:错误
- 15.决定骨盆入口平面大小的主要径线是坐骨棘间径。（ ）
正确答案:错误

妇产科学（本）期末复习题

一、单选题（ ）

- 1.张女士，52岁，在查体时发现子宫如孕6周大小，B超检查示子宫肌瘤，目前无明显症状，最好的处理方法是：（ ）
A、子宫全切术
B、子宫次全切术
C、雌激素治疗
D、定期严密随访
E、孕激素治疗
正确答案:D
- 2.当前认为子宫肌瘤的形成可能与下列哪项因素有关（ ）
A、生活环境
B、心情抑郁
C、生育过多
D、接触有害物质
E、体内雌激素水平过高
正确答案:E

3.月经周期为 40 天的妇女，其排卵日应大约在月经来潮后的（ ）

- A、第 14 天
- B、第 18 天
- C、第 20 天
- D、第 26 天
- E、第 30 天

正确答案:D

4.孕妇于妊娠几周开始自觉胎动()

- A、6~8 周
- B、9~10 周
- C、10~12 周
- D、13~16 周
- E、18~20 周

正确答案:E

5.以下哪种疾病是多囊卵巢综合征患者的易感疾病()

- A、子宫肌瘤
- B、卵巢肿瘤
- C、子宫颈癌
- D、子宫内膜息肉
- E、子宫内膜癌

正确答案:E

6.王女士，32 岁，葡萄胎清宫术后，护士应该指导其避孕方法，不推荐的是：（ ）

- A、宫内节育器
- B、口服避孕药
- C、针剂避孕药
- D、避孕套
- E、皮下埋植法避孕

正确答案:A

7.一女性，月经周期为 40 天，则其排卵大概在月经周期的（ ）

- A、第 23 天
- B、第 24 天
- C、第 25 天
- D、第 26 天
- E、第 27 天

正确答案:D

8.卵巢上皮癌最常用的化疗药物（ ）

- A、环磷酰胺
- B、顺铂
- C、丝裂霉素
- D、5-氟尿嘧啶
- E、氨甲喋呤

正确答案:B

9.子宫肌瘤最常见的变性是()

- A、玻璃样变

- B、囊性变
- C、脂肪样变
- D、红色样变
- E、肉瘤样变

正确答案:A

10.女性，32岁，婚后5年一直未孕，进行性痛经8年，妇科检查见子宫后倾，固定，后壁能及两黄豆大小的痛性结节，右侧附件区扪及两个直径约为2cm的囊性包块，左例附件区组织略增厚，应考虑为()

- A、慢性输卵管炎
- B、慢性盆腔炎
- C、子宫内膜异位症
- D、双侧附件炎
- E、卵巢囊肿

正确答案:C

11.胎儿娩出不久，产妇突然出现烦躁不安、呛咳、呼吸困难、发绀、心率快而弱，此时应考虑疾病是()

- A、产后循环衰竭
- B、先兆子痫
- C、羊水栓塞
- D、脑血管意外
- E、产后出血

正确答案:C

12.关于女性生殖道的自然防御错误的是：（）

- A、阴道紧闭
- B、月经周期性来潮
- C、大小阴唇闭合
- D、阴道内无菌
- E、阴道有自洁作用

正确答案:D

13.子宫内膜异位症最多见的部位是：（）

- A、输卵管
- B、卵巢
- C、宫骶韧带
- D、子宫后壁下段
- E、子宫直肠凹陷

正确答案:B

14.关于子宫乏力性产后出血，首选的处理是()

- A、按摩子宫，注射宫缩剂
- B、子宫腔填塞纱布
- C、双手压迫按摩子宫
- D、压迫腹主动脉
- E、动脉栓塞

正确答案:A

15.恶性卵巢肿瘤的主要治疗手段为()

- A、手术治疗
- B、手术加化疗
- C、放疗
- D、化疗
- E、手术加免疫治疗

正确答案:B

16.下列哪项不是先兆子宫破裂的临床表现（ ）

- A、孕妇烦躁不安
- B、胎心听不清
- C、腹壁下清楚扪及胎体
- D、病理性缩复环
- E、排尿困难

正确答案:C

17.妊娠期高血压疾病的基本病理生理变化是()

- A、肾小管重吸收增加
- B、血中尿酸增加
- C、全身小血管痉挛
- D、尿蛋白阳性
- E、低血容量

正确答案:C

18.宫内节育器避孕原理，下述哪项是错误的()

- A、通过异物的局部效应发挥作用
- B、节育器刺激内膜产生前列腺素，影响孕卵着床
- C、机械作用，阻止孕卵着床
- D、节育器通过抑制下丘脑—垂体—卵巢轴起作用
- E、无菌性炎症反应

正确答案:D

19..陈女士，35岁，因下肢骨折感染应用抗生素12天，出现外阴瘙痒、阴道分泌物增多呈豆渣样，该病人最可能患的疾病是：（ ）

- A、萎缩性阴道炎
- B、外阴阴道假丝酵母菌病
- C、滴虫阴道炎
- D、慢性宫颈炎
- E、细菌性阴道病

正确答案:B

20.女性，55岁，左下腹肿块1年，最近增长迅速，伴有腹胀便秘等症状，盆腔B超提示附件区囊实性物件伴大量腹水，最先考虑的诊断是()

- A、浆膜下子宫肌瘤
- B、卵巢恶性肿瘤
- C、盆腔结核
- D、肝硬化
- E、盆腔炎症

正确答案:B

21..产后出血是指胎儿娩出24小时内阴道分娩者出血量超过（ ）

- A、 200ml
- B、 300ml
- C、 400ml
- D、 500ml
- E、 1000ml

正确答案:D

22.临产的标志不包括以下哪项 ()

- A、 规律宫缩
- B、 宫口扩张
- C、 宫颈管消失
- D、 胎先露下降
- E、 见红

正确答案:E

23.胎方位是指()

- A、 最先进入骨盆入口的胎儿部分
- B、 胎儿先露部的指示点与母体骨盆的关系
- C、 胎儿纵轴与母体纵轴的关系
- D、 胎儿身体各部分的相互关系
- E、 胎儿先露部与胎儿身体各部分的相互关系

正确答案:B

24.女性, 29 岁, 停经 42 天阴道少量流血 7 天, 吸宫后病理报告为“蜕膜组织”, 则首先应考虑为 ()

- A、 异位妊娠
- B、 先兆流产
- C、 稽留流产
- D、 子宫性闭经
- E、 月经期子宫内膜

正确答案:A

25.原发性输卵管癌好发于()

- A、 伞部
- B、 峡部
- C、 间质部
- D、 壶腹部
- E、 峡部与壶腹交接部

正确答案:D

26.葡萄胎的处理哪项是错误的 ()

- A、 一旦确诊, 应尽快清宫
- B、 清宫后立即行化疗
- C、 若有残留, 需行二次清宫
- D、 取近子宫壁刮出物送病理
- E、 以上都不是

正确答案:B

27.一女性月经中期出现一侧下腹部疼痛, 查尿妊娠试验阴性, 彩超提示腹腔内大量积液, 考虑下列哪种疾病 ()

- A、急性盆腔炎
- B、急性阑尾炎
- C、宫外孕
- D、卵巢巧克力囊肿
- E、黄体破裂

正确答案:E

28.下列属于子宫内膜癌前病变的是()

- A、萎缩型子宫内膜
- B、增生期子宫内膜
- C、子宫内膜单纯性增生
- D、子宫内膜不典型增生
- E、子宫内膜复杂性增生

正确答案:D

29.子宫肌瘤发生红色样变常见于()

- A、妊娠期
- B、生育期
- C、月经期
- D、绝经前期
- E、红斑狼疮治疗期

正确答案:A

30.用电子监护仪测胎心率，提示胎儿缺氧的指标是：（ ）

- A、晚期减速
- B、变异的频率 ≥ 6 次/分
- C、早期减速
- D、变异减速
- E、胎心率的波动范围在10~25次/分

正确答案:A

31.鉴别输卵管妊娠破裂与黄体破裂，最主要是：（ ）

- A、有无停经
- B、彩超检查
- C、后穹窿穿刺
- D、妊娠试验
- E、有无阴道流血

正确答案:D

32.王女士，25岁，产后2个月，哺乳期，无月经来潮，应采用何种方式避孕（ ）

- A、宫内节育器
- B、复方短效口服避孕药
- C、复方长效口服避孕药
- D、阴茎套
- E、探亲避孕药

正确答案:D

33.绒癌与侵蚀性葡萄胎的主要鉴别依据是()

- A、尿HCG阳性
- B、X线胸片有棉团状阴影

- C、不规则阴道流血
- D、阴道有紫蓝色转移结节
- E、病理检查：无绒毛结构

正确答案:E

34.滴虫性阴道炎最典型的临床表现是 ()

- A、白色豆渣样白带，外阴奇痒
- B、血性白带，外阴奇痒难忍
- C、脓性白带，外阴灼痛
- D、灰黄泡沫样白带，伴外阴痒
- E、黄色白带,外阴不痒

正确答案:D

35.最常用于诊断卵巢肿瘤的辅助手段为 ()

- A、CT 检查
- B、磁共振检查
- C、腹腔镜检查
- D、B 超
- E、腹部平片检查

正确答案:D

36.下列肿瘤与梅格斯综合症有关的 ()

- A、子宫肌瘤
- B、输卵管癌
- C、子宫内膜癌
- D、库肯勃瘤
- E、卵巢纤维瘤

正确答案:E

37.下列哪项不是化疗的副反应()

- A、恶心、呕吐
- B、脱发
- C、消化道溃疡
- D、一过性跌倒，失语
- E、腹泻

正确答案:D

38.妊娠合并病毒性肝炎错误的是： ()

- A、重型肝炎以剖宫产为宜
- B、HBsAg(+)产后不能哺乳
- C、HBsAg(+)产后能哺乳
- D、DIC 是重症肝炎的主要死因
- E、乙型肝炎病毒是 DNA 病毒

正确答案:B

39.宫颈癌普查，最常用的方法是()

- A、宫颈活检
- B、碘试验
- C、细胞学检查
- D、阴道镜检查

E、血清学检查

正确答案:C

40.处理不协调性子宫收缩乏力的首选措施是()

- A、肌注盐酸哌替啶
- B、温肥皂水灌肠
- C、行人工破膜
- D、静滴催产素加强宫缩
- E、静脉补充能量

正确答案:A

41.关于羊水过多的概念,下列哪项正确()

- A、羊水量多于 1000ml
- B、羊水量多于 800ml
- C、羊水量多于 2000ml
- D、羊水量多于 600ml
- E、羊水量多于 1500ml

正确答案:C

42.葡萄胎随访,下述哪项不需要()

- A、定期做阴道细胞学检查
- B、避孕措施最好用阴茎套
- C、定期做 HCG 定量检查
- D、必要时做胸部 X 线检查
- E、行盆腔 B 超检查

正确答案:A

43.切除子宫送病理,病理提示子宫壁深肌层内见大量异型滋养细胞浸润,并有绒毛结构,应诊断为()

- A、水泡状胎块
- B、子宫内膜癌
- C、侵蚀性葡萄胎
- D、绒毛膜癌
- E、子宫颈癌

正确答案:C

44.临产后肛查了解胎头下降程度时,最常用作标记的是()

- A、骶岬
- B、坐骨棘
- C、坐骨结节
- D、耻骨联合后面
- E、以上都不是

正确答案:B

45.29 岁妇女,早孕 6 周,行人工流产术后,患者突然恶心、出冷汗。查体:面色苍白,血压 70/50mmHg,脉搏为 60 次/min。对于该患者应该做何处理()

- A、肌注氯丙嗪 25mg
- B、肌注异丙嗪 25mg
- C、肌注阿托品 0.5mg
- D、肌注哌替啶 100mg

E、冬眠合剂半量肌注

正确答案:C

46.妊娠 36 周末，宫底高度应为（ ）

- A、脐耻之间
- B、剑突下 2 横指
- C、脐上 1 横指
- D、剑突与脐之间
- E、脐下 1 横指

正确答案:B

47.下列哪项不是急性生殖器官炎症后病变（ ）

- A、输卵管积液
- B、慢性盆腔炎
- C、慢性输卵管卵巢炎
- D、慢性盆腔结缔组织炎
- E、卵巢巧克力囊肿

正确答案:E

48.属于卵巢上皮性肿瘤的是：（ ）

- A、浆液性囊腺瘤
- B、无性细胞瘤
- C、畸胎瘤
- D、颗粒细胞瘤
- E、内胚窦瘤

正确答案:A

49.重度子痫前期患者拟行扩容治疗，最主要的检查项目是()

- A、眼底检查
- B、血细胞比容
- C、24 小时尿蛋白总量
- D、心电图检查
- E、血浆总蛋白值

正确答案:B

50.足月妊娠时，胎心率正常的范围是每分钟（ ）

- A、100~140 次
- B、110~160 次
- C、120~160 次
- D、130~170 次
- E、140~180 次

正确答案:B

51.王女士，女，58 岁，绝经 5 年出现阴道不规则流血，初步诊断早期子宫内膜癌，入院后首选的治疗方法是：（ ）

- A、化疗
- B、手术治疗
- C、放射治疗
- D、内分泌药物治疗
- E、免疫治疗

正确答案:B

52.停经 2 个月，腹痛，阴道流血比月经多，子宫增大如孕 2 个月大小，宫口有胎囊膨出，应诊断为()

- A、宫外孕
- B、先兆流产
- C、不全流产
- D、难免流产
- E、过期流产

正确答案:D

53.确诊子宫颈癌的依据是()

- A、性交后出血
- B、阴道镜检查结果
- C、盆腔检查结果
- D、子宫颈刮片细胞学检查
- E、子宫颈及子宫颈管活组织检查

正确答案:E

54.先兆临产较可靠的征象是()

- A、假临产
- B、见红
- C、胎儿下降感
- D、胎动活跃
- E、尿中的 HCG 增多

正确答案:B

55.人工流产综合反应的发生原因主要是()

- A、疼痛刺激
- B、精神过度紧张
- C、迷走神经兴奋
- D、术中出血过多
- E、吸宫时负压过大

正确答案:C

二、多选题 ()

1.胎盘的功能包括 ()

- A、免疫
- B、保持胎儿恒温
- C、合成
- D、物质交换
- E、防御

正确答案: A,C,D,E

2.影响子宫内膜癌的预后因素包括()

- A、病理类型
- B、手术—病理分期
- C、淋巴转移
- D、肌层浸润
- E、治疗方法

正确答案: A,B,C,D,E

3.诊断功能失调性子宫出血的必要条件是()

- A、异常子宫出血
- B、外生殖器无器质性病变
- C、内生殖器无器质性病变
- D、全身无器质性病变
- E、调节生殖的神经内分泌机制异常

正确答案: A,B,C,D,E

4.不宜口服避孕药的疾病有 ()

- A、宫颈炎
- B、血栓性静脉炎
- C、恶性高血压
- D、月经过多
- E、卵巢肿瘤

正确答案: B,C,E

5.下列哪些属于卵巢妊娠的诊断标准? ()

- A、双侧输卵管必须正常
- B、囊胚必须位于卵巢上，并以卵巢固有韧带与子宫相连
- C、囊胚壁上有卵巢组织
- D、后穹窿穿刺必须抽到不凝固血液
- E、B超检查宫内未见妊娠物

正确答案: A,B,C

三、判断 ()

1.一旦发生乳腺炎，就应该尽早停止哺乳以免乳腺炎加重。 ()

正确答案: 错误

2.输卵管妊娠破裂前，妇科检查子宫颈有触痛。 ()

正确答案: 错误

3.绒毛膜癌最常见的转移方式是血行转移。 ()

正确答案: 正确

4.妊娠高血压综合征发生抽搐是因为病人颅内血管病变 ()

正确答案: 错误

5.有排卵的月经周期的妇女基础体温呈单相型。 ()

正确答案: 错误

6.前置胎盘最主要的症状是无诱因无痛性反复阴道出血。 ()

正确答案: 正确

7.弓形虫不属于性传播疾病。 ()

正确答案: 正确

8.避孕药物的类早孕反应是因孕激素刺激胃黏膜引起。 ()

正确答案: 错误

9.子宫畸形不适宜宫内节育器。 ()

正确答案: 正确

10.妊娠期高血压疾病发生抽搐时应立即肌注硫酸镁控制抽搐。 ()

正确答案: 错误

11.孕激素可促使子宫发育、肌层增厚 ()

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/758015125006006037>