

2023 年执业药师之西药学综合知识与技能综合练习 试卷 B 卷附答案

单选题（共 40 题）

1、双侧肾动脉狭窄患者禁用的抗高血压药物为()。

- A. 利尿剂（袢利尿药）
- B. 非二氢吡啶类钙通道阻滞剂
- C. ACEI
- D. 利尿剂（噻嗪类）
- E. β -受体阻断剂

【答案】 C

2、属于选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂的是

- A. 艾司唑仑
- B. 丁螺环酮
- C. 阿米替林
- D. 舍曲林
- E. 度洛西汀

【答案】 D

3、一些权威性较高的二次文献中，记载做皮肤敏感试验的药品是

- A. 链霉素注射剂
- B. 青霉素钠注射剂
- C. 玻璃酸酶注射剂
- D. 鱼肝油酸钠注射剂

E. 细胞色素 C 注射剂

【答案】 A

4、皮肤接触腐蚀性毒物，须用中和液或解毒液冲洗，且冲洗的时间要达

A. 5~10min

B. 10~20min

C. 15~30min

D. 20~30min

E. 30~40min

【答案】 C

5、服用他汀类调节血脂药可能导致

A. 血白细胞计数降低

B. 血清白蛋白升高

C. 血清总胆固醇升高

D. 血清碱性磷酸酶升高

E. 粪便细胞显微镜检查可见真菌增多

【答案】 D

6、（2015年真题）患者，女，51岁，体检时发现血压160/105mmHg，糖耐量试验餐后2小时血糖为9.56mmol/L（参考范围<7.8mmol/L），甘油三酯1.52mmol/L（参考范围0.56~1.70mmol/L），总胆固醇6.26mmol/L（参考范围<5.2mmol/L），低密度脂蛋白胆固醇4.85mmol/L（参考范围2.1~3.1mmol/L），高密度脂蛋白胆固醇1.20mmol/L（参考范围1.2~1.65mmol/L），肌酐60μmol/L（参考范围45~84μmol/L），蛋白尿：++。临床诊断为高血压病、高脂血症、糖耐量异常。

- A. 控制体重
- B. 不必限盐
- C. 适当运动
- D. 减少脂肪摄入
- E. 戒烟限酒

【答案】 B

7、接种乙型肝炎疫苗后，血清免疫学检查可呈阳性反应的指标是：

- A. 乙型肝炎病毒表面抗原
- B. 乙型肝炎病毒表面抗体
- C. 乙型肝炎病毒 e 抗原
- D. 乙型肝炎病毒 e 抗体
- E. 乙型肝炎病毒核心抗体

【答案】 B

8、服药时，应该限制饮水的药品是

- A. 硝酸甘油
- B. 苯溴马隆
- C. 口服补液盐
- D. 阿仑膦酸盐
- E. 熊去氧胆酸

【答案】 A

9、误服汞产生的急性汞中毒，最先表现的症状是

- A. 口腔炎、胃肠炎
- B. 头痛、头晕
- C. 兴奋
- D. 神经衰弱
- E. 肾衰竭

【答案】 A

10、同时服用有利于铁的吸收的药物是

- A. 维生素 A
- B. 维生素 B
- C. 维生素 C
- D. 维生素 D
- E. 维生素 E

【答案】 C

11、不可逆地抑制环氧化酶，可以用于降低心肌梗死、脑卒中和心血管死亡的发生风险的药物是

- A. 硝酸甘油
- B. 美托洛尔
- C. 氨氯地平
- D. 阿司匹林
- E. 氯吡格雷

【答案】 D

12、（2019年真题）患者，女，55岁，因持续性中上腹疼痛2日入院。查体：体温38℃，中上及左上腹有压痛。化验结果：白细胞计数 $18.7 \times 10^9/L$ ，血清淀粉酶1993U/L，血脂肪酶6116U/L。其诊断可考虑是

- A. 急性胰腺炎
- B. 急性胆囊炎
- C. 急性阑尾炎
- D. 急性胃炎
- E. 急性肠梗阻

【答案】 A

13、患儿，男，10个月，1天前出现腹泻，大便7次/日，黄色水样便，量多，未见黏液脓血便，伴发热，体温38~39℃，时有呕吐/3次，日。大便常规：WBC 1-3 / HP。

- A. 2~3小时
- B. 0.5~2小时
- C. 3~4小时
- D. 24小时
- E. 48小时

【答案】 A

14、在消化性溃疡形成中起到关键作用的因素为（ ）

- A. H. pylori 感染
- B. 胃酸
- C. 胃黏膜屏障的完整性
- D. 胃黏膜血流减少

E. 前列腺素分泌过少

【答案】 B

15、 - 西汀

A. - azepam

B. - prazole

C. - oxetine

D. - nidazole

E. - vastatin

【答案】 C

16、患者，男，67岁，主诉腰背疼痛、乏力，负荷增加时疼痛加重，严重时翻身、起坐及行走困难，疑似老年性骨质疏松症。经双能X线吸收测定，T值 \leq -2.5，确诊。药师应告知患者在服用维生素D软胶囊、碳酸钙片基础上，可加服

A. 泼尼松龙

B. 艾司奥美拉唑

C. 苯妥英钠

D. 依替膦酸二钠

E. 氟西汀

【答案】 D

17、关于微生态制剂，下列说法不正确的是

A. 清除对人体具有潜在危害的细菌

B. 调节肠道菌群平衡

- C. 补充人体正常生理细菌
- D. 对促进营养物质的吸收没有帮助
- E. 对排便具有协同作用

【答案】 D

18、有助于提高医、护、药专业人员对 ADR 的警惕性和识别能力；说明 ADR 监测的意义是

- A. 减少 ADR 的危害
- B. 促进临床合理用药
- C. 促进新药的研制开发
- D. 为“药品召回”提供依据
- E. 弥补药品上市前研究的不足药品不良反应(ADR)监测对人们安全用药的作用与意义重大且深远

【答案】 B

19、可用于香豆素类杀鼠药中毒药物是

- A. 碘解磷定
- B. 维生素 K1
- C. 乙酰胺
- D. 亚硝酸钠
- E. 纳洛酮

【答案】 B

20、（2017 年真题）配制青霉素输液的适宜溶媒是（ ）

- A. 50%葡萄糖注射液

- B. 复方氯化钠注射液
- C. 0.9%氯化钠注射液
- D. 低分子右旋糖酐注射液
- E. 5%葡萄糖注射液

【答案】 C

21、可引起头晕、失眠、抑郁、幻觉、心动过缓、低血压，严重者可诱发支气管哮喘的兴奋剂是

- A. 蛋白同化激素
- B. B受体阻断剂
- C. 精神刺激剂
- D. 人生长激素
- E. 麻醉药品

【答案】 B

22、老年人应用下列药物可引起何种不良反应,抗过敏药如苯海拉明可致

- A. 脱水、低钾血症
- B. 青光眼，甚至致盲
- C. 室性期前收缩、房室传导阻滞及低钾血症
- D. 嗜睡及头晕
- E. 水肿、高血压

【答案】 D

23、“控制被经济利益驱动的过度药物治疗”体现

- A. 安全性
- B. 有效性
- C. 规范性
- D. 经济性
- E. 患者依从性

【答案】 D

24、可用于静脉给药的胰岛素/胰岛素类似物是

- A. 普通胰岛素
- B. 低精蛋白锌胰岛素
- C. 预混胰岛素
- D. 甘精胰岛素
- E. 精蛋白锌胰岛素

【答案】 A

25、仅用于绝经后妇女，不适用于男性患者的抗骨质疏松药物是

- A. 雷洛昔芬
- B. 帕米磷酸二钠
- C. 骨化三醇
- D. 阿法骨化醇
- E. 降钙素

【答案】 A

26、患者，男，56岁，诊断为病毒性乙型肝炎。实验室检查：HbeAg（+），HBV-DNA \geq 20000IU/ml。ALT200U/L。现需要启动抗病毒治疗，采用干扰素 α 和核苷（酸）类抗病毒药物。

- A. 恩替卡韦
- B. 替比夫定
- C. 阿德福韦
- D. 拉米夫定
- E. 辅酶 A

【答案】 A

27、指本次不良反应经采取相应的医疗措施后的结果；如不良反应已经好转，后患者又死于原患疾病或与此不良反应无关的并发症，此栏应填“好转”

- A. 用药原因
- B. 用药起止时间
- C. ADR / ADE 过程描述
- D. 不良反应 / 事件的结果
- E. 引起不良反应的可疑药品

【答案】 D

28、在中国，具有“规范处方行为和指导合理用药的法规性和专业性文件”属性的药物专著是

- A. 新编药理学
- B. 中国药学文摘
- C. 中国国家处方集
- D. 国家基本药物处方集

E. 中华人民共和国药典临床用药须知

【答案】 C

29、口服避孕药所致的心肌梗死，在吸烟妇女中发生的危险性加大，说明药源性疾病的患者因素是

- A. 药物的使用
- B. 生理因素
- C. 药物制剂因素
- D. 不良生活方式
- E. 药物相互作用

【答案】 D

30、（2017年真题）患者女，68岁体重54kg，因慢性阻塞性肺病急性加重再次入院，入院后生化检查 ALT20 IU/L，血肌酐（Cr）1.8 mg/dL，痰培养为铜绿假单胞菌。临床选用头孢他啶。头孢他啶药品说明书成人常用剂量为1日1.5~6g，分2~3次给药肌酐清除率为31~50ml/min时剂量为每12小时1g；肌酐清除率为16~30ml/min时剂量为每24小时1g；肌酐清除率为6~15ml/min时量为每24小时0.5g；肌酐清除率≤5ml/min时剂量为每48小时0.5g。

- A. 25.5ml/min
- B. 30ml/min
- C. 34ml/min
- D. 40ml/min
- E. 47.2ml/min

【答案】 A

31、患者，男，50岁。临床诊断慢性肾衰竭（尿毒症期），进行肾移植治疗，配合应用免疫抑制剂他克莫司，其初始剂量为

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/758043107010006036>