

2024 年公共卫生与预防医学题库

第一部分 单选题(300 题)

1、消毒药械管理中下列哪项错误【单选题】——

- A. 根据消毒的目的选用消毒药械
- B. 同一消毒剂消毒不同物品应有同一浓度
- C. 加强消毒效能监测
- D. 防止使用中的消毒剂再污染 注意影响消毒效果的因素

【答案】： B

2、每日 I 级手术间开始前,提前开启净化空调系统时间【单选题】——

- A. 10 分钟
- B. 30 分钟
- C. 15 分钟
- D. 20 分钟 40 分钟

【答案】： B

3、丙型病毒性肝炎宜采取【单选题】——

- A. 消化道隔离
- B. 呼吸道隔离
- C. 两者均是
- D. 两者均不是

【答案】： D

4、在医院中幽门螺杆菌的传播以下列哪种方式最多见【单选题】——

- A. 空气传播
- B. 接触传播
- C. 血液传播
- D. 唾沫传播 内镜操作传播

【答案】： E

5、下列细菌是目前医院感染常见的细菌,但除外【单选题】——

- A. 葡萄球菌特别是金黄色葡萄球菌和凝固酶阴性葡萄球菌
- B. 大肠埃希菌
- C. 沙门菌
- D. 铜绿假单胞菌 克雷伯肺炎杆菌

【答案】：C

6、根据我国卫生标准回答:对医院发生的医院内感染流行、暴发流行进行调查分析,提出控制措施,并组织实施的应是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：D

7、预防免疫功能低下病人发生医院内感染不正确的是【单选题】——

- A. 注射相关疫苗
- B. 全身使用广谱抗生素预防感染
- C. 治疗局部感染病灶
- D. 保护性隔离 保护皮肤黏膜的完整性

【答案】：B

8、输血科预防医院感染的措施错误的是【单选题】——

- A. 保持环境清洁,每日清洁桌面
- B. 被血液污染的台面可用苯扎溴铵消毒处理
- C. 血浆置换术应在II类环境中进行并注意消毒隔离
- D. 工作人员上岗前应注射乙型肝炎疫苗,并定期检查抗体水平
每月对储血冰箱的内壁进行生物学监测,不得检出致病性微生物和真菌

【答案】：B

9、当被沾有HBsAg阳性血的针头刺伤时,立即应作的主要处理是【单选题】——

- A.

乙型肝炎高价免疫血清注射

- B. 给受伤者立即注射丙种球蛋白
- C. 乙型肝炎疫苗注射
- D. 伤口立即涂以碘酒 受伤者立即抽血作乙型肝炎全套抗原抗体检测

【答案】：A

10、根据我国下列卫生标准回答：监督、指导医务人员严格执行无菌技术操作规程，合理应用抗感染药，实施对一次性医疗用品的管理等有关医院内感染管理的制度的是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：E

11、低效消毒剂【单选题】——

- A. 0.5%碘伏
- B. 2%戊二醛
- C. 两者均是
- D. 两者均否

【答案】：D

12、医院内感染主要发生在【单选题】——

- A. 门诊、急诊病人
- B. 探视者
- C. 医务人员
- D. 住院病人 陪护人员

【答案】：D

13、有关内镜消毒下列哪项是错误的【单选题】——

- A. 腹腔镜用环氧乙烷消毒

B. 消化内镜用 500×10^{-6} 有效氯的含氯消毒剂消毒

C.

直肠镜采用高压灭菌

D. 内镜活检钳使用过频时,采用 2%戊二醛消毒 45 分钟
苯二甲醛消毒内镜 5 分钟可灭菌

【答案】： B

14、传染病院应设置在【单选题】——

- A. 靠近综合性医院
- B. 城市中心
- C. 远离公共场所
- D. 交通便利的地方 水源充足的地方

【答案】： C

15、下列哪项不属医院感染【单选题】——

- A. 阑尾穿孔引起的腹膜炎
- B. 入院 72 小时后发生的肺炎
- C. 无症状导管菌尿症
- D. 烧伤 6 小时入院的创面感染 产道分娩吸入阴道分泌物的新生儿肺炎

【答案】： A

16、医院感染的含义是【单选题】——

- A. 所有发生在医院内的细菌感染
- B. 因医疗器械消毒不严造成的感染
- C. 病人在住院期间发生的感染
- D. 病人在住院期间或医院职工在护理或治疗患者过程中发生的感染 医院内病人直接或间接传播引起的感染

【答案】： D

17、接触传染病患者后隔离衣应放在【单选题】——

- A. 治疗区,清洁面向外
- B. 走廊,清洁面向外
- C. 走廊,清洁面向内

D. 办公室,清洁面向外 病室,清洁面向外

【答案】： B

18、张某,以“急性甲型肝炎”收住院治疗,病人正在治疗期间。对该病人应做何种隔离【单选题】——

- A. 保护性隔离
- B. 消化道隔离
- C. 严密隔离
- D. 昆虫隔离 呼吸道隔离

【答案】： B

19、有关紫外线消毒效果监测下列哪项规定是错误的【单选题】——

- A. 对灯管应用时间、照射累计时间进行记录并签名
- B. 对紫外线灯管在安装后、使用前应进行强度监测
- C. 使用中的灯管的强度监测应每个月监测 1 次
- D. 新购灯管强度大于 $100 \mu W/cm^2$,使用中灯管强度大于 $70 \mu w/cm^2$ 为合格灯管 照射前后人工染菌杀灭率达到 99.9%以上为合格灯管

【答案】： C

20、烧伤病房【单选题】——

- A. $\leq 10 \leq 5 \leq 5$
- B. $\leq 200 \leq 5 \leq 5$
- C. $\leq 500 \leq 10 \leq 10$
- D. $=- \leq 15 \leq 15$

【答案】： B

21、免疫功能低下病人的医院内感染预防,下列哪项错误【单选题】——

- A. 保护皮肤黏膜的完整性
- B. 广谱抗生素肠道预防感染
- C. 保护性隔离
- D. 治疗局部感染病灶 疫苗注射

【答案】： B

22、根据我国卫生标准回答以下问题:进行医院内感染管理的策略研究,为国家提供咨询意见的应是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】: A

23、手术区皮肤消毒的正确方法是【单选题】——

- A. 消毒范围超过手术切口 15cm
- B. 会阴部用碘酊消毒
- C. 消毒范围与备皮范围一致
- D. 用 2.5~3%的碘酊消毒 3 遍 用 95%乙醇脱碘

【答案】: A

24、下列消毒剂中属高水平消毒剂的是【单选题】——

- A. 戊二醛
- B. 聚维酮(络合碘)
- C. 苯扎溴铵(新洁尔灭)
- D. 乙醇 碘酊

【答案】: A

25、刘某,被诊断为霍乱,对其应该采取的隔离方式是【单选题】——

- A. 消化道隔离
- B. 严密隔离
- C. 昆虫隔离
- D. 保护性隔离 呼吸道隔离

【答案】: B

26、对怀疑医院内感染的病例取标本进行病原体检查,下述描述中错误的是【单选题】——

- A. 在使用抗菌药物前送标本
- B.

为节约经费,应该在抗感染治疗效果不佳时取标本做病原体检查

- C. 采集标本后及时送检
- D. 采集标本时防止污染 接到临床标本后及时正确接种

【答案】： B

27、关于医院感染的概念正确的是【单选题】——

- A. 与上次住院有关的感染不是医院感染
- B. 医院感染是指在医院内获得的感染
- C. 诊疗措施激活的潜在性感染不是医院感染
- D. 婴幼儿经胎盘获得的感染是医院感染 出院之后发生的感染一定不是医院感染

【答案】： B

28、关于无菌器械保存液和消毒剂的描述,下列哪项是正确的【单选题】——

- A. 无菌器械保存液应该是无菌的,最多允许检出少量微球菌
- B. 使用中消毒剂细菌总数应 ≤ 200 cfu/mL,致病性微生物不得检出
- C. 无菌器械保存液细菌总数应 ≤ 5 cfu/mL,致病性微生物不得检出
- D. 使用中消毒剂细菌总数应 ≤ 10 cfu/mL,允许检出金黄色葡萄球菌 使用中消毒剂细菌总数应 ≤ 100 cfu/mL,致病性微生物不得检出

【答案】： E

29、医院污物的处理原则错误的是【单选题】——

- A. 防止污染扩散
- B. 分类收集
- C. 分别处理
- D. 少量医疗垃圾可与生活垃圾一同处理 尽可能采用焚烧处理

【答案】： D

30、供应室无菌区【单选题】——

- A. 空气 ≤ 10 cfu/m³,物体表面 ≤ 5 cfu/cm³,医护人员手 ≤ 5 cfu/cm²
- B. 空气 ≤ 200 cfu/m³,物体表面 ≤ 5 cfu/cm³,医护人员手 ≤ 5 cfu/cm²
- C.

空气 $\leq 500\text{cfu}/\text{m}^3$, 物体表面 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^3$, 医护人员手 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$
D. -, 物体表面 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^3$, 医护人员手 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$ 空气
 $\leq 1000\text{cfu}/\text{m}^3$, 物体表面 $\leq 8\text{cfu}/\text{cm}^3$, 医护人员手 $\leq 8\text{cfu}/\text{cm}^2$? 下列各医
疗区的细菌学指标是

【答案】： B

31、浸泡无菌持物钳的容器应是【单选题】——

- A. 大口容器, 盛用消毒液
- B. 大口容器, 底部垫纱布
- C. 大口容器, 盛用消毒液, 底部垫无菌纱布
- D. 盛用消毒液, 底部垫无菌纱布 大口容器, 盛用消毒液, 底
部垫纱布

【答案】： A

32、医院感染常规监测中下列哪项是错误的【单选题】——

- A. 医院感染高危科室、高危人群监测
- B. 漏报率监测
- C. 医院感染高危因素监测
- D. 医院感染暴发流行监测 传染病报告卡监测

【答案】： E

33、目前引起输血后肝炎的主要的肝炎病毒为【单选题】——

- A. 乙型肝炎病毒
- B. 甲型肝炎病毒
- C. 戊型肝炎病毒
- D. 丙型肝炎病毒 庚型肝炎病毒

【答案】： D

34、无菌治疗巾打开后, 未用完其继续使用的有效时间是【单选题】——

- A. 4h
- B. 12h
- C.

6h

D. 2h 24h

【答案】：E

35、无菌区的定义是【单选题】——

A. 经过灭菌处理的区域

B. 不使已灭菌的物品再污染并保持灭菌

C. 未经灭菌处理的区域

D. 经过灭菌未被污染的区域 灭菌处理后被污染的区域

【答案】：D

36、医院必须对消毒、灭菌效果定期进行监测,灭菌合格率必须达到【单选题】——

A. 0.8

B. 1

C. 0.85

D. 0.95 0.9

【答案】：B

37、为预防医院感染的发生新生儿病房每张床位占地面积不应少于【单选题】——

A. 5m²

B. 4m²

C. 3m²

D. 2m² 1m²

【答案】：C

38、每块手术巾的一边应折叠【单选题】——

A. 1/10

B. 1/5

C. 1/4

D. 1/3 1/2

【答案】：C

39、下列消毒剂中属中效消毒剂的是【单选题】——

- A. 戊二醛
- B. 过氧乙酸
- C. 氯己定
- D. 臭氧 碘伏

【答案】：E

40、下列关于交叉感染描述正确的是【单选题】——

- A. 在诊疗过程中,由于器械消毒不严或制剂不纯引起的感染
- B. 病人在家中已发生的感染
- C. 病人入院时已处于另一种传染病的潜伏期,入院后发病,并传给其他病人
- D. 病原体来源于病人本身的感染 病人与医生及其他病人通过直接或间接传播引起的感染

【答案】：E

41、须现配现用的消毒剂是【单选题】——

- A. 过氧乙酸
- B. 乙醇
- C. 苯扎溴铵
- D. 纯乳酸 甲醛

【答案】：A

42、下列哪种情况属于医院感染【单选题】——

- A. 烧伤创面培养出金黄色葡萄球菌
- B. 经产道感染的乙型肝炎
- C. 红霉素静脉滴注后发生静脉炎;拔出的导管在血平皿上滚动培养,细菌菌落数8个
- D. 羊肠线吸收不佳的炎症反应 入院后5天发生的甲型肝炎

【答案】：B

- 43、根据我国卫生标准回答:接触皮肤的医疗用品【单选题】——
- A. 必须无菌
 - B. 细菌菌落总数应 $\leq 20\text{Cfu/g}$ 或 $\leq 20\text{cfu}/100\text{cm}^2$,致病性微生物不得检出
 - C. 细菌菌落总数应 $\leq 200\text{cfu/g}$ 或 $\leq 200\text{cfu}/100\text{cm}^2$,致病性微生物不得检出
 - D. 细菌菌落总数应 $\leq 100\text{cfu/mL}$,致病性微生物不得检出 细菌菌落总数应 $\leq 300\text{cfu/mL}$,致病性微生物不得检出

【答案】: C

- 44、关于各种危险性物品的处理方法不正确的是【单选题】——
- A. 凡是高度危险的物品,必须选用灭菌法
 - B. 凡中度危险性物品,一般情况下达到消毒即可
 - C. 中度危险性物品的消毒要求并不相同,部分内窥镜必须达到高效消毒
 - D. 凡低度危险性物品,一般可用低效消毒方法 而对便器、卫生洁具等物品则只作一般的清洁处理即可

【答案】: E

- 45、下列关于自身感染的描述正确的是【单选题】——
- A. 病人与医生及其他病人通过直接或间接传播引起的感染
 - B. 病人在家中已发生的感染
 - C. 病人入院时已处于另一种传染病的潜伏期,入院后发病,并传给其他病人
 - D. 在诊疗过程中,由于器械消毒不严或制剂不纯引起的感染 病原体来源于病人本身的感染

【答案】: E

- 46、下列各项中错误的是【单选题】——
- A. 医护人员在采血、输血前后要洗手
 - B. 每批一次性注射器均应注明出厂日期、灭菌日期和有效期
 - C.

使用过的一次性注射器、输血器材应消毒毁灭或焚烧

D. 实验工作人员不能用口吸管,处理污物时要戴手套 艾滋病的潜伏期内无传染性

【答案】: E

47、需要采取血液-体液隔离的疾病是【单选题】——

A. 肺结核

B. 艾滋病

C. 器官移植者

D. 肺鼠疫 霍乱

【答案】: B

48、抗菌药物应用中,下列哪项属错误【单选题】——

A. 病毒感染不用抗菌药物

B. 疑为细菌感染,应先送培养标本而后经验性选药

C. 培养结果出来,根据其药敏结果调整药物

D. 当应用抗菌药物 24 小时未见效立即改选其他药物 一般感染抗菌药物用至症状体征消失后 3~4 天

【答案】: D

49、交叉感染【单选题】——

A. 病人在家中已发生的感染

B. 病原体来源于病人本身的感染

C. 病人与医生及其他病人通过直接或间接传播引起的感染

D. 在诊疗过程中,由于器械消毒不严或制剂不纯引起的感染 病人入院时已处于另一种传染病的潜伏期,入院后发病,并传给其他病人

【答案】: C

50、病室内住有百日咳病人,已知病室长 6m、宽 3.2m、高 3m,用纯乳酸进行空气消毒,乳酸的用量是【单选题】——

A. 7ml

B. 6ml

C.

12ml

D. 15ml 5ml

【答案】：A

51、对到传染病室探视的亲友应注意的事项哪些不对【单选题】——

- A. 对于有感染指征的来访者,一律谢绝探视
- B. 探视者在进入隔离室前要先报告值班护士
- C. 对于有感染指征的患者,应尽量控制和减少探视
- D. 医务人员应指导和监督探视者按规定进行隔离 积极向探视者进行卫生知识宣传教育,保护探视者不受感染

【答案】：C

52、一般病室.办公室.治疗室.换药室.走廊等使用的拖把【单选题】——

- A. 先用 1000mg/L 有效氯消毒剂适量倒在污染地面 30min 后,用拖把拖干净
- B. 拖把用 500mg/L 有效氯消毒液浸泡 30min 后,再洗干净,晾干备用
- C. 拖把应有明显的标记,严格分区使用
- D. 每次使用后清水冲洗,悬挂晾干备用 应先消毒,用 500mg/L 有效氯消毒液浸泡 30min,再用水洗干净,然后用 500mg/L 有效氯消毒液浸泡 30min,悬挂晾干备用

【答案】：D

53、无需执行昆虫隔离的疾病是【单选题】——

- A. 疟疾
- B. 气性坏疽
- C. 斑疹伤寒
- D. 流行性出血热 流行性乙型脑炎

【答案】：B

54、下列哪项违反了隔离原则【单选题】——

- A. 给同一种病种患者测血压时可不换血压计

- B. 护理消化道隔离病人时,须按病种分别穿隔离衣
- C.

严密隔离患者禁止走出病室

- D. 斑疹伤寒患者须更衣后才可入病房 只要做好床边隔离,不同的呼吸道传染病患者可同住一室

【答案】：E

55、输液反应中属于医院感染的有【单选题】——

- A. 由于输注液体中药物引起的发热
B. 由液体或输液通路中的毒素引起的发热
C. 由于液体被细菌污染引起的发热
D. 由于输液管中的内毒素引起的发热 由于输液的血管导管的感染引起的发热

【答案】：C

56、治疗室的管理中下列哪项错误【单选题】——

- A. 注射、治疗时,应辅无菌盘,抽出的药液存放不能超过2小时
B. 治疗室中开启的各种溶媒不得超过24小时
C. 治疗室中开启的无菌溶液需要4小时内使用
D. 碘酊、乙醇瓶应保持密闭,每周更换及灭菌1~2次 经消毒后的棉球、纱布包,一经打开,保存时间不得超过48小时

【答案】：E

57、根据我国下列卫生标准回答:进行医院内感染管理的策略研究,为国家提供咨询意见的是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
B. 省医院感染管理专家咨询委员会
C. 各级医院的医院感染管理委员会
D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：A

58、使用化学消毒剂的注意事项不包括【单选题】——

- A. 性质不稳定的消毒液应临时配制
B. 严格掌握浸泡时间
C.

物品要全部浸没在消毒液内

D. 要配成最有效的浓度 消毒前必须用生理盐水冲洗

【答案】： E

59、和破损皮肤、黏膜相接触，而不进入无菌的组织内的器材【单选题】——

A. 应用物理灭菌方法

B. 杀灭细菌繁殖体的消毒剂

C. 灭菌剂或物理、化学灭菌方法

D. 杀灭结核杆菌的消毒剂或中、低效消毒剂 应用灭菌剂或高效消毒剂

【答案】： E

60、穿过皮肤或黏膜进入无菌的组织或器官内部的器材【单选题】——

A. 灭菌剂或物理、化学灭菌方法

B. 应用灭菌剂或高效消毒剂

C. 杀灭结核杆菌的消毒剂或中、低效消毒剂

D. 应用物理灭菌方法 杀灭细菌繁殖体的消毒剂

【答案】： A

61、下列有关医院感染的管理人员培训要求描述错误的是【单选题】——

A. 300 张床位以上的医院设医院感染管理科

B. 1000 张床位以上的大型医院，医院感染管理专职人员的配备不得少于 10 人

C. 300 张床位以下的医院，医院感染管理专职人员的配备不少于 1 人

D. 300 张床位以下的医院应配备医院感染管理专职人员

300-500 张床位的医院，医院感染管理专职人员的配备不得少于 2 人

【答案】： B

62、生活垃圾【单选题】——

A.

使用过的注射针头

- B. 带血的敷料
- C. 两者均是
- D. 两者均否

【答案】：D

63、发生医院感染时,停止收容新病人的时间是【单选题】——

- A. 该病最长潜伏期过去
- B. 该病平均潜伏期过去
- C. 该病常见潜伏期过去
- D. 该病最短潜伏期过去 观察一段时间没有新病人发生

【答案】：A

64、医务人员在诊疗埃博拉患者时,须做好那种隔离措施【单选题】——

- A. 接触隔离
- B. 床边隔离
- C. 保护性隔离
- D. 空气隔离 消化道隔离

【答案】：A

65、医院感染控制措施中手术部位感染已证实有效的措施不对的是【单选题】——

- A. 清洁的手术环境
- B. 工作人员装束和手术室的无菌操作
- C. 术前沐浴和患者局部皮肤准备
- D. 合理的预防性抗生素的应用和外科伤口监测 熏蒸消毒,术前剃毛

【答案】：E

66、关于锐器伤后的预防措施,错误的是【单选题】——

- A. 如不慎发生锐器伤,应立即采取相应的保护措施,清创、对创面进

行严格消毒处理

B.

对发生锐器伤者进行血源性疾病的检查和随访

C. 被 HBV 阳性病人血液、体液污染锐器刺伤,应在 1 周内注射乙型肝炎高效价免疫球蛋白

D. 被 HBV 阳性病人血液、体液污染的锐器刺伤,应及时进行血液乙肝标志物检查 被 HBV 阳性病人血液、体液、污染锐器刺伤,血液乙肝标志物阴性者按规定接种乙肝疫苗

【答案】：C

67、高效消毒剂是【单选题】——

A. 醋酸氯己定

B. 新洁尔灭

C. 两者均是

D. 两者均否

【答案】：D

68、使用无菌包的正确方法是【单选题】——

A. 打开无菌包时,必须保护包内面的无菌面

B. 从无菌包内取出的物品若未使用,应立即放回包内

C. 无菌包潮湿时,应待干燥后再用

D. 打开无菌包时,应用手指捏住包布四角的内面展开 无菌包打开后无须注明开包日期和时间

【答案】：A

69、紫外线灯做空气消毒时,照射时间不少于【单选题】——

A. 35 分钟

B. 25 分钟

C. 15 分钟

D. 30 分钟 20 分钟

【答案】：D

70、二级医院【单选题】——

A. 医院感染发生率 \leq 8%

B. 切口感染率 $\leq 0.5\%$

C.

两者均是

D. 两者均不是

【答案】：C

71、医院感染监测;管理监督;评价效果;发现问题提出对策【单选题】

——

A. 卫生部医政司医院感染管理委员会

B. 省市卫生行政部门医院感染管理委员会

C. 医院的医院感染管理委员会

D. 医院感染管理科 临床科室以下各项工作是哪个部门的职责

【答案】：C

72、给传染病患者发药,下述哪一项是错误的【单选题】——

A. 协助同一病种的患者服药后,再给另一病种患者喂药

B. 用过的药杯放在消毒液内浸泡

C. 全病区发药完毕,按常规消毒药杯

D. 车下层放盆,内盛消毒液 将备好的药及水壶放在治疗车上

【答案】：A

73、密闭式潴留导尿系统引起感染的危险因素中,哪一项最常见【单选题】——

A. 潴留导尿持续1周

B. 集尿袋位处膀胱水平之上

C. 抗生素膀胱冲洗

D. 集尿管扭结或阻塞 密闭系统的接头反复打开

【答案】：E

74、属于高度危险性物品的是【单选题】——

A. 手术器械和用品

B. 体温表

C. 呼吸机管道

D. 胃肠道内窥镜和气管镜 麻醉机管道

【答案】：A

75、碘伏属于【单选题】——

- A. 中效消毒剂
- B. 低效消毒剂
- C. 以上都不是
- D. 高效消毒剂 中低效消毒剂

【答案】：A

76、III类区域工作人员卫生手及物体表面的合格标准为【单选题】——

- A. 细菌总数 $\leq 20\text{cfu}/\text{cm}^2$, 未检出致病菌
- B. 细菌总数 $\leq 25\text{cfu}/\text{cm}^2$, 未检出致病菌
- C. 细菌总数 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$, 未检出致病菌
- D. 细菌总数 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$, 未检出致病菌 细菌总数 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$, 未检出致病菌

【答案】：C

77、根据我国卫生标准回答以下问题:接触黏膜的医疗用品【单选题】——

- A. 必须无菌
- B. 细菌菌落总数应 $\leq 20\text{cfu}/\text{g}$ 或 $\leq 20\text{cfu}/100\text{cm}^2$, 致病性微生物不得检出
- C. 细菌菌落总数应 $\leq 200\text{cfu}/\text{g}$ 或 $\leq 200\text{cfu}/100\text{cm}^2$, 致病性微生物不得检出
- D. 细菌菌落总数应 $\leq 100\text{cfu}/\text{mL}$, 致病性微生物不得检出 细菌菌落总数应 $\leq 300\text{cfu}/\text{mL}$, 致病性微生物不得检出

【答案】：B

78、标准预防针对体内物质的隔离预防不包括【单选题】——

- A. 血液
- B. 体液
- C.

汗液

D. 排泄物 分泌物

【答案】：C

79、关于医院感染的概念错误的是：【单选题】——

A. 入院时处于潜伏期的感染不是医院感染

B. 医院感染是指在医院内获得的感染

C. 慢性感染急性发作是医院感染

D. 与上次住院有关的感染是医院感染 婴幼儿经胎盘获得的感染不是医院感染

【答案】：C

80、传染病区使用拖把的描述哪项是正确的【单选题】——

A. 应先消毒,用 500mg/L 有效氯消毒液浸泡 30min,再用水洗干净,然后用 500mg/L 有效氯消毒液浸泡 30min,悬挂晾干备用

B. 每次使用后清水冲洗,悬挂晾干备用

C. 先用 1000mg/L 有效氯消毒剂适量倒在污染地面 30min 后,用拖把拖干净

D. 拖把用 500mg/L 有效氯消毒液浸泡 30min 后,再洗干净,晾干备用 拖把应有明显的标记,严格分区使用

【答案】：A

81、细菌耐药最常见的机制是【单选题】——

A. 细菌改变代谢途径

B. 产生抗生素灭活酶

C. 抗菌药物作用靶位改变

D. 细菌细胞膜渗透性改变使抗菌药物不易进入细菌细胞 细菌细胞将抗菌药物排除细菌

【答案】：B

82、预防免疫功能低下患者发生医院感染,不正确的是【单选题】——

A. 保护皮肤黏膜的完整性

B. 保护性隔离

C.

全身使用广谱抗生素

D. 治疗局部感染病灶 注射相关疫苗

【答案】：C

83、关于无菌技术,以下操作错误的是【单选题】——

A. 消毒液应浸没持物镊的 2/3 左右

B. 一份无菌物品仅供一位病人使用

C. 治疗室要湿式清扫,每日紫外线照射 1 次

D. 衣帽要整齐,口罩遮住口鼻,修剪指甲,洗手 无菌物品与非
无菌物品应分别放置

【答案】：A

84、医院感染最重要的传染来源是【单选题】——

A. 病原携带者

B. 血液制品

C. 食品

D. 动物 各种病人

【答案】：E

85、血液-体液隔离应用的标志是【单选题】——

A. 红色标志

B. 棕色标志

C. 黄色标志

D. 绿色标志 灰色标志

【答案】：A

86、目前引起下呼吸道医院感染最主要的病原体是【单选题】——

A. 铜绿假单胞菌

B. 链球菌

C. 表皮葡萄球菌

D. 卡他球菌 金黄色葡萄球菌

【答案】：A

87、对特殊感染而无保留价值的物品,最彻底的灭菌方法是【单选题】——

- A. 煮沸消毒灭菌法
- B. 过氧乙酸浸泡法
- C. 燃烧灭菌法
- D. 高压蒸汽灭菌法 日光曝晒法

【答案】： C

88、穿脱隔离衣时要避免污染【单选题】——

- A. 袖子后面
- B. 胸前、背后
- C. 腰带以下部分
- D. 衣领 腰带以上部分

【答案】： D

89、同一病房内住有伤寒与痢疾患者,3周后伤寒患者的大便培养出痢疾杆菌,其属【单选题】——

- A. 病人在家中已发生的感染
- B. 病人入院时已处于另一种传染病的潜伏期,入院后发病
- C. 病原体来源于病人本身的感染
- D. 病人之间引起的交叉感染 同时患伤寒和痢疾

【答案】： D

90、用紫外线灯做空气消毒时,照射时间不少于【单选题】——

- A. 20min
- B. 25min
- C. 15min
- D. 35min 30min

【答案】： E

91、医院的医院感染管理委员会的主要职责不包括【单选题】——

- A.

依据有关政策法规,制定全院控制医院感染规划、管理制度,并组织实施

- B. 根据《综合医院建筑标准》有关卫生学标准及预防医院感染的要求,对医院的改建、扩建和新建提出建设性意见
- C. 建立会议制度,定期研究、协调和解决有关医院感染管理方面的重大事项;遇有紧急问题随时召开
- D. 定期总结、分析细菌学检测监测资料,向有关部门反馈,并向全院公布 对医院感染管理科拟定的全院医院感染管理工作计划进行审定,对其工作进行考评

【答案】：D

92、艾滋病人感染的预防,下列哪项错误【单选题】——

- A. 晚期病人应接受保护性隔离
- B. 病人血中 CD4+T 淋巴细胞 $<0.2 \times 10^9/L$ 时应接受抗肺孢子虫感染的预防
- C. 一旦发病即应用广谱抗菌药预防全身感染
- D. 医务人员受 HIV 污染针头刺伤,应立即报告并接受药物(AZT)预防 确诊并发感染应早期抗生素治疗

【答案】：C

93、儿科病房【单选题】——

- A. $\leq 10 \leq 5 \leq 5$
- B. $\leq 200 \leq 5 \leq 5$
- C. $\leq 500 \leq 10 \leq 10$
- D. $=- \leq 15 \leq 15$

【答案】：C

94、仅直接或间接地和健康无损的皮肤相接触的物品可选择【单选题】——

- A. 应用灭菌剂或高效消毒剂
- B. 杀灭细菌繁殖体的消毒剂
- C. 杀灭结核杆菌的消毒剂或中、低效消毒剂

D. 灭菌剂或物理、化学灭菌方法 应用物理灭菌方法

【答案】： C

95、医院感染的传播途径一般不包括【单选题】——

- A. 经土壤传播
- B. 经共同媒介物传播
- C. 经空气传播
- D. 经生物媒介传播 经接触传播

【答案】：A

96、支气管镜采用 2%碱性戊二醛消毒时间应不少于【单选题】——

- A. 120min
- B. 60min
- C. 30min
- D. 20min 10min

【答案】：D

97、目前国内医院感染最常发生的部位是【单选题】——

- A. 泌尿道
- B. 外科切口
- C. 血液
- D. 下呼吸道 胃肠道

【答案】：D

98、手术间通常保持的湿度【单选题】——

- A. 40~60%
- B. 30~50%
- C. 30~40%
- D. 50~60% 40~50%

【答案】：D

99、洗手过程中手触及未消毒物品应【单选题】——

- A. 更改浸泡用药液
- B. 重新洗手
- C.

延长浸泡时间

D. 继续原有洗手步骤 多戴一副手套

【答案】： B

100、传染病门诊【单选题】——

A. $\leq 10 \leq 5 \leq 5$

B. $\leq 200 \leq 5 \leq 5$

C. $\leq 500 \leq 10 \leq 10$

D. $= - \leq 15 \leq 15$

【答案】： D

101、隔离衣一般情况下更换时间是【单选题】——

A. 72h

B. 24h

C. 6h

D. 12h 48h

【答案】： B

102、判断某传染病患者是否为医院感染引起的主要依据是【单选题】

——

A. 临床症状期

B. 检查结果

C. 病程

D. 潜伏期 传染期

【答案】： D

103、下述哪项不属于微生物【单选题】——

A. 病毒

B. 支原体

C. 细菌

D. 衣原体 钩虫

【答案】： E

104、灭菌速度快、灭菌效果好、对经济、环境污染小的是【单选题】

——

- A. 环氧乙烷灭菌法
- B. 戊二醛浸泡灭菌法
- C. 辐射灭菌法
- D. 过氧乙酸浸泡灭菌法 压力蒸气灭菌法

【答案】：E

105、医院污物的处理原则,下述哪项是错误的【单选题】——

- A. 防止污染扩散
- B. 分类收集
- C. 分别处理
- D. 少量医疗垃圾可与生活垃圾一同处理 尽可能采用焚烧处理

【答案】：D

106、张某,大面积烧伤病人,创面出现铜绿假单胞菌感染,创面换药后敷料的正确处理方法为【单选题】——

- A. 扔入污物桶
- B. 焚烧
- C. 清洗后放日光下曝晒
- D. 清洗后再消毒 灭菌后再清洗

【答案】：B

107、小儿流感嗜血杆菌感染首选的药物是:【单选题】——

- A. 青霉素
- B. 磺胺嘧啶
- C. 氨苄青霉素
- D. 头孢唑啉 林可霉素

【答案】：C

108、关于医院内感染的概念,错误的是【单选题】——

- A. 医院内感染是指在医院内获得的感染
- B.

与上次住院有关的感染是医院内感染

C. 出院之后发生的感染可能不是医院内感染

D. 入院时处于潜伏期的感染一定不是医院内感染

婴幼儿经

胎盘获得的感染是医院内感染

【答案】：E

109、生活垃圾为【单选题】——

A. 使用过的注射针头

B. 带血的敷料

C. 两者均是

D. 两者均否

【答案】：D

110、需要采取严密隔离的疾病是【单选题】——

A. 乙型肝炎

B. 艾滋病

C. 鼠咬热

D. 肺鼠疫

【答案】：D

111、血液净化室的医院感染管理下列哪项不正确【单选题】——

A. 应对病人常规进行血液净化前肝功能、肝炎病原体等检查

B. 工作人员定期体检,加强个人防护

C. 透析器、管道应专人专用

D. 传染病病人在隔离血液净化间内进行,专机透析

急诊病人

不需固定透析机

【答案】：E

112、霍乱病人应采取【单选题】——

A. 接触隔离

B. 保护性隔离

C. 呼吸道隔离

D. 消化道隔离 严密隔离

【答案】：E

113、为预防医院感染的发生,新生儿病房床位之间的间距不少于【单选题】——

- A. 100cm
- B. 90cm
- C. 80cm
- D. 70cm 60cm

【答案】： B

114、关于洗手指征,下述哪项是错误的【单选题】——

- A. 接触病人前后
- B. 进行无菌技术操作前后
- C. 戴口罩和穿、脱隔离衣前后
- D. 接触血液、体液和被污染的物品前后 脱手套后无须洗手

【答案】： E

115、目前医院内感染的研究对象主要是【单选题】——

- A. 住院患者
- B. 工作人员
- C. 陪护人员
- D. 探视人员 门诊患者

【答案】： A

116、根据我国下列卫生标准回答:对本地区的医院内感染管理进行技术指导的是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】： B

117、医院感染控制措施中泌尿道感染已证实有效的措施是【单选题】

——

- A.

全身预防性抗生素的使用

- B. 膀胱冲洗或灭菌生理盐水或抗生素冲洗
- C. 限制插管时间,插入时的无菌技术,保持密闭引流
- D. 引流袋内加入抗菌剂,抗微生物药物包裹的导尿管 每天灭菌剂清洁会阴

【答案】： C

118、对本地区的医院感染管理进行技术指导【单选题】——

- A. 卫生部医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】： B

119、输血科预防医院感染的措施错误的是：【单选题】——

- A. 每月对储血冰箱的内壁进行生物学监测,不得检出致病性微生物和霉菌
- B. 保持环境清洁,每天清洁桌面
- C. 血浆置换术应在Ⅱ类环境中进行并注意消毒隔离
- D. 工作人员上岗前应注射乙型肝炎疫苗,并定期检查抗体水平
被血液污染的台面可用新洁尔灭消毒处理

【答案】： E

120、紫外线消毒的有效距离是【单选题】——

- A. 10m
- B. 2m
- C. 1m
- D. 5m 15m

【答案】： B

121、灭菌速度快、灭菌效果好、经济、环境污染小的是【单选题】——

- A. 过氧乙酸浸泡灭菌法
- B.

辐射灭菌法

- C. 戊二醛浸泡灭菌法
- D. 环氧乙烷灭菌法 压力蒸汽灭菌法

【答案】：E

122、婴儿室【单选题】——

- A. $\leq 10 \leq 5 \leq 5$
- B. $\leq 200 \leq 5 \leq 5$
- C. $\leq 500 \leq 10 \leq 10$
- D. $= - \leq 15 \leq 15$

【答案】：B

123、冲手时应取姿势为【单选题】——

- A. 指尖朝下,手肘朝上
- B. 手指及前臂前伸
- C. 双手互相搓洗手臂
- D. 指尖朝上,手肘朝下 手指及前臂平伸

【答案】：D

124、根据我国下列卫生标准回答:根据《综合医院建筑标准》有关的卫生学标准及预防医院感染的要求,对医院的改建、扩建和新建提出建设性意见的是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：C

125、关于消毒因子对人体的危害,错误的是【单选题】——

- A. 微波对人体无害
- B. 液体消毒剂可以造成人体过敏
- C. 紫外线直接照射可伤害人体皮肤和角膜
- D. 环氧乙烷泄漏不仅对人体直接有毒,还可以发生爆炸

吸入戊二醛气体对人体有害

【答案】：A

126、关于医院感染知识培训要求,下述中错误的是【单选题】——

- A. 培训内容包括管理知识和专业知识
- B. 培训对象包括管理、医务、工勤人员
- C. 非专职人员每年培训不少于2小时
- D. 进修医师必须培训 实习医师必须培训

【答案】：C

127、用紫外线灯做空气消毒时有效距离为【单选题】——

- A. <3.5m
- B. <4m
- C. <2m
- D. <3m <2.5m

【答案】：C

128、关于医院内感染知识培训,错误的叙述是【单选题】——

- A. 培训内容包括管理知识和专业知识
- B. 培训对象包括管理、医务、工勤人员
- C. 非专职人员每年不少于2小时培训
- D. 进修医师必须培训 实习医师必须培训

【答案】：C

129、根据我国卫生标准回答:根据《综合医院建筑标准》有关的卫生学标准及预防医院内感染的要求,对医院的改建、扩建和新建提出建设性意见的应是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：C

130、关于地面和拖洗工具的消毒,下列哪项是正确的【单选题】——

- A. 地面应经常用含氯消毒剂拖洗,既能消毒,又能增白
- B. 因为 2%戊二醛是高水平消毒剂,有条件时最好用戊二醛拖地,消毒效果好
- C. 地面应湿式清扫,保持清洁,局部有血迹等污染时,应局部用消毒剂处理
- D. 拖洗工具使用后先洗净,再消毒,然后晾干 检验科的地面每天均需用消毒剂拖洗

【答案】： C

131、 I 类、 II 类区域工作人员卫生手及物体表面的合格标准为【单选题】——

- A. 细菌总数 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$,未检出致病菌
- B. 细菌总数 $\leq 20\text{cfu}/\text{cm}^2$,未检出致病菌
- C. 细菌总数 $\leq 25\text{cfu}/\text{cm}^2$,未检出致病菌
- D. 细菌总数 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$,未检出致病菌 细菌总数 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$,未检出致病菌

【答案】： D

132、脱隔离衣的正确步骤是【单选题】——

- A. 解腰带.刷手.解领扣.解袖扣.脱去隔离衣
- B. 松腰带.解袖扣.刷手.解领扣.系腰带.脱去隔离衣
- C. 松腰带.系腰带.解袖扣.刷手.解领扣.脱去隔离衣
- D. 解袖扣.刷手.解领扣.解腰带.脱去隔离衣 刷手.解腰带.解袖扣.解领扣.脱去隔离衣

【答案】： C

133、某医院收入一痢疾患者,该患者在入院时又感染了白喉杆菌,入院后发生白喉,这属于【单选题】——

- A. 交叉感染
- B. 医源性感染
- C.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/758122101134006066>