

眼科三基练习题库与答案

1、永存原始玻璃体增生症常需与下哪种疾病鉴别（）

- A、眼弓形体病
- B、家族性渗出性玻璃体视网膜病变
- C、Rb
- D、以上全部
- E、BOP

答案：D

2、眼源性眼球震颤的类型多为（）

- A、斜方向或旋转方向
- B、快慢相跳动型
- C、混合型
- D、水平跳动型
- E、水平钟摆型

答案：E

3、哪项不是地图-点状-指纹状上皮基底膜营养不良的表现（）

- A、可反复出现上皮剥脱
- B、角膜中央上皮层及基底膜可出现灰白色小点,地图样线和指纹状细小线条混浊
- C、可应用角膜上皮黏性润滑剂
- D、上皮剥脱者可包扎或戴软性角膜接触镜
- E、病变常表现为单眼

答案：E

4、表面麻醉剂一般不用于（）

- A、去除角膜异物
- B、眼底镜检查
- C、前房角镜检查
- D、三面镜检查
- E、测量眼压

答案：B

5、关于泪液的化学性质的说法,哪项不正确（）

- A、泪液为等渗液体
- B、泪液中少量葡萄糖及尿素

- C、泪液中 K^+ 、 Na^+ 、 Cl^- 浓度低于血浆中的浓度
D、泪液中有免疫球蛋白
- 45、中心性浆液性脉络膜视网膜病变发病部位在 ()
- A、视网膜颞侧
B、以上部位均可
C、视网膜鼻侧
D、黄斑部
E、视盘周围

答案：D

- 46、瞳孔括约肌受损时表现为 ()
- A、瞳孔缩小
B、瞳孔中度散大
C、瞳孔极度散大
D、不影响瞳孔大小
E、瞳孔轻度散大

答案：B

- 47、关于 Schiotz 眼压计测量眼压说法错误的有 ()
- A、用 5.5g 砝码若指针读数小于 3, 需更换更重砝码再测
B、球壁硬度偏高的眼其测量值比实际眼压低
C、眼压值受球壁硬度影响
D、属压陷式眼压测量
E、有交叉感染的危险

答案：B

- 48、睫状充血的特点不包括 ()
- A、围绕角膜呈毛刷状
B、为前睫状动脉充血
C、滴用肾上腺素液后充血并不减轻
D、推动结膜时血管不移动
E、愈靠近角膜缘充血愈不显著

答案：E

- 49、睫状前动脉是由肌动脉发出的多少条分支组成 ()
- A、5 条
B、6 条

C、10 条

D、8 条

E、7 条

答案：E

50、动脉硬化不包括（）

A、大动脉硬化

B、老年退化性硬化

C、动脉粥样硬化

D、动脉中层硬化

E、小动脉硬化

答案：A

51、先天性梅毒的眼部表现不包括（）

A、基质性角膜炎

B、角膜新生血管

C、虹膜睫状体炎

D、视力下降

E、视网膜脱离

答案：E

52、前房角镜检查时,根据 Seheie 前房角分类法,在改变眼球位置才能看见睫状体带者为（）

A、窄 H

B、宽角

C、窄工

D、窄 III

E、窄 W

答案：C

53、烟中毒性视神经病变错误的是（）

A、视野检查典型改变为中心注视点至生理盲点之间的暗点,呈横椭圆形

B、可伴红色盲

C、长期吸烟者易发

D、双眼视力逐渐减退

E、可呈鼻侧偏盲

答案：E

54、诊断小角膜正确的是（）

- A、角膜直径 <12mm
- B、角膜直径 <11mm
- C、角膜直径 <13mm
- D、角膜直径 <10mm
- E、角膜直径 <14mm

答案：D

55、临床上如不散瞳最容易将有黄斑水肿的视网膜脱离误诊为（）

- A、黄斑囊样水肿
- B、老年性黄斑变性
- C、中心性浆液性脉络膜视网膜病变
- D、中心性渗出性视网膜脉络膜病变
- E、以上都对

答案：C

56、诊断缺血型视网膜分支静脉阻塞的依据为：眼底荧光血管造影中，毛细血管无灌注区大于（）

- A、12 个视盘面积
- B、15 个视盘面积
- C、5 个视盘面积
- D、8 个视盘面积
- E、10 个视盘面积

答案：C

57、弓形暗点常见于（）

- A、中心性浆液性视网膜脉络膜病变
- B、前部缺血性视神经病变
- C、老年黄斑变性
- D、球后视神经炎
- E、黄斑缺损

答案：B

58、引起视交叉综合征的疾病是（）

- A、视乳头水肿
- B、外伤
- C、脑垂体肿瘤
- D、血管异常

E、炎症

答案：C

59、患者，男，8岁，发现右眼睑长一肿块4年。无外伤史。检查：视力：右1.0左1.0，右眼眶外上方可扪及一半圆形肿物，边界清楚，略有波动感，无压痛，与皮肤无粘连，右眼向前下方突出。最有可能的诊断是（）

A、眼眶寄生虫囊肿

B、黏液囊肿

C、皮样囊肿

D、畸胎瘤

E、胆脂瘤

答案：C

60、眼外肌中最短的肌肉是（）

A、下直肌

B、下斜肌

C、上斜肌

D、内直肌

E、上直肌

答案：E

61、急性泪囊炎的临床表现（）

A、泪囊区皮肤红肿、压痛

B、疼痛可向颈部放射

C、可形成脓肿

D、以上全是

E、结膜充血且有大量分泌物

答案：D

62、关于原发单纯疱疹病毒性角膜炎，何者不正确（）

A、常发生于老年人

B、常在三叉神经支配的体表发生感染

C、常在面神经支配的体表发生感染

D、常在动眼神经支配的体表发生感染

E、单纯疱疹病毒是一种RNA病毒

答案：B

63、结膜炎最基本的体征是（）

- A、滤泡形成
- B、结膜充血
- C、球结膜水肿
- D、分泌物增多
- E、乳头增生

答案：B

64、巩膜炎一般不会出现的症状有（）

- A、畏光、流泪
- B、无分泌物
- C、睫状体有压痛
- D、暗红色充血
- E、充血远角膜缘

答案：E

65、根据 WHO 分类标准，以下哪项为盲人（）

- A、较差眼的最好矫正视力 <0.05
- B、较差眼的最好矫正视力 <0.1
- C、较差眼的最好矫正视力 <0.01
- D、较好眼的最好矫正视力 <0.1
- E、较好眼的最好矫正视力 <0.05

答案：E

66、棘阿米巴病的特点不正确的是（）

- A、对化学消毒剂敏感
- B、主要感染角膜
- C、可致上皮性角膜炎
- D、有滋养体和包囊两种形式存在
- E、可涂片做细胞学检查

答案：A

67、判断视网膜色素上皮功能常用的临床电生理检查方法为（）

- A、EOG
- B、VEP
- C、ERG
- D、N、C、T
- E、OCT

答案：A

68、下述关于睑腺炎的治疗，错误的有（）

A、外睑腺炎的切口须与睑缘垂直，内睑腺炎切口与睑缘平行

B、脓肿形成时，应及时切开排脓

C、眼睑局部和结膜囊涂抗生素眼膏

D、未化脓前可热敷和其他物理治疗 E、反复发作及伴有全身反应时可全身应

用磺胺类或抗生素类药物 答案：A

69、关于咽结膜热，何者不对（）

A、由腺病毒 3、4 和 7 型引起

B、多见于青壮年

C、可偶发点状角膜炎

D、常伴乏力、高热咽痛

E、咽部及结膜充血

答案：B

70、对角膜云翳的特点描述不正确的有（）

A、呈灰白色

B、角膜受损后遗留的瘢痕

C、有时肉眼不能分辨

D、边界清楚

E、位于基质浅层

答案：D

71、视路不包括（）

A、视神经

B、外侧膝状体

C、视束

D、大脑颞叶

E、视交叉

答案：D

72、下列哪项不属于继发性视神经萎缩的原因（）

A、视网膜色素变性

B、球后视神经炎

C、视乳头炎

D、青光眼

E、视乳头水肿

答案：B

73、视网膜动脉对高血压的反应不正确的为（）

- A、血管痉挛
- B、动脉壁纤维化
- C、动脉反光增强
- D、小动脉口径增大
- E、视网膜棉绒斑

答案：D

74、先天性白内障中最常见类型为（）

- A、缝合性白内障
- B、先天性全白内障
- C、板层白内障
- D、囊膜性白内障
- E、极性白内障

答案：C

75、关于偏盲不正确的说法有（）

- A、包括同侧偏盲
- B、包括颞侧偏盲
- C、对视网膜病变的诊断极重要
- D、是垂直正中线正切的视野缺损
- E、以注视点为分界

答案：C

76、下列哪种角膜炎最危险（）

- A、绿脓杆菌性角膜炎
- B、真菌性角膜炎
- C、匍行性角膜溃疡
- D、棘阿米巴性角膜炎
- E、病毒性角膜炎

答案：A

77、支配米勒肌的神经是（）

- A、滑车神经
- B、外展神经
- C、动眼神经

- D、交感神经
- E、以上都不是

答案：D

78、关于慢性细菌性结膜炎，哪项不正确（）

- A、自觉痒、异物感、视疲劳
- B、无假膜形成
- C、韦大量乳头性增生和滤泡形成
- D、结膜充血
- E、无眼睑水肿

答案：C

79、视网膜电图（ERG）早期诊断最有意义的疾病是（）

- A、交感性眼炎
- B、视乳头水肿
- C、糖尿病视网膜病变
- D、视网膜色素变性
- E、视网膜母细胞瘤

答案：D

80、骨性眼眶是由几块颅骨构成（）

- A、8块
- B、5块
- C、6块
- D、4块
- E、7块

答案：E

81、突然视力下降伴眼痛的眼病不包括（）

- A、急性色素膜炎
- B、视网膜脱离
- C、急性闭角型青光眼
- D、角膜炎
- E、角膜水肿

答案：B

82、决定眼球屈光成分的屈光力重要参数为（）

- A、放大率

- B、屈光度
- C、焦距
- D、像差
- E、折射率

答案：E

83、关于角膜皮样瘤，哪项不正确（）

- A、组织学上属于复层鳞状上皮
- B、表现为 Goldnhar 综合征
- C、肿物多位于颞下方球结膜及角膜缘处
- D、位于角膜中央者，要在 6 个月前手术切除，并做板层角膜移植，以防弱视
- E、皮样瘤侵入全层角膜

答案：A

84、四条直肌附着点与角膜缘的距离由近到远的顺序是（）

- A、外直肌、上直肌、下直肌、内直肌
- B、下直肌、外直肌、上直肌、内直肌
- C、内直肌、外直肌、下直肌、上直肌
- D、内直肌、上直肌、下直肌、外直肌
- E、内直肌、下直肌、外直肌、上直肌

答案：E

85、以下关于单纯疱疹病毒不正确的描述有（）

- A、初次感染后处于潜伏状态
- B、动物是 HSV 的自然宿主
- C、可造成角膜感染
- D、主要有 HSV- I 和 HSV- II 两种血清型
- E、原发感染感染常见于幼儿

答案：B

86、病变主要涉及下睑结膜的是（）

- A、过敏性结膜炎
- B、春季结膜炎
- C、有毒性乳头性结膜炎
- D、包涵体性结膜炎
- E、沙眼

答案：C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/765013333123011111>