

## 病理学(医学高级)《炎症必看题库知识点》模拟卷

姓名:\_\_\_\_\_ 年级:\_\_\_\_\_ 学号:\_\_\_\_\_

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 单项选择题：下列哪种病变属于感染性肉芽肿（ ）。A. 风湿性肉芽肿  
B. 结核性肉芽肿  
C. 脂肪坏死性肉芽肿  
D. 炎性息肉  
E. 炎性假瘤
- 单项选择题：下列哪种不是异物性肉芽肿的原因（ ）A. 手术缝线  
B. 注入的油脂  
C. 植物纤维  
D. 寄生虫  
E. 滑石粉
- 配伍题：急性化脓性炎症浸润的细胞主要为（ ）结核病时浸润的细胞常为（ ）慢性肉芽肿性炎时可能出现（ ）寄生虫感染时较多的浸润细胞为（ ）慢性炎症灶中浸润的炎细胞多为（ ）A. 淋巴细胞  
B. 嗜酸性粒细胞  
C. 单核细胞  
D. 中性粒细胞  
E. 多核巨细胞
- 单项选择题：在葡萄球菌感染的炎症反应中所见到的炎细胞主要是（ ）A. 淋巴细胞  
B. 单核细胞  
C. 嗜酸性粒细胞  
D. 肥大细胞  
E. 中性粒细胞
- 多项选择题：纤维素性炎的发生病因有（ ）A. 白喉杆菌  
B. 痢疾杆菌  
C. 肺炎双球菌  
D. 脑膜炎双球菌  
E. 尿毒症
- 名词解释炎性水肿(inflammation edema)
- 判断题：脓液的形成主要和炎症灶中的脓细胞有关。
- 多项选择题：鉴别渗出液与漏出液时常需检查（ ）A. 含盐量  
B. 含糖量

- C. 蛋白含量
  - D. 细胞数
  - E. 比重
- 9、单项选择题：脓肿最常见的致病菌是（ ）。A. 溶血性链球菌
- B. 志贺菌
  - C. 白色葡萄球菌
  - D. 金黄色葡萄球菌
  - E. 草绿色链球菌
- 10、单项选择题：患者，女，30岁，腰椎结核并在腰椎旁形成冷脓肿，破溃后流脓不断。此处已形成（ ）。A. 空洞
- B. 瘘管
  - C. 溃疡
  - D. 窦道
  - E. 糜烂
- 11、单项选择题：感染的基本病变是（ ）。A. 炎症反应
- B. 细菌引起的反应
  - C. 血管反应
  - D. 局部组织反应
  - E. 体液和细胞反应
- 12、单项选择题：下列哪项关于纤维素性炎的叙述是正确的（ ）。A. 当出现机化时引起纤维素性的粘连
- B. 其好发部位是黏膜、浆膜和肺
  - C. 肺的纤维素性炎常引起肺泡壁的破坏
  - D. 假膜常与黏膜疏松连接，易脱落
  - E. 假膜组成为纤维素、间皮细胞、白细胞和细菌
- 13、单项选择题：脓细胞是指（ ）。A. 中性粒细胞
- B. 单核细胞
  - C. 脓液中的各种化脓菌
  - D. 脓液中变性坏死的中性粒细胞
  - E. 吞噬了病原体的炎细胞
- 14、单项选择题：慢性炎症病灶内，最常出现的浸润细胞是（ ）。A. 中性粒细胞
- B. 淋巴细胞
  - C. 嗜酸性粒细胞
  - D. 嗜碱性粒细胞
  - E. 肥大细胞
- 15、单项选择题：病毒性肝炎的炎症灶内浸润的主要细胞是（ ）。A. 中性粒细胞
- B. 嗜酸性粒细胞
  - C. 淋巴细胞，单核细胞
  - D. 肥大细胞
  - E. 浆细胞
- 16、单项选择题：变质是指（ ）。A. 局部组织变性、坏疽
- B. 局部组织水肿、坏死
  - C. 局部组织变性、坏死

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/766210035002010130>