

公共卫生与预防医学考试题库

第一部分 单选题(300题)

1、损伤性废物【单选题】——

- A. 使用过的注射针头
- B. 带血的敷料
- C. 两者均是
- D. 两者均否

【答案】：A

2、下列隔离操作中哪项是错误的【单选题】——

- A. 操作过程中应用手扶好露出鼻部的口罩
- B. 用避污纸打开床旁桌上的瓶塞灌开水
- C. 测脉搏时持手表放入塑料袋内
- D. 用避污纸取回病人用过的药杯 用过的体温表放于消毒液中

【答案】：A

3、医院发现一次性使用无菌医疗用品不合格产品或质量可疑产品时，应【单选题】——

- A. 立即停止使用，与供应商联系进行退、换货处理
- B. 立即停止使用，并报告医院管理部门进行退、换货处理
- C. 可继续使用，但应注意密切观察有无不良反应发生
- D. 立即停止使用，并及时报告当地药品监督管理部门，不得自行作退、换货处理 立即停止使用，并及时报告医院管理部门，就地销毁不合格产品

【答案】：D

4、下列哪项不是医院感染的特点【单选题】——

- A. 易感人群抵抗力低，病死率高
- B.

医院中流行的菌株大多为多重耐药性

- C. 医院中病原体来源广泛
- D. 在医院感染中人群的病死率很低 在医院内一旦发生感染很容易播散

【答案】：D

5、关于医院感染的概念正确的是【单选题】——

- A. 与上次住院有关的感染不是医院感染
- B. 医院感染是指在医院内获得的感染
- C. 诊疗措施激活的潜在性感染不是医院感染
- D. 婴幼儿经胎盘获得的感染是医院感染 出院之后发生的感染一定不是医院感染

【答案】：B

6、血液净化室的医院感染管理下列哪项不正确【单选题】——

- A. 应对病人常规进行血液净化前肝功能、肝炎病原体等检查
- B. 工作人员定期体检,加强个人防护
- C. 透析器、管道应专人专用
- D. 传染病病人在隔离血液净化间内进行,专机透析 急诊病人不需固定透析机

【答案】：E

7、关于输血科预防医院内感染的措施,下列哪项是错误的【单选题】

- A. 保持环境清洁,每天清洁桌面
- B. 被血液污染的台面可用苯扎溴铵消毒处理
- C. 工作人员上岗前应注射乙型肝炎疫苗,并定期检查抗体水平
- D. 血浆置换术应在II类环境中进行并注意消毒隔离 每月对储血冰箱的内壁进行生物学监测,不得检出致病性微生物和真菌

【答案】：B

8、医院感染最常发生的部位是【单选题】——

A. 泌尿道

B.

外科切口

- C. 血液
- D. 下呼吸道 胃肠道

【答案】：D

9、发现医院感染流行趋势时,医院感染科应在多长时间内报告医院主管领导和主管部门【单选题】——

- A. 48h
- B. 36h
- C. 24h
- D. 12h 6h

【答案】：C

10、目前国内医院感染最常发生的部位是【单选题】——

- A. 泌尿道
- B. 外科切口
- C. 血液
- D. 下呼吸道 胃肠道

【答案】：D

11、下述哪项不属于微生物【单选题】——

- A. 病毒
- B. 支原体
- C. 细菌
- D. 衣原体 钩虫

【答案】：E

12、经血液、体液传播的病原体不包括【单选题】——

- A. 乙型肝炎病毒
- B. 丙型肝炎病毒
- C. 人类免疫缺陷病毒
- D. 麻疹病毒 疟原虫

【答案】：D

13、外科刷手法刷手顺序【单选题】——

- A. 手掌,指尖,甲缘,指间,腕部,前臂,肘部刷手至肘上
- B. 甲缘,指尖,指间,手掌,腕部,前臂,肘部,刷手至肘上
- C. 指间,指尖,甲缘,手掌,腕部,前臂,肘部刷手至肘上
- D. 指尖,甲缘,指间,手掌,腕部,前臂,肘部,刷手至肘上 腕部,前臂,肘部,肘上,指间,指尖,甲缘,刷手至肘上

【答案】：D

14、艾滋病感染的预防,下列哪项错误【单选题】——

- A. 晚期病人应接受保护性隔离
- B. 病人血中 CD4+T 淋巴细胞 $<0.2 \times 10^9/L$ 时应接受抗肺孢子虫感染的预防
- C. 一旦发病即应用广谱抗菌药预防全身感染
- D. 医务人员受 HIV 污染针头刺伤,应立即报告并接受药物(AZT)预防 确诊并发感染应早期抗生素治疗

【答案】：C

15、取无菌纱布的正确方法是【单选题】——

- A. 戴手套拿取纱布
- B. 以上都不是
- C. 用灭菌换药镊子夹取纱布
- D. 用无菌持物钳夹取纱布 用消毒的手指拿取纱布

【答案】：D

16、美国一护士在护理埃博拉感染患者时,也被诊断为埃博拉出血热,其属【单选题】——

- A. 外来病毒感染
- B. 非接触性感染
- C. 自患传染性疾病
- D. 医院感染 因空气造成的感染

【答案】：D

17、妊娠妇女不宜用的抗菌药物是【单选题】——

- A. 青霉素
- B. 磷霉素
- C. 林可霉素
- D. 四环素 头孢菌素

【答案】：D

18、判断某传染病患者是否为医院感染引起的主要依据是【单选题】——

- A. 临床症状期
- B. 检查结果
- C. 病程
- D. 潜伏期 传染期

【答案】：D

19、医疗废物【单选题】——

- A. 使用过的注射针头
- B. 带血的敷料
- C. 两者均是
- D. 两者均否

【答案】：C

20、重症监护病房【单选题】——

- A. $\leq 10 \leq 5 \leq 5$
- B. $\leq 200 \leq 5 \leq 5$
- C. $\leq 500 \leq 10 \leq 10$
- D. $=- \leq 15 \leq 15$

【答案】：B

21、下列哪项不属于灭菌剂【单选题】——

- A. 过氧乙酸
- B. 戊二醛
- C.

碘伏

D. 环氧乙烷 甲醛

【答案】：C

22、紫外线灯做空气消毒时,照射时间不少于【单选题】——

A. 35 分钟

B. 25 分钟

C. 15 分钟

D. 30 分钟 20 分钟

【答案】：D

23、SARS 传播最重要的途径是【单选题】——

A. 接触传播

B. 飞沫传播

C. 气溶胶传播

D. 血液-体液传播 空气传播

【答案】：B

24、下列消毒剂中属中效消毒剂的是【单选题】——

A. 戊二醛

B. 过氧乙酸

C. 氯己定

D. 臭氧 碘伏

【答案】：E

25、对怀疑医院内感染的病例取标本进行病原体检查,错误的是【单选题】——

A. 在使用抗菌药物前送标本

B. 为节约经费,应该在抗感染治疗效果不佳时取标本做病原体检查

C. 采集标本后及时送检

D. 采集标本时防止污染 接到临床标本后及时正确接种

【答案】：B

26、以下概念正确的是【单选题】——

- A. 地面应湿式清扫,保持清洁,局部有血迹等污染时局部用消毒剂处理
- B. 地面应经常用含氯消毒剂拖洗,既能消毒,又能增白
- C. 检验科的地面每天均需用消毒剂拖洗
- D. 拖洗工具使用后先洗净,再消毒,然后晾干 因为 2%戊二醛是高水平消毒剂,有条件时最好用戊二醛拖地,消毒效果好

【答案】： A

27、下列有关医院感染的管理人员培训要求描述错误的是【单选题】——

- A. 300 张床位以上的医院设医院感染管理科
- B. 1000 张床位以上的大型医院,医院感染管理专职人员的配备不得少于 10 人
- C. 300 张床位以下的医院,医院感染管理专职人员的配备不少于 1 人
- D. 300 张床位以下的医院应配备医院感染管理专职人员
300-500 张床位的医院,医院感染管理专职人员的配备不得少于 2 人

【答案】： B

28、预防免疫功能低下病人发生医院内感染不正确的是【单选题】——

- A. 注射相关疫苗
- B. 全身使用广谱抗生素预防感染
- C. 治疗局部感染病灶
- D. 保护性隔离 保护皮肤黏膜的完整性

【答案】： B

29、减少免疫功能低下者发生医院感染的措施不正确的是【单选题】——

- A. 尽量减少侵入性操作
- B.

大量应用广谱抗菌作用预防感染

- C. 积极发现和治疗局部病灶和潜在性感染
- D. 采取保护性隔离措施,切断感染途径 采用选择性脱污染措施,减少内源性感染

【答案】： B

30、根据我国下列卫生标准回答:接触皮肤的医疗用品的卫生标准是【单选题】——

- A. 必须无菌
- B. 细菌菌落总数应 $\leq 20\text{cfu/g}$ 或 $\leq 20\text{cfu}/100\text{cm}^2$,致病性微生物不得检出
- C. 细菌菌落总数应 $\leq 200\text{cfu/g}$ 或 $\leq 200\text{cfu}/100\text{cm}^2$,致病性微生物不得检出
- D. 细菌菌落总数应 $\leq 100\text{cfu/mL}$,致病性微生物不得检出 细菌菌落总数应 $\leq 300\text{cfu/mL}$,致病性微生物不得检出

【答案】： C

31、灭菌速度快、灭菌效果好、经济、环境污染小的是【单选题】——

- A. 过氧乙酸浸泡灭菌法
- B. 辐射灭菌法
- C. 戊二醛浸泡灭菌法
- D. 环氧乙烷灭菌法 压力蒸汽灭菌法

【答案】： E

32、关于使用中的灭菌剂的监测正确的是【单选题】——

- A. 生物监测每周一次
- B. 生物监测每天一次
- C. 生物监测不得检出致病微生物
- D. 化学监测每月一次 灭菌后的物品不得检出任何微生物

【答案】： E

33、传染病区中划分为清洁区的是【单选题】——
A.

走廊

- B. 洗漱室
- C. 配餐室
- D. 化验室 浴室

【答案】：C

34、用平车护送伤寒患者摄片,正确的方法是【单选题】——

- A. 协助患者直接卧于平车上
- B. 铺清洁大单于平车上,协助其卧上
- C. 协助患者卧于平车上后,再盖上一条清洁大单
- D. 患者更换清洁衣裤后,卧于平车上 将患者床单铺在平车上,协助其卧上

【答案】：B

35、护理传染病病人,在离开传染病房时要按照要求刷手。正确的刷手顺序是【单选题】——

- A. 手掌.腕部.手指.指甲.指缝.手背
- B. 腕部.前臂.手掌.手背.手指.指甲
- C. 前臂.腕部.指甲.指缝.手指.手背.手掌
- D. 手指.指甲.指缝.手背.手掌.腕部.前臂 前臂.腕部.手背.手掌.手指.指缝.指甲

【答案】：E

36、消毒药械管理中下列哪项错误【单选题】——

- A. 根据消毒的目的选用消毒药械
- B. 同一消毒剂消毒不同物品应有同一浓度
- C. 加强消毒效能监测
- D. 防止使用中的消毒剂再污染 注意影响消毒效果的因素

【答案】：B

37、使用无菌持物钳的方法哪项是错误的【单选题】——

- A. 使用时钳端朝下,不得反转向上

B. 到远处夹取物品后立即放回原处

C.

每一容器只能放一把钳子

D. 取、放钳时钳端须闭合 不可夹取油纱布

【答案】： B

38、普通手术室医护人员手表面细菌菌落总数卫生标准应【单选题】

——

A. $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$

B. $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$

C. $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$

D. $\leq 200\text{cfu}/\text{cm}^2$ $\leq 500\text{cfu}/\text{cm}^2$

【答案】： A

39、穿过皮肤或黏膜进入无菌组织或器官内部的器材应采用的消毒方式【单选题】 ——

A. 杀灭结核杆菌的消毒剂或中、低效消毒剂

B. 杀灭细菌繁殖体的消毒剂

C. 应用灭菌剂或高效消毒剂

D. 灭菌剂或物理、化学灭菌方法 应用物理灭菌方法

【答案】： D

40、根据我国卫生标准回答：接触皮肤的医疗用品【单选题】 ——

A. 必须无菌

B. 细菌菌落总数应 $\leq 20\text{cfu}/\text{g}$ 或 $\leq 20\text{cfu}/100\text{cm}^2$ ，致病性微生物不得检出

C. 细菌菌落总数应 $\leq 200\text{cfu}/\text{g}$ 或 $\leq 200\text{cfu}/100\text{cm}^2$ ，致病性微生物不得检出

D. 细菌菌落总数应 $\leq 100\text{cfu}/\text{mL}$ ，致病性微生物不得检出 细菌菌落总数应 $\leq 300\text{cfu}/\text{mL}$ ，致病性微生物不得检出

【答案】： C

41、医源性感染【单选题】 ——

A. 病原体来源于病人本身的感染

- B. 在诊疗过程中,由于器械消毒不严或制剂不纯引起的感染
- C.

病人与医生及其他病人通过直接或间接传播引起的感染

D. 病人入院时已处于另一种传染病的潜伏期,入院后发病,并传给其他病人
病人在家中已发生的感染

【答案】: B

42、目前引起下呼吸道医院感染最主要的病原体是【单选题】——

- A. 铜绿假单胞菌
- B. 链球菌
- C. 表皮葡萄球菌
- D. 卡他球菌 金黄色葡萄球菌

【答案】: A

43、护理人员为术前清洁洗肠准备所需肛管,采取煮沸消毒法,以下那项不正确【单选题】——

- A. 肛管腔内注水,用纱布包好
- B. 在沸水中持续煮沸 10min 以上
- C. 冷水时即放入计时
- D. 水沸后开始计时 先将肛管洗刷干净

【答案】: C

44、对病室进行紫外线消毒,下列做法错误的是【单选题】——

- A. 紫外线穿透性差,被消毒的物品不可有任何遮蔽
- B. 灯管使用期限不能超过 2000 小时
- C. 紫外线灯管要保持清洁透亮
- D. 为检查紫外线杀菌效果,定期进行空气细菌培养 照射前,先做好病室的清洁工作

【答案】: B

45、为节省时间,护士给传染病患者发药时所使用的下述哪一项方法是错误的【单选题】——

- A. 用过的药杯放在消毒液内浸泡
- B. 车下层放盆,内盛消毒液

- C. 按床号依次给患者服药
- D. 全病区发药完毕,按常规消毒药杯

将备好的药及水壶放在治疗车上

【答案】：C

46、当被沾有 HBsAg 阳性血的针头刺伤时,立即应做的主要处理是【单选题】——

- A. 伤口立即涂以碘酊
- B. 给受伤者立即注射丙种球蛋白
- C. 受伤者立即抽血作乙型肝炎病毒全套抗原抗体检测
- D. 乙型肝炎病毒高价免疫血清注射 乙型肝炎病毒疫苗注射

【答案】：D

47、下列哪种是最重要的医院感染的传播媒介【单选题】——

- A. 手
- B. 饮水
- C. 食品
- D. 医疗器械 衣物

【答案】：A

48、进行医院感染管理的策略研究,为卫生部提供咨询意见【单选题】——

- A. 卫生部医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：A

49、生活垃圾为【单选题】——

- A. 使用过的注射针头
- B. 带血的敷料
- C. 两者均是
- D. 两者均否

【答案】：D

50、和破损皮肤. 黏膜相接触, 而不进入无菌的组织内的器材【单选题】——

- A. 应用物理灭菌方法
- B. 杀灭细菌繁殖体的消毒剂
- C. 灭菌剂或物理. 化学灭菌方法
- D. 杀灭结核杆菌的消毒剂或中. 低效消毒剂 应用灭菌剂或高效消毒剂

【答案】： E

51、根据我国卫生标准回答: 使用中的消毒剂【单选题】——

- A. 必须无菌
- B. 细菌菌落总数应 $\leq 20\text{cfu/g}$ 或 $\leq 20\text{cfu}/100\text{cm}^2$, 致病性微生物不得检出
- C. 细菌菌落总数应 $\leq 200\text{cfu/g}$ 或 $\leq 200\text{cfu}/100\text{cm}^2$, 致病性微生物不得检出
- D. 细菌菌落总数应 $\leq 100\text{cfu/mL}$, 致病性微生物不得检出 细菌菌落总数应 $\leq 300\text{cfu/mL}$, 致病性微生物不得检出

【答案】： D

52、铺盖手术巾者应该是【单选题】——

- A. 已戴好手套的手术医生
- B. 洗完手但未泡手的手术医生
- C. 穿好手术衣但未戴手套的手术医生
- D. 泡完手但未穿手术衣的手术医生 未洗手的手术医生

【答案】： D

53、传染病院应设置在下列哪个地方【单选题】——

- A. 远离公共场所
- B. 交通便利的地方
- C. 城市中心
- D. 靠近综合性医院 水源充足的地方

【答案】： A

54、根据我国卫生标准回答以下问题:使用中的消毒剂【单选题】——

- A. 必须无菌
- B. 细菌菌落总数应 $\leq 20\text{cfu/g}$ 或 $\leq 20\text{cfu}/100\text{cm}^2$,致病性微生物不得检出
- C. 细菌菌落总数应 $\leq 200\text{cfu/g}$ 或 $\leq 200\text{cfu}/100\text{cm}^2$,致病性微生物不得检出
- D. 细菌菌落总数应 $\leq 100\text{cfu/mL}$,致病性微生物不得检出 细菌菌落总数应 $\leq 300\text{cfu/mL}$,致病性微生物不得检出

【答案】: D

55、II类区域空气消毒合格的标准是【单选题】——

- A. 细菌总数 $\leq 300\text{cfu}/\text{m}^3$,未检出致病菌
- B. 细菌总数 $\leq 400\text{cfu}/\text{m}^3$,未检出致病菌
- C. 细菌总数 $\leq 200\text{cfu}/\text{m}^3$,未检出致病菌
- D. 细菌总数 $\leq 10\text{cfu}/\text{m}^3$,未检出致病菌 细菌总数 $\leq 500\text{cfu}/\text{m}^3$,未检出致病菌

【答案】: C

56、输血科预防医院感染的措施错误的是:【单选题】——

- A. 每月对储血冰箱的内壁进行生物学监测,不得检出致病性微生物和霉菌
- B. 保持环境清洁,每天清洁桌面
- C. 血浆置换术应在II类环境中进行并注意消毒隔离
- D. 工作人员上岗前应注射乙型肝炎疫苗,并定期检查抗体水平
被血液污染的台面可用新洁尔灭消毒处理

【答案】: E

57、取无菌溶液时,下列哪项是错误的【单选题】——

- A. 倒溶液时可不顾及瓶签的朝向
- B. 用前核对瓶签
- C.

保持瓶盖内侧面无菌

D. 用后立即盖上 检查药液是否有沉淀

【答案】：A

58、对医院新建设施提出卫生学标准的审定意见【单选题】——

A. 卫生部医政司医院感染管理委员会

B. 省市卫生行政部门医院感染管理委员会

C. 医院的医院感染管理委员会

D. 医院感染管理科 临床科室以下各项工作是哪个部门的职责

【答案】：C

59、根据我国卫生标准回答:根据《综合医院建筑标准》有关的卫生学标准及预防医院内感染的要求,对医院的改建、扩建和新建提出建设性意见的应是【单选题】——

A. 国家医院感染管理咨询专家委员会

B. 省医院感染管理专家咨询委员会

C. 各级医院的医院感染管理委员会

D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：C

60、下列消毒剂中哪一种不能达到灭菌水平【单选题】——

A. 甲醛

B. 戊二醛

C. 含氯消毒剂

D. 环氧乙烷 过氧化氢

【答案】：C

61、医院感染的含义是【单选题】——

A. 所有发生在医院内的细菌感染

B. 因医疗器械消毒不严造成的感染

C. 病人在住院期间发生的感染

D.

病人在住院期间或医院职工在护理或治疗患者过程中发生的感染
医院内病人直接或间接传播引起的感染

【答案】：D

62、关于医院感染知识培训错误的是【单选题】——

- A. 培训内容包括管理知识和专业知识
- B. 非专职人员每年不少于2小时培训
- C. 培训对象包括管理、医务、工勤人员
- D. 实习医师必须培训 进修医师必须培训

【答案】：B

63、关于使用中的消毒剂、灭菌剂的监测,下列哪项是错误的【单选题】——

- A. 应进行生物和化学监测
- B. 生物监测:消毒剂每季度1次,其细菌含量必须 $<100\text{cfu/mL}$,不得检出致病性微生物
- C. 灭菌剂每月生物监测1次,不得检出任何微生物
- D. 含氯消毒剂、过氧乙酸等的浓度应每天监测 戊二醛浓度的监测应每月不少于1次

【答案】：E

64、不属于高度危险物品的是【单选题】——

- A. 腹腔镜
- B. 导尿管
- C. 体温表
- D. 穿刺针 手术器材

【答案】：C

65、须现配现用的消毒剂是【单选题】——

- A. 过氧乙酸
- B. 乙醇
- C. 苯扎溴铵

D. 纯乳酸 甲醛

【答案】：A

66、以下哪个手术属于 I 类手术【单选题】——

- A. 脑胶质瘤切除术
- B. 肛瘘切除术
- C. 胰十二指肠切除术
- D. 前列腺摘除术 肺叶切除术

【答案】：A

67、牙科手机和耐湿热、需要灭菌的口腔诊疗器械,首选灭菌方法为【单选题】——

- A. 环氧乙烷熏蒸灭菌
- B. 压力蒸汽灭菌
- C. 等离子体灭菌
- D. 化学方法进行浸泡灭菌 煮沸消毒

【答案】：B

68、根据我国卫生标准回答:对医院发生的医院内感染流行、暴发流行进行调查分析,提出控制措施,并组织实施的应是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：D

69、我国艾滋病最常见的传播途径是【单选题】——

- A. 输血和血制品
- B. 静脉注射毒品
- C. 母婴垂直传播
- D. 性传播 儿童疫苗注射

【答案】：B

70、需要采取血液-体液隔离的疾病是【单选题】——

- A. 肺结核
- B.

艾滋病

- C. 器官移植者
- D. 肺鼠疫 霍乱

【答案】：B

71、根据我国卫生标准回答:接触黏膜的医疗用品【单选题】——

- A. 必须无菌
- B. 细菌菌落总数应 $\leq 20\text{Cfu/g}$ 或 $\leq 20\text{cfu}/100\text{cm}^2$,致病性微生物不得检出
- C. 细菌菌落总数应 $\leq 200\text{cfu/g}$ 或 $\leq 200\text{cfu}/100\text{cm}^2$,致病性微生物不得检出
- D. 细菌菌落总数应 $\leq 100\text{cfu/mL}$,致病性微生物不得检出 细菌菌落总数应 $\leq 300\text{cfu/mL}$,致病性微生物不得检出

【答案】：B

72、WHO 认为医院监测的最终目标是【单选题】——

- A. 为了减少医院感染和由此所造成的损失
- B. 降低医院感染率,减少获得医院感染的危险因素
- C. 建立医院的医院感染发病率基线
- D. 利用调查资料说服医务人员遵守感染控制规范与指南 评价效果,调整和修改感染控制规范

【答案】：A

73、为阳离子表面活性剂,对阴离子表面活性剂有拮抗作用的是【单选题】——

- A. 乙醇
- B. 甲醛
- C. 苯扎溴铵
- D. 过氧乙酸 纯乳酸

【答案】：C

74、传染病房使用口罩下述哪项是错误的【单选题】——

A. 不可用污染手触碰口罩

B.

口罩必须遮住口鼻

- C. 不用时不能挂在胸前
- D. 护理严密隔离患者后,口罩污染面向内折叠,放置备用口罩潮湿应立即更换

【答案】: D

75、传染病房每间病室的病人数不应超过【单选题】——

- A. 6人
- B. 5人
- C. 4人
- D. 3人 2人

【答案】: C

76、I类、II类区域工作人员卫生手及物体表面的合格标准为【单选题】——

- A. 细菌总数 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$,未检出致病菌
- B. 细菌总数 $\leq 20\text{cfu}/\text{cm}^2$,未检出致病菌
- C. 细菌总数 $\leq 25\text{cfu}/\text{cm}^2$,未检出致病菌
- D. 细菌总数 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$,未检出致病菌 细菌总数 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$,未检出致病菌

【答案】: D

77、经血液、体液传播病原体不包括【单选题】——

- A. 麻疹病毒
- B. 乙型肝炎病毒
- C. 人类免疫缺陷病毒
- D. 疟原虫 丙型肝炎病毒

【答案】: A

78、传染病区医务人员使用的隔离衣一般情况下更换时间是【单选题】——

- A. 24h

B. 6h

C.

48h

D. 12h 72h

【答案】：A

79、B-D 试验合格的标准是【单选题】——

A. 指示图各部位颜色变化由深变浅

B. 指示图各部位颜色变化为浅灰色

C. 指示图各部位颜色变化为深黑色

D. 指示图各部位颜色变化大致均匀 指示图各部位颜色变化深浅一致均匀

【答案】：E

80、儿科病房【单选题】——

A. $\leq 10 \leq 5 \leq 5$

B. $\leq 200 \leq 5 \leq 5$

C. $\leq 500 \leq 10 \leq 10$

D. $=- \leq 15 \leq 15$

【答案】：C

81、怀疑医院感染病例取标本进行病原体检查时不正确的是【单选题】——

A. 采集标本后及时送检

B. 收到标本后及时检查

C. 尽可能做到涂片检查与病原体培养相结合

D. 为节约经费,在抗感染治疗效果不佳时取标本做病原体检查
在使用抗菌药物前送标本

【答案】：D

82、对高压蒸汽灭菌效果的监测,最可靠的方法是【单选题】——

A. 化学指示卡法

B. 生物测试法

C. 化学指示管法

D. 化学指示胶带法 留点温度计法

【答案】： B

83、根据我国下列卫生标准回答:对本地区的医院内感染管理进行技术指导的是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】： B

84、下列哪项不是医院感染病原学的特点【单选题】——

- A. 细菌是最常见的病原体,细菌的种类和分布因感染类型、医院类别、患者具体情况和采取措施不同
- B. 目前以革兰阴性杆菌为主,如肠杆菌和非发酵菌,这些细菌常有耐药性
- C. 近年来随着抗生素的大量使用,革兰阳性球菌感染,特别是耐甲氧西林金黄色葡萄球菌感染、凝固酶阴性葡萄球菌感染正在增加
- D. 厌氧菌和深部真菌是机体正常菌群常引起内源性感染 真菌感染正在减少

【答案】： E

85、医院内最多见的多重耐药菌株是【单选题】——

- A. 耐甲氧西林/苯唑西林的金黄葡萄球菌(MRSA)
- B. 耐万古霉素肠球菌(VRE)
- C. 耐万古霉素金黄色葡萄球菌(VRSA)
- D. 产超广谱酶大肠埃希菌 耐青霉素的肺炎链球菌

【答案】： A

86、对于医院感染控制指标描述错误的是【单选题】——

- A. 100~500张病床的医院,一类切口手术部位感染率应低于0.5%
- B. 100~500张病床的医院,医院感染发病率应低于8%
- C. 500张病床以上的医院,医院感染发病率应低于10%
- D. 100张病床以下的医院,一类切口手术部位感染率应低于2%

100 张病床以下的医院, 医院感染发病率应低于 7%

【答案】: D

87、用紫外线灯做空气消毒时, 照射时间不少于【单选题】——

- A. 20min
- B. 25min
- C. 15min
- D. 35min 30min

【答案】: E

88、下排气式灭菌器灭菌包体积不应大于【单选题】——

- A. 30cm×30cm×20cm
- B. 30cm×30cm×40cm
- C. 30cm×40cm×30cm
- D. 30cm×30cm×25cm 20cm×30cm×40cm

【答案】: D

89、低效消毒剂是【单选题】——

- A. 醋酸氯己定
- B. 新洁尔灭
- C. 两者均是
- D. 两者均否

【答案】: C

90、小儿流感嗜血杆菌感染首选的药物是【单选题】——

- A. 青霉素
- B. 氨苄西林
- C. 磺胺嘧啶
- D. 头孢唑啉 林可霉素

【答案】: B

91、穿过皮肤或黏膜进入无菌的组织或器官内部的器材【单选题】——

- A. 灭菌剂或物理、化学灭菌方法
- B. 应用灭菌剂或高效消毒剂
- C. 杀灭结核杆菌的消毒剂或中、低效消毒剂
- D. 应用物理灭菌方法 杀灭细菌繁殖体的消毒剂

【答案】：A

92、新生儿重症监护室对每张床位占地面积的要求是不少于一般新生儿床位的【单选题】——

- A. 1 倍
- B. 2 倍
- C. 3 倍
- D. 4 倍 5 倍

【答案】：B

93、关于地面和拖洗工具的消毒，下列哪项是正确的【单选题】——

- A. 地面应经常用含氯消毒剂拖洗，既能消毒，又能增白
- B. 因为 2%戊二醛是高水平消毒剂，有条件时最好用戊二醛拖地，消毒效果好
- C. 地面应湿式清扫，保持清洁，局部有血迹等污染时，应局部用消毒剂处理
- D. 拖洗工具使用后先洗净，再消毒，然后晾干 检验科的地面每天均需用消毒剂拖洗

【答案】：C

94、对预防传染性非典型肺炎无效的公众预防措施是【单选题】——

- A. 在通风不好或人群密集的场所戴口罩
- B. 勤洗手
- C. 讲究个人卫生
- D. 注射丙种球蛋白 不接触传染性非典型肺炎病人或临床诊

断病人

【答案】：D

95、刘某,被诊断为霍乱,对其应该采取的隔离方式是【单选题】——

- A. 消化道隔离
- B. 严密隔离
- C. 昆虫隔离
- D. 保护性隔离 呼吸道隔离

【答案】： B

96、手术区皮肤消毒的正确方法是【单选题】——

- A. 消毒范围超过手术切口 15cm
- B. 会阴部用碘酊消毒
- C. 消毒范围与备皮范围一致
- D. 用 2.5~3%的碘酊消毒 3 遍 用 95%乙醇脱碘

【答案】： A

97、黏膜消毒可使用下列哪一种药液【单选题】——

- A. 苯扎溴铵(新洁尔灭)
- B. 聚维酮碘(碘伏)
- C. 乙醇
- D. 碘酊 氯己定

【答案】： B

98、发现医院感染流行或暴发流行趋势时,进行流行病学调查的基本步骤的第一步是【单选题】——

- A. 查找感染的
- B. 证实流行或暴发
- C. 查找引起感染的因素
- D. 分析流行或暴发的原因 制定防范措施

【答案】： B

99、传染病区使用拖把的描述哪项是正确的【单选题】——

- A. 应先消毒,用 500mg/L 有效氯消毒液浸泡 30min,再用水洗干净,然后用 500mg/L 有效氯消毒液浸泡 30min,悬挂晾干备用
- B.

每次使用后清水冲洗,悬挂晾干备用

C. 先用 1000mg/L 有效氯消毒剂适量倒在污染地面 30min 后,用拖把拖干净

D. 拖把用 500mg/L 有效氯消毒液浸泡 30min 后,再洗干净,晾干备用
拖把应有明显的标记,严格分区使用

【答案】： A

100、医院感染管理中,应重点管控的传染来源是【单选题】——

A. 动物

B. 血液制品

C. 各种病人

D. 食品 病原携带者

【答案】： C

101、对门诊胃镜室使用过的纤维胃镜进行消毒,应该选择的消毒溶液是【单选题】——

A. 1%氯胺溶液

B. 5%碘伏

C. 0.1%苯扎溴铵溶液

D. 2%碱性戊二醛溶液 0.2%过氧乙酸溶液

【答案】： D

102、关于无菌器械保存液和消毒剂的描述,下列哪项是正确的【单选题】——

A. 无菌器械保存液应该是无菌的,最多允许检出少量微球菌

B. 使用中消毒剂细菌总数应 ≤ 200 cfu/mL,致病性微生物不得检出

C. 无菌器械保存液细菌总数应 ≤ 5 cfu/mL,致病性微生物不得检出

D. 使用中消毒剂细菌总数应 ≤ 10 cfu/mL,允许检出金黄色葡萄球菌

使用中消毒剂细菌总数应 ≤ 100 cfu/mL,致病性微生物不得检出

【答案】： E

103、下列关于交叉感染描述正确的是【单选题】——

- A. 在诊疗过程中,由于器械消毒不严或制剂不纯引起的感染
- B.

病人在家中已发生的感染

C. 病人入院时已处于另一种传染病的潜伏期,入院后发病,并传给其他病人

D. 病原体来源于病人本身的感染 病人与医生及其他病人通过直接或间接传播引起的感染

【答案】：E

104、需要采取肠道隔离的疾病是【单选题】——

A. 肺结核

B. 艾滋病

C. 器官移植者

D. 肺鼠疫 霍乱

【答案】：E

105、煮沸消毒灭菌时,错误的操作是【单选题】——

A. 大小相同的盆应重叠

B. 玻璃类用纱布包好

C. 物品完全浸没在水中

D. 煮沸过程中再加物品,应在第二次水沸后重新计时 有轴节的器械宜打开

【答案】：A

106、下列情况属于医院感染的是【单选题】——

A. 在皮肤、粘膜开放性伤口只有细菌定植而无临床症状或体征者

B. 由损伤而产生的炎症或由非生物因子刺激产生的炎性反应

C. 婴儿经胎盘获得的感染,如CMV,弓形虫发生在出生后48小时以内者

D. 住院中由于治疗措施而激活的感染 由于输注碳酸氢钠溶液(苏打)外渗引起的局部炎性反应

【答案】：D

107、同一病房内住有伤寒与痢疾患者,3周后伤寒患者的大便培养出痢疾杆菌,其属【单选题】——

A.

病人在家中已发生的感染

- B. 病人入院时已处于另一种传染病的潜伏期,入院后发病
- C. 病原体来源于病人本身的感染
- D. 病人之间引起的交叉感染 同时患伤寒和痢疾

【答案】：D

108、普通病房物体表面细菌菌落总数卫生标准应【单选题】——

- A. $\leq 500\text{cfu}/\text{cm}^2$
- B. $\leq 200\text{cfu}/\text{cm}^2$
- C. $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$
- D. $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$ $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$

【答案】：D

109、治疗室的管理中下列哪项错误【单选题】——

- A. 注射、治疗时,应辅无菌盘,抽出的药液存放不能超过2小时
- B. 治疗室中开启的各种溶媒不得超过24小时
- C. 治疗室中开启的无菌溶液需要4小时内使用
- D. 碘酊、乙醇瓶应保持密闭,每周更换及灭菌1~2次 经消毒后的棉球、纱布包,一经打开,保存时间不得超过48小时

【答案】：E

110、使用紫外线照射消毒,关灯后至再使用前须间隔【单选题】——

- A. 3~4min
- B. 5~6min
- C. 1~2min
- D. 7~8min 9~10min

【答案】：A

111、丙型病毒性肝炎宜采取【单选题】——

- A. 消化道隔离
- B. 呼吸道隔离
- C. 两者均是

D. 两者均不是

【答案】：D

112、目前引起输血后肝炎的主要的肝炎病毒为【单选题】——

- A. 乙型肝炎病毒
- B. 甲型肝炎病毒
- C. 戊型肝炎病毒
- D. 丙型肝炎病毒 庚型肝炎病毒

【答案】：D

113、内镜室的医院感染管理,下列哪项错误【单选题】——

- A. 内镜室应设检查区和清洗消毒区
- B. 病人进行检查前必须先做肝功能、HBV、HCV 等标记物检查
- C. 需要隔离者留于最后作检查
- D. 每例内镜使用后应用高效消毒剂进行消毒处理,每天工作结束后对内镜进行终末消毒 每天清洗消毒容器

【答案】：C

114、根据我国下列卫生标准回答:监督、指导医务人员严格执行无菌技术操作规程,合理应用抗感染药,实施对一次性医疗用品的管理等有关医院内感染管理的制度的是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：E

115、高效消毒剂是【单选题】——

- A. 醋酸氯己定
- B. 新洁尔灭
- C. 两者均是
- D. 两者均否

【答案】：D

116、病房的医院内感染管理措施中错误的是【单选题】——

- A.

感染病人与非感染病人分开

- B. 同类感染病人相对集中
- C. 特殊感染病人单独安置
- D. 室内应定时通风换气,必要时进行空气消毒 地面应常规使用含氯消毒剂消毒

【答案】：E

117、某医院收入一痢疾患者,该患者在入院时又感染了白喉杆菌,入院后发生白喉,这属于【单选题】——

- A. 交叉感染
- B. 医源性感染
- C. 自身感染
- D. 带入感染 以上都不是

【答案】：D

118、下列带入感染描述正确的是【单选题】——

- A. 病人入院时已处于另一种传染病的潜伏期,入院后发病,并传给其他病人
- B. 病原体来源于病人本身的感染
- C. 病人与医生及其他病人通过直接或间接传播引起的感染
- D. 病人在家中已发生的感染 在诊疗过程中,由于器械消毒不严或制剂不纯引起的感染

【答案】：A

119、下列概念中不正确的是【单选题】——

- A. 医院感染发病率是指一定时间内住院病人中发生医院感染新发病例的频率
- B. 医院感染暴发是指在某医院、某科室的住院病人中,短时间内、突然发生3例以上同源感染病例的现象
- C. 医院感染流行是指某医院、某科室医院感染发病率显著超过历年散发发病率水平

D. 医院感染散发是指医院感染在某医院、或某地区住院病人中历年的一般发病率水平

医院感染的流行趋势是指医院、某科室的医院感染持续流行,长时间不能控制

【答案】：E

120、关于医院感染的概念错误的是：【单选题】——

- A. 入院时处于潜伏期的感染不是医院感染
- B. 医院感染是指在医院内获得的感染
- C. 慢性感染急性发作是医院感染
- D. 与上次住院有关的感染是医院感染 婴幼儿经胎盘获得的感染不是医院感染

【答案】：C

121、卫生部对医院感染有关的检查指标中下列哪项是错误的【单选题】——

- A. 医务人员接受医院感染在职教育每年不少于6学时
- B. 常规器械消毒合格率应达100%
- C. 当证实有医院感染爆发时医院应于48小时内报告当地卫生部门
- D. 医院抗生素使用率力争小于50% 一级、二级、三级医院感染率应分别控制在 $\leq 7\%$ 、 $\leq 8\%$ 、 $\leq 10\%$

【答案】：C

122、《医院感染管理规范》对抗菌药物合理使用的要求中哪一项错误【单选题】——

- A. 提高细菌培养的送检率。促进抗菌药物合理使用水平
- B. 医院应安排抗感染专家或有经验医师负责医院抗感染药物使用的指导、咨询工作
- C. 检验科和药剂科分别负责定期公布医院主要病原菌及其药敏试验结果
- D. 有条件的医院应开展抗感染药物临床应用的监测 医院抗菌药物使用率力争控制在60%以下

【答案】：E

123、轮状病毒感染宜采取【单选题】——

- A. 消化道隔离
- B. 呼吸道隔离
- C. 两者均是
- D. 两者均不是

【答案】：A

124、MRSA 感染的最佳选药【单选题】——

- A. 去甲万古霉素、万古霉素
- B. 头孢唑林
- C. 氧氟沙星
- D. 磷霉素 阿米卡星

【答案】：A

125、下列关于自身感染的描述正确的是【单选题】——

- A. 病人与医生及其他病人通过直接或间接传播引起的感染
- B. 病人在家中已发生的感染
- C. 病人入院时已处于另一种传染病的潜伏期,入院后发病,并传给其他病人
- D. 在诊疗过程中,由于器械消毒不严或制剂不纯引起的感染 病原体来源于病人本身的感染

【答案】：E

126、消毒的含义是【单选题】——

- A. 杀灭物品上的所有微生物
- B. 杀灭物品上的芽孢
- C. 消灭包括细菌芽孢在内的各种病原微生物
- D. 消除物品上的一切污秽 消灭除细菌芽孢外的各种病原微生物

【答案】：E

127、医院污物的处理原则,下述哪项是错误的【单选题】——

- A.

防止污染扩散

- B. 分类收集
- C. 分别处理
- D. 少量医疗垃圾可与生活垃圾一同处理 尽可能采用焚烧处理

【答案】：D

128、我国医院内感染最常发生的部位是【单选题】——

- A. 泌尿道
- B. 外科切口
- C. 血液
- D. 呼吸道 胃肠道

【答案】：D

129、高度危险性物品是指【单选题】——

- A. 受到一定量病菌污染才造成危害的物品
- B. 虽有微生物污染,但一般情况下无害的物品
- C. 进入无菌组织或与破损的组织、皮肤粘膜密切接触的物品
- D. 仅和皮肤粘膜相接触,而不进入无菌的组织内的物品 直接地和健康无损的皮肤粘膜密切接触的物品

【答案】：C

130、外科刷手时间每次【单选题】——

- A. 3分钟以上
- B. 1分钟以上
- C. 2分钟以上
- D. 5分钟以上 4分钟以上

【答案】：A

131、根据我国卫生标准回答:进入组织、器官或接触破损皮肤、黏膜的医疗用品【单选题】——

- A. 必须无菌
- B. 细菌菌落总数应 $\leq 20\text{Cfu/g}$ 或 $\leq 20\text{cfu}/100\text{cm}^2$,致病性微生物不得检出

C.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/766214225232010130>