

外科护理技术考试题+答案

1、化疗最常见的不良反应是

- A、A. 造血功能障碍
- B、B. 恶心、呕吐
- C、C. 静脉炎
- D、D. 免疫抑制
- E、E. 脱发、皮肤着色

答案：A

2、未穿手术衣为腹部切口铺无菌巾的顺序是

- A、下方——对侧——上方——近侧
- B、近侧——对侧——下方——上方
- C、下方——上方——对侧——近侧
- D、上方——下方——对侧——近侧
- E、对侧——近侧——上方——下方

答案：A

3、术后恶心，呕吐的处理常采用

- A、应用抗生素
- B、注射阿托品
- C、保证水、电解质的平衡
- D、胃肠减压
- E、取平卧位

答案：B

4、早、中期食管癌常用的手术方法是

- A、食管胃转流术
- B、食管癌切除, 结肠食管重建术
- C、食管癌切除, 胃食管重建术
- D、食管癌切除, 空肠食管重建术
- E、胃造瘘术

答案：C

5、下列哪项不是术后并发症

- A、出血
- B、恶心、呕吐
- C、感染
- D、切口裂开
- E、肺不张

答案：B

6、关于低血钾的治疗，下列哪项是错误的

- A、术后禁食 2 天以上病人应补钾
- B、尿量 30ml / 小时以上可方静脉补钾
- C、静脉补钾浓度不超过 0.3%
- D、静脉补钾速度不超过 60 滴 / 分钟
- E、严重低血钾应用 10%氯化钾 20ml 静注

答案：E

7、男性，35 岁，反复大量呕吐三天，尿少，色深，伴恶心，乏力，四肢厥冷。眼窝下陷，皮肤弹性差，尿比重 1.013，血清钠 135mmol/L 体重 50kg。

安排补液顺序时应最先输注：

- A、平衡盐溶液
- B、林格液
- C、5%葡萄糖氯化钠溶液
- D、5%-10%葡萄糖溶液
- E、10%葡萄糖溶液与生理盐水 1:1 间隔

答案：A

8、用于协助诊断子宫肌瘤、葡萄胎、卵巢囊肿等疾病最常用的检查方法是

- A、A. 宫腔镜
- B、B. HCG 测定
- C、C. 超声检查
- D、D. 诊断性刮宫
- E、E. 宫颈黏液检查

答案：C

9、食管癌发病情况是

- A、男多于女, 年龄在 70 岁以上多见
- B、女多于男, 年龄在 70 岁以上多见
- C、男多于女, 年龄在 40 岁以上多见
- D、男多于女, 年龄在 50 岁以上多见
- E、女多于男, 年龄在 60 岁以上多见

答案：C

10、破伤风病人出现高热提示

- A、肺部感染
- B、败血症
- C、泌尿系感染

- D、伤口感染
- E、并发脑膜炎

答案：A

11、肺癌病人发生 Horner 综合症的原因是

- A、肿瘤压迫臂丛神经
- B、肿瘤压迫膈神经
- C、肿瘤压迫上腔静脉
- D、肿瘤压迫喉返神经
- E、肿瘤压迫颈交感神经

答案：E

12、较大的头皮血肿的治疗措施是

- A、热敷
- B、加压包扎
- C、冷敷
- D、穿刺抽出积血后加压包扎
- E、清创缝合

答案：D

13、治疗重度低渗性缺水的病人，首先应输入的液体是

- A、5%葡萄糖溶液
- B、5%葡萄糖盐水
- C、平衡盐溶液
- D、3%氯化钠溶液
- E、复方氯化钠溶液

答案：D

14、女性, 30 岁, 甲状腺手术后声音嘶哑, 是下列哪项损伤引起

- A、喉上神经损伤
- B、喉返神经损伤
- C、甲状旁腺误切
- D、气管误伤
- E、甲状腺切除过多

答案：B

15、对胸部损伤病人康复指导首要的是

- A、愉快的心情
- B、有效的呼吸、咳痰
- C、适当加强营养

D、防止便秘

E、劳逸结合

答案：B

16、等渗性缺水伴酸中毒病人,在补充碱性溶液纠正酸中毒后,可能发生

A、低钠

B、低氯

C、低钾

D、低镁

E、低钙

答案：C

17、毛某,男,38岁。外伤后出血、烦躁,肢端湿冷, P100次/min, BP98/70mmHg。应考虑为

A、无休克

B、休克早期

C、休克中期

D、休克晚期

E、DIC形成

答案：B

18、破伤风死亡原因中最多见的是

A、脱水、酸中毒

B、心搏骤停

C、窒息

D、肺炎

E、急性肾功能衰竭

答案：C

19、静脉补钾浓度一般不超过

A、5%

B、3%

C、0.9%

D、0.6%

E、0.3%

答案：E

20、成年男性体液总量占体重的百分比为

A、45%

B、50%

C、55%

D、60%

E、65%

答案：D

21、男性, 35 岁, 近半年来额部及两颞部疼痛, 用力时加重, 晨起及傍晚时较重。常伴有恶心, 有时呕吐。体检: 神志清楚, 视神经乳头边缘模糊, 静脉充盈迂曲, 视乳头略隆起, 肢体运动正常。此病人可能存在

A、视神经炎

B、颅内压增高

C、神经性头痛

D、颅脑超声波检查

E、脑膜炎

答案：B

22、女性, 38 岁, 诊断为巨大结节性甲状腺肿, 在颈丛麻醉下行一侧甲状腺次全切除术, 术后第 2 天突然发生手足持续性痉挛。进一步的检查是

A、查血清 T3 和 T4

B、查肝功能

C、查血糖

D、查血气分析

E、查血清钙、磷浓度

答案：E

23、张护士治疗过程中, 工作服上不慎沾有碘渍, 除去碘渍应选用

A、过氧乙酸

B、盐水

C、乙醇

D、过氧化氢

E、戊二醛量菌

答案：C

24、会阴部手术采用的体位是

A、侧卧位

B、俯卧位

C、仰卧位

D、截石位

E、以上都不是

答案：D

25、男性，20岁。铁钉扎伤1周后，出现张口受限，苦笑面容、角弓反张、抽出频繁，护理措施不正确的是

- A、注射破伤风抗毒素
- B、保持病室安静避光
- C、病情严重时少食多餐
- D、密切观察病情
- E、做好消毒隔离

答案：A

26、脓性指头炎手术切口应取

- A、侧面横切口
- B、掌面正中纵切口
- C、波动最明显处
- D、甲圆弧形切口
- E、侧面纵切口

答案：E

27、头外伤病人出现“熊猫眼”、嗅觉障碍、脑脊液鼻漏，可能发生了

- A、颅前窝骨折
- B、颅中窝骨折
- C、颅后窝骨折
- D、颅前、中、后窝均骨折
- E、以上都不是

答案：A

28、女性，70岁，因“下颌急性蜂窝组织炎”入院。病人颈部明显红肿、疼痛，伴严重全身感染症状，自感心慌、气紧、胸闷，口唇发绀。既往有冠心病及慢性支气管炎病史。入院予以补液、抗感染治疗。以下那样护理措施不正确：

- A、按医嘱应用镇痛剂
- B、按医嘱应用支气管解痉剂
- C、按医嘱应用青霉素
- D、按医嘱给予退热药
- E、按医嘱足量补液

答案：B

29、手术过程中，清点核对器械、敷料的时间是

- A、手术开始前和准备关体腔前
- B、手术进行时

- C、手术开始前
- D、开始缝合皮肤前
- E、手术完毕后

答案：A

30、水中毒时受影响最大，危害最重的组织是

- A、皮肤
- B、周围神经组织
- C、脑神经组织
- D、肌肉组织
- E、毛细血管

答案：C

31、恶性肿瘤最早出现的症状是

- A、A. 疼痛
- B、B. 肿块
- C、C. 出血
- D、D. 溃疡
- E、E. 梗阻

答案：B

32、男性，72岁。有55年吸烟史，患慢性阻塞性肺气肿10年。入院主诉胸闷，气促伴胸痛。体检示：血压165/90mmHg，双肺有哮鸣音，踝部有指压性凹陷。动脉血气检查示：PH7.32，PACO₂70mmHg，HCO₃⁻34mmol/L。ECG示心室纤维颤动。针对该病人的护理措施哪项不正确？

- A、解除呼吸道梗阻，改善气体交换功能
- B、半卧位
- C、静脉快速，大量补液，以纠正代谢紊乱
- D、机械除颤
- E、加强对动脉血气分析结果的动态观察

答案：C

33、脑部手术的并发症包括

- A、出血
- B、感染
- C、中枢性高热
- D、尿崩症
- E、以上都是

答案：E

34、有关硫喷妥钠的叙述，错误的是

- A、属于超短效巴比妥类药物
- B、具有抗惊厥作用
- C、用药后 1 分钟抑制大脑，消失也快
- D、醒后无任何不适
- E、适用于喉部手术和呼吸困难

答案：E

35、下列各项在空气中的浓度可用来衡量空气洁净度的是

- A、细菌
- B、有菌物
- C、菌落
- D、微粒
- E、尘埃

答案：D

36、患者，女性，32 岁。2 天前右手中指末节划伤，诊断为脓性指头炎，下列哪项护理不正确

- A、应用镇痛剂
- B、心理护理
- C、抬高患肢制动
- D、应用抗生素
- E、指导患者进行手部锻炼

答案：E

37、男性，53 岁。直肠癌手术后 2 小时，T36.9° C，P118 次/分钟，BP82/65mmHg，CVP4cmH₂O 病人烦躁不安，面色苍白，肢体冰凉。体检：下腹部膨隆，叩诊呈浊音。术后保留尿管，引流尿 25ml。实验室检查：RBC3.2X10¹² 的 12 次方/L，Hb73g/L，WBC0X10⁹ 的 9 次方/L。此时首要的处理措施是

- A、应用强心剂
- B、应用缩血管药物
- C、控制输液量和速度
- D、快速大量输液
- E、立刻手术止血

答案：E

38、术后病人开始进食 2~3 天仍未排便，下列手术哪一项或哪几项不宜过早灌肠

- A、胃手术

- B、小肠手术
- C、结肠手术
- D、脾脏手术
- E、胆道手术

答案：C

39、早期食管癌最好的诊断方法是

- A、食管拉网细胞学检查
- B、钡餐检查
- C、食管镜检查治疗
- D、颈淋巴结活检
- E、支气管镜检查

答案：C

40、女, 35 岁. 因甲状腺功能亢进症行甲状腺大部切除术. 术后流涎时, 出现误咽、呛咳, 可能是术中损伤了

- A、喉上神经内侧支
- B、喉上神经外侧支
- C、单侧喉返神经
- D、双侧喉返神经
- E、喉返神经损伤

答案：A

41、甲醛熏蒸如用于房间空气消毒, 按每立方米空间计算, 正确的是

- A、40% 甲醛 2ml, 加高锰酸钾 1g
- B、40% 甲醛 4ml, 加高锰酸钾 1g
- C、40% 甲醛 6ml, 加高锰酸钾 3g
- D、40% 甲醛 10ml, 加高锰酸钾 3g
- E、40% 甲醛 10ml, 加高锰酸钾 10g

答案：A

42、男性病人, 拟接受肛门部手术, 其手术体位应安置于

- A、俯卧位
- B、膀胱截石位
- C、侧卧位
- D、半坐卧位
- E、平卧位

答案：B

43、肿瘤的二级预防包括

- A、A. 晚期癌症姑息手术
- B、B. 戒烟限酒
- C、C. 少吃亚硝胺食物预防食管癌
- D、D. 早期发现、早期诊断和早期治疗
- E、E. 肺癌根治术后功能锻炼

答案：D

44、张医生在手术过程中不慎被缝针刺破手套，正确的做法是

- A、用 5%碘附擦拭
- B、更换手套
- C、重新洗手更换手套
- D、用 70%乙醇消毒
- E、终止手术

答案：B

45、等渗性缺水的常见原因为

- A、入水量不足
- B、慢性肠梗阻
- C、水分大量丧失
- D、大创面慢性渗液
- E、胃肠道消化液急性丧失

答案：E

46、下列手术哪项属于限期手术

- A、脾破裂
- B、胃癌切除术
- C、甲状腺大部分切除术
- D、良性肿瘤切除术
- E、绞窄性肠梗阻

答案：B

47、疝修补术后接台，不必要的步骤是

- A、先脱手术衣，后脱手套
- B、消毒肥皂液刷手 1 遍
- C、0.5%碘伏擦手和前臂 3 分钟
- D、70%酒精泡手 5 分钟
- E、穿无菌手术衣，戴干手套

答案：B

48、哪些不符合外科感染特点

- A、多属于损伤或手术有关
- B、多数是由一种细菌引起感染
- C、病变以局部炎症有关
- D、可分非特异性感染和特异性感染
- E、常需要手术治疗

答案：B

49、腹部手术后，腹腔深处需放置引流物常采用

- A、橡皮引流条
- B、橡皮引流管
- C、卷烟式引流管
- D、双腔引流管
- E、三腔引流管

答案：C

50、发生上述并发症后，首选的处理是

- A、气管插管
- B、吸氧
- C、压迫止血
- D、气管切开
- E、拆除切口缝线，敞开伤口，去除血块

答案：E

51、器械护士和巡回护士的共同职责是

- A、准备手术器械
- B、术中输液
- C、术中传递器械
- D、术前和术后清点器械、敷料等
- E、术后清洗器械

答案：D

52、颅底骨折诊断主要依据

- A、外伤病史
- B、X光片
- C、B超
- D、临床表现
- E、局部触及骨折音

答案：D

53、关于戴无菌手套、脱污染手套，错误的是

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/767014005121006041>