

2023 年助理医师资格证考试之口腔助理医师模拟试题

单选题（共 100 题）

1、属几类洞

- A. I 类洞
- B. II 类洞
- C. III 类洞
- D. IV 类洞
- E. V 类洞

【答案】 B

2、患者男性，36 岁。右侧下颌区无痛性肿胀逐渐加重八月，无疼痛及麻木感。检查见面部不对称，右侧下颌区膨隆，范围累及

- A. 颌骨骨肉瘤
- B. 颌骨骨髓炎
- C. 成釉细胞瘤
- D. 颌骨中心性癌
- E. 角化囊肿

【答案】 C

3、患者，18 岁。颌下无痛性缓慢生长圆球状肿物 3 年，大小 5cm×6cm×4cm，表面光滑，境界清，质地似面团样，可活动，无触痛，肿物不随吞咽而活动，口底黏膜下未见异常。

- A. 四头带
- B. 交叉十字绷带

- C. 颈部绷带
- D. 颅颌弹性绷带
- E. 颈腋“8”字绷带

【答案】 B

4、注重行为改变的是

- A. 健康教育
- B. 爱国卫生运动
- C. 健康促进
- D. 社会动员
- E. 卫生宣传

【答案】 A

5、口腔的部分缺损或畸形会影响言语功能，导致难以发双唇音是因为

- A. 下颌后缩或过小
- B. 舌缺失或畸形
- C. 唇裂或唇缺损
- D. 腭裂
- E. 下颌前突或过大

【答案】 A

6、患者，男，32岁。进食时左侧下颌下区肿胀、疼痛，进食后数小时方可逐渐消退。检查：左侧下颌下腺导管开口处红肿，导管呈条索状，轻压腺体导管口有少量脓液流出。

- A. 急性下颌下淋巴结炎

- B. 下颌下腺结石并发下颌下腺炎
- C. 舌下间隙感染
- D. 下颌下间隙感染
- E. 舌下腺结石

【答案】 B

7、下述为血糖的主要去路，例外的是

- A. 在细胞内氧化分解供能
- B. 转化成非必需氨基酸、甘油三酯等非糖物质
- C. 转变成糖皮质激素
- D. 转变成其它单糖及衍生物
- E. 在肝、肌肉等组织中合成糖原

【答案】 C

8、医生张某没有取得从事产前诊断的合格证书，在某医疗保健机构中从事产前诊断工作，会产生以下后果，除了

- A. 县级以上地方人民政府卫生行政部门予以制止
- B. 给予罚款的行政处罚
- C. 给予警告
- D. 承担相应的民事责任
- E. 出具的产前诊断证明视为无效

【答案】 D

9、颈总动脉分叉处约平于

- A. 舌骨大角
- B. 环状软骨上缘
- C. 环状软骨下缘
- D. 甲状软骨上缘
- E. 甲状软骨下缘

【答案】 D

10、下牙列缺失后，下颌骨改变规律中，恰当的是

- A. 颌弓前段向下、向前吸收
- B. 颌弓后段向上、向外吸收
- C. 下颌弓逐渐变小
- D. 牙槽嵴变低、变宽
- E. 腭穹隆显低、浅

【答案】 A

11、局麻时如麻醉药不慎注入腮腺，则会引起（ ）。

- A. 感染
- B. 血肿
- C. 牙关紧闭
- D. 面瘫
- E. 中毒

【答案】 D

12、肝功能衰竭患者常口服氨基苷类抗生素其目的是

- A. 预防细菌感染
- B. 对抗吸收入血的氨类的毒性
- C. 抑制肠道菌，减少氨类的生成
- D. 有利促进肝脏解毒功能的恢复
- E. 降低血中胆固醇

【答案】 C

13、给某患者拔除

- A. 注射药量过大
- B. 麻药浓度偏高
- C. 注射速度过快
- D. 神经损伤
- E. 麻药过敏

【答案】 D

14、下列各类固定桥中，对基牙的牙周组织损伤最大的是

- A. 双端固定桥
- B. 单端固定桥
- C. 半固定桥
- D. 粘结固定桥
- E. 卫生桥

【答案】 B

15、患者女，44岁。因右上后牙遇冷热敏感1周就诊。检查发现

- A. 局麻下开髓作牙髓治疗
- B. 可进行安抚治疗或间接盖髓
- C. 氢氧化钙制剂直接盖髓
- D. 聚羧酸锌粘固粉垫底永久充填
- E. 氧化锌丁香油粘固粉垫底永久充填

【答案】 B

16、男性患者，48岁，口腔溃疡反复发作，此次右颊黏膜已溃疡20天，仍疼痛不适明显。检查见牙周及牙齿健康，右颊黏膜近磨牙后垫见一深在溃疡，火山口状深至肌层，直径1cm左右，周围充血明显。拟诊断为

- A. 轻型口疮
- B. 单纯疱疹
- C. 癌性溃疡
- D. 腺周口疮
- E. 疱疹样口疮

【答案】 D

17、关于 T_m 值的说法哪一种是正确的

- A. DNA 完全变性时的温度
- B. DNA 被加热至 $70\sim 85^\circ\text{C}$ 时的黏度
- C. DNA 变性时所含的 G、C 的浓度
- D. 使 50% 的 DNA 分子变性时的温度
- E. 使 70%~80% 的 DNA 变性时的温度

【答案】 D

18、上颌第三磨牙

- A. 鼻腭神经+腭前神经+上牙槽前神经
- B. 上牙槽后神经+腭前神经
- C. 下牙槽神经+舌神经
- D. 上牙槽中神经+上牙槽后神经+腭前神经
- E. 下牙槽神经+舌神经+颊长神经拔除

【答案】 B

19、女性，56岁，诊断肺源性心脏病3年，2天前受凉后发热，咳嗽、咳痰加重，咳黄痰，呼吸困难不能平卧。查体：明显发绀，颈静脉怒张，双肺广泛散在干、湿性啰音，心率110次/分，三尖瓣区收缩期杂音，肝肋下3cm，下肢水肿。

- A. 利尿剂
- B. 强心剂
- C. 呼吸兴奋剂
- D. 有效抗生素
- E. 血管扩张剂

【答案】 D

20、口腔颌面部间隙感染的病原菌（ ）。

- A. 以金黄色葡萄球菌为主
- B. 以混合性细菌为主
- C. 以厌氧菌为主
- D. 以溶血性链球菌为主
- E. 以特异菌为主

【答案】 B

21、按桥体龈端的形态分类不包括

- A. 盖嵴式桥体
- B. 改良盖嵴式桥体
- C. 船底式桥体
- D. 接触式桥体
- E. 悬空式桥体

【答案】 D

22、患者，女，35岁。家人发现其右侧口角下垂，右眼裂变大，用力闭眼仍不能闭合。临床检查发现除上述外观表现外，右侧舌前2/3味觉迟钝，同侧舌、颊及口底黏膜较对侧均显无光泽、干燥。听力检查右侧明显较对侧差，Schirmer试验5分钟末的滤纸湿润长度仅有0.5cm。请判断该患者面神经麻痹发生的部位可能在

- A. 膝状神经节
- B. 镫骨肌与膝状神经节之间
- C. 鼓索与镫骨肌神经节之间
- D. 脑桥与膝状神经节之间
- E. 茎乳孔以外

【答案】 A

23、唇红糜烂为主要特征，病史较长可造成皮肤脱色斑使唇红一皮肤界限模糊的损害是

- A. 口腔扁平苔藓
- B. 慢性盘状红斑狼疮

- C. 多型红斑
- D. 类天疱疮
- E. 口腔白斑

【答案】 B

24、《中华人民共和国侵权责任法》于第十一届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议通过

- A. 1999年5月1日
- B. 2009年12月26日
- C. 2010年7月1日
- D. 1998年6月26日

【答案】 B

25、恒中切牙萌出后，牙冠表面有一白垩色斑块，采用

- A. 窝沟封闭
- B. 氟化物防龋
- C. 使用氯己定漱口水
- D. 预防性树脂充填
- E. 定期口腔检查

【答案】 B

26、以下关于母婴保健医学技术鉴定的说法，错误的是

- A. 对婚前医学检查或遗传病诊断有异议的，由母婴保健医学技术鉴定委员会鉴定
- B. 从事母婴保健医学技术鉴定的人员要具有主治医师以上的专业技术职务

- C. 母婴保健医学技术鉴定委员会成员须由卫生行政部门提名
- D. 母婴保健医学技术鉴定委员会分为省、市两级
- E. 医学技术鉴定时，与当事人有利害关系，可能影响公正鉴定的人员应回避

【答案】 D

27、沃森和克里克提出的 DNA 螺旋结构模型每旋转一圈的碱基对数是

- A. 8
- B. 9
- C. 10
- D. 11
- E. 12

【答案】 C

28、骨折线从梨状孔下方，牙槽突上方两侧水平方向延伸至上颌翼突

- A. LeFort I 型骨折
- B. LeFort II 型骨折
- C. LeFort III型骨折
- D. 不对称型骨折
- E. 纵行骨折

【答案】 A

29、有些人在工作中认真负责，有些人敷衍了事，有些人得过且过，这些表现在人的性格中属于（ ）。

- A. 意志特征

- B. 情绪特征
- C. 理智特征
- D. 态度特征
- E. 认知特征

【答案】 D

30、六龄齿窝沟封闭酸蚀时间为

- A. 10~20 秒
- B. 20~30 秒
- C. 30~40 秒
- D. 40~60 秒
- E. 60 秒

【答案】 B

31、一老年患者以“不能嚼碎食物，要求修复”来医院治疗，临床检查发现，口内仅有左上 1237、右上 126、左下 456、右下 4567 存在，这些牙无明显松动，无颞下颌关节及咀嚼肌不适，患者不能嚼碎食物的主要原因是

- A. 上下颌牙齿的功能性接触面积太少
- B. 因年纪大了，咀嚼食物的能力也下降了
- C. 患者不愿咀嚼食物
- D. 无法明确原因
- E. 以上都不是

【答案】 A

32、营养性巨幼红细胞性贫血选用

- A. 叶酸
- B. 维生素 B
- C. 右旋糖酐
- D. 甲酰四氢叶酸钙
- E. 右旋糖酐铁

【答案】 A

33、支配舌体运动的神经是

- A. 舌神经
- B. 舌咽神经
- C. 舌下神经
- D. 鼓索神经
- E. 下颌神经

【答案】 C

34、患者，男，64岁，因舌部肿物1年入院。检查：肿物位于左舌中段1/3侧靠近舌侧缘，肿物大小约2.5cm×2.5cm，突出舌表面，呈菜花状，右颈部扪及肿大淋巴结。为明确诊断，需进一步检查，最有意义的是

- A. 头颈部 CT
- B. 活检
- C. 颈部 B 超
- D. 颌骨 X 线片
- E. 头颈部 MRI

【答案】 B

35、慢性复发性腮腺炎腮腺造影的典型表现是（ ）。

- A. 导管扩张呈腊肠状
- B. 分支导管可见充盈缺损
- C. 分支导管造影剂外溢
- D. 末梢导管点状扩张
- E. 分支导管扩张

【答案】 D

36、患者，男，40岁。因急性阑尾炎住院治疗，手术后，主管医生为了使患者尽快恢复，给患者使用了一种比较贵的新型抗生素，但并没有同患者商量。患者恢复很快，几天后就可出院。出院时，患者发现自己需付上千元的药费，认为医生没有告诉自己而擅自做主，自己不应该负担这笔钱。在这个案例中，医生损害了患者的

- A. 知情同意权
- B. 疾病的认知权
- C. 平等的医疗权
- D. 要求保护隐私权
- E. 病人的参与权

【答案】 A

37、关于慢性复发性腮腺炎的叙述，哪项是错误的

- A. 压迫腺体可从导管口流出“雪花样”唾液
- B. 发生于儿童者极少自愈
- C. 成人复发性腮腺炎为儿童复发性腮腺炎迁延未愈而来
- D. 全身症状不明显

E. 涎腺造影可见末梢导管点状、球状扩张，排空迟缓

【答案】 B

38、腮腺导管的体表投影为

A. 外耳孔至鼻翼与口角之间中点连线的中 1 / 3 段

B. 耳屏至鼻翼与口角之间中点连线的中 1 / 3 段

C. 鼻翼与口角连线的中点至耳垂连线的中 1 / 3 段

D. 外耳孔至鼻翼连线的中 1 / 3 段

E. 耳垂至鼻翼连线的中 1 / 3 段

【答案】 C

39、患儿 7 岁，主诉左下后牙有龋洞，冷热疼痛，无自发疼。查左下第一恒磨牙深龋洞，叩诊（-），牙龈正常。X 线片示牙根发育 8 期，骨硬板连续。处理去除大部分腐质，近中髓角去腐质时穿髓 1mm，穿髓孔探疼。应选何种治疗方法

A. 活髓切断术

B. 直接盖髓术

C. 拔髓术

D. 根尖诱导成形术

E. 封金属砷后根管治疗

【答案】 B

40、某女性患者，23 岁，2 个月前因外伤致一上前牙脱落，今要求烤瓷修复。口腔检查：

A. 桩冠局部义齿

- B. 覆盖义齿
- C. 桩核与双端固定桥
- D. 根内固位体固定桥
- E. 以上都不是

【答案】 C

41、在腮腺浅叶前缘由上到下依次为

- A. 面神经颞支，面神经上颊支，腮腺导管，面神经下颊支
- B. 面神经颞支，面神经上颊支，腮腺导管，面神经下颊支，下颌缘支
- C. 面动脉，面横动脉，面神经颞支，腮腺导管
- D. 面横动脉，面神经颞支，面神经上颊支，腮腺导管，面神经下颊支，面神经下颌缘支
- E. 面神经颞支，面横动脉，面神经上颊支，腮腺导管，面神经下颊支

【答案】 D

42、不参加脂肪酸 β 氧化的酶是

- A. 脂酰 CoA 脱氢酶
- B. 烯脂酰 CoA 水化酶
- C. β 酮脂酰 CoA 硫解酶
- D. β 酮脂酰 CoA 转移酶
- E. β 羟脂酰 CoA 脱氢酶

【答案】 D

43、制定国家艾滋病监测规划和方案的机构是

- A. 全国人大常委会
- B. 国务院办公厅
- C. 卫生部
- D. 国务院
- E. 全国人民代表大会

【答案】 C

44、可以激活丙酮酸羧化酶活性的是

- A. 柠檬酸
- B. 乙酰辅酶 A
- C. 异柠檬酸
- D. 磷酸二羟丙酮
- E. 脂肪酰辅酶 A

【答案】 B

45、5mol 葡萄糖酵解生成乳酸时净生成 ATP 的摩尔数为

- A. 10mol
- B. 5mol
- C. 25mol
- D. 20mol
- E. 15mol

【答案】 A

46、舌下腺囊肿手术根治方法的关键点是

- A. 抽出囊液，注射 2%碘酊
- B. 摘除囊肿与舌下腺组织
- C. 摘除舌下腺组织
- D. 摘除囊肿组织
- E. 摘除颌下腺

【答案】 C

47、甲类传染病是指

- A. 炭疽、霍乱
- B. 鼠疫、炭疽
- C. 黑热病、炭疽
- D. 鼠疫、霍乱
- E. 鼠疫、狂犬病

【答案】 D

48、拔除过程中可使用旋转力的牙齿是

- A. 上颌双尖牙
- B. 下颌第三磨牙
- C. 下颌双尖牙
- D. 上颌第二磨牙
- E. 下颌中切牙

【答案】 C

49、女性，45岁。因左侧面颊部皮肤及左侧舌部黏膜发红、起疱3天，伴剧痛来诊。查体：体温38.5℃，左侧面部皮肤及左侧舌背、颊黏膜可见粟粒大小的密集成片的透明水疱，周围皮肤黏膜可见充血性红斑。化验：WBC $7.8 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞0.62，淋巴细胞0.34。拟诊断为带状疱疹。

- A. 三叉神经第一支
- B. 三叉神经第二支
- C. 三叉神经第三支
- D. 面神经
- E. 颈神经

【答案】 C

50、患者，女性，30岁。固定义齿粘固后半个月，近2天刷牙时有少量出血。无其他症状。检查：61缺失，571为桥基牙，冠边缘在龈缘下与牙体组织贴合良好。451之间牙线可顺利通过，乳突处有少量食物滞留，龈红肿。引起牙龈出血的原因是

- A. 冠边缘刺激牙龈
- B. 接触点松
- C. 冠外形不好
- D. 患者未认真刷牙
- E. 对颌牙有楔入式牙尖

【答案】 B

51、患者主诉刷牙出血数月，查见牙不松动，牙龈红肿，牙周探诊深度 $\leq 3mm$ ，牙石（++），探诊出血，最佳处理方案应是（ ）。

- A. 服用阿莫西林和甲硝唑
- B. 口腔卫生宣教和龈上洁治术
- C. 口腔卫生宣教、龈上洁治术、根面平整术

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/767164014025006041>