

助理医师考试临床助理(习题卷125)

说明：答案和解析在试卷最后

第1部分：单项选择题，共100题，每题只有一个正确答案，多选或少选均不得分。

1. [单选题]下列临床情况最易引起急性左心衰竭的是

- A) 频发室性期前收缩
- B) 二尖瓣腱索断裂
- C) 一级高血压
- D) 反复发作的肺栓塞
- E) 慢性持续性房颤

2. [单选题]女性，45岁，8个月来双侧掌指和指间关节肿痛伴晨僵，饮食正常，下肢不肿，X线片见关节间隙变窄，X线胸片见两侧少量胸腔积液。此病人出现胸腔积液的最大可能是

- A) 类风湿关节炎性胸膜炎
- B) 系统性红斑狼疮性脑膜炎
- C) 结核性胸膜炎
- D) 低蛋白血症
- E) 右心衰竭

3. [单选题]男性，30岁，颜面浮肿3天，无力，尿400ml / 24h，血压130 / 80mmHg，?血红蛋白130g / L，尿蛋白(+++)，红细胞20~40个 / HP，颗粒管型0~2个 / HP，可能性最大的诊断是

- A) 隐匿性肾炎
- B) 急进性肾炎
- C) 急性肾炎
- D) 慢性肾炎
- E) 肾盂肾炎

4. [单选题]阿托品治疗有机磷杀虫药中毒时，无法缓解的临床表现是()。

- A) 呼吸困难
- B) 肌束震颤
- C) 流涎
- D) 腹痛
- E) 多汗

5. [单选题]胸骨右缘第2肋间可触及收缩期震颤见于

- A) 动脉导管未闭
- B) 三尖瓣关闭不全
- C) 主动脉瓣狭窄
- D) 二尖瓣狭窄
- E) 肺动脉瓣狭窄

6. [单选题]癌症的易感性格为

- A) A型行为

- B) B型行为
- C) C型行为
- D) D型行为
- E) A+C型行为

7. [单选题] 激素测定用于诊断内分泌疾病，目的是为确定（ ）。

- A) 部位
- B) 病原
- C) 病因
- D) 功能
- E) 病理

8. [单选题] 有关心动周期的叙述，哪项是错误的

- A) 心动周期缩短时，收缩期与舒张期均等缩短
- B) 如心率为75次/分，心动周期历时0.8秒
- C) 是指心脏机械活动周期
- D) 心率增快，心动周期缩短
- E) 房缩期为0.1秒，室缩期为0.3秒，全心舒张期为0.4秒

9. [单选题] 男患者，20岁，3周前腹泻，2天后症状好转未介意。1天前晨起自觉四肢无力及双小腿疼痛，渐加重，家人发现双睑闭合不全，但无吞咽困难，二便正常。入院查体：神清，言明，双侧周围性面瘫，四肢肌力Ⅱ级，肌张力低，无明显感觉障碍。此病人如出现严重呼吸困难、痰多、发绀、呼吸肌麻痹，应尽早

- A) 吸痰
- B) 吸氧
- C) 气管切开
- D) 胸外人工呼吸
- E) 应用呼吸兴奋剂

10. [单选题] 重症肌无力最常受累的肌肉是

- A) 四肢肌
- B) 眼外肌
- C) 咽喉肌
- D) 咀嚼肌
- E) 面肌

11. [单选题] 直肠肛管周围脓肿

- A) 排便可加重肛门疼痛，伴大便带鲜血
- B) 肛周肿痛伴发热
- C) 反复发作的肛周红肿疼痛，窦道外口流出脓性分泌物
- D) 肛门疼痛，伴有局部暗紫色肿块
- E) 排便时出血、无痛

12. [单选题] 高血压病Ⅱ级眼底表现是

- A) 眼底正常
- B) 视网膜动脉变细
- C) 眼底出血渗出
- D) 视网膜动脉变窄，动静脉交叉压迫
- E) 眼底出血伴视乳头水肿

13. [单选题] 一患者，颈椎高位骨折脱位，入院第2天时并出现呼吸困难时，最先采取的措施是

- A) 气管切开

- B) 手术切开复位
- C) 吸氧
- D) 行MRI检查以明确损伤位置和程度
- E) 手法复位

14. [单选题]人本主义常利用的方法为

- A) 梦的分析
- B) 生物反馈
- C) 系统脱敏
- D) 真诚同感
- E) 满灌疗法

15. [单选题]标准口服葡萄糖耐量试验葡萄糖负荷量应为

- A) 60g
- B) 65g
- C) 70g
- D) 75g
- E) 80g

16. [单选题]特发性血小板减少性紫癜的首选治疗为

- A) 抗纤溶药物
- B) 免疫抑制剂
- C) 糖皮质激素
- D) 脾切除
- E) 氨肽素

17. [单选题]女，23岁。白带增多1周，有不洁性交史，妇科检查：小阴唇内侧见多个小菜花赘生物。为确诊应进行的辅助检查是（ ）。

- A) 白带革兰染色检查
- B) 宫颈刮片细胞学检查
- C) 血常规，尿常规检查
- D) B超检查
- E) 赘生物组织检查

18. [单选题]颅骨凹陷性骨折的好发部位为

- A) 枕骨
- B) 额骨和顶骨
- C) 颞骨
- D) 乳突区
- E) 颞骨鳞部

19. [单选题]交界性肿瘤是指

- A) 既有癌组织、又有肉瘤组织的肿瘤
- B) 既有鳞癌、又有腺癌的肿瘤
- C) 既有上皮组织、又有间叶组织的肿瘤
- D) 介于良性和恶性之间的肿瘤
- E) 以局部浸润为主要特点的低度恶性肿瘤

20. [单选题]副作用是

- A) 预料以外的作用
- B) 由于病人有遗传缺陷而产生的作用

C) 停药后出现的作用

D) 药物在治疗剂量下出现的与治疗目的无关的作用，常是难以避免的

E) 应用药物不恰当而产生的作用

21. [单选题] 男性，30岁，慢性肾炎，浮肿少尿1月，呕吐3天，血压160 / 90mmHg，两肺底散在水泡音，颈静脉怒张，BUN40mmol / L，血钾6.5mmol / L，最宜采用

A) 5%碳酸氢钠

B) 0.9%生理盐水

C) 50%葡萄糖

D) 血液透析

E) 以上都不是

22. [单选题] 37岁，已婚，农村妇女，2年来感下腹隐痛不适。12小时前突起转移性右下腹痛，伴恶心，呕吐，发热，查右下腹明显压痛，反跳痛，肌紧张，血常规WBC $17 \times 10^9 / L$ ，N0.88，尿常规无异常。应诊断为

A) 急性阑尾炎并腹膜炎

B) 胃十二指肠溃疡穿孔腹膜炎

C) 急性胃肠炎

D) 盆腔炎

E) 泌尿系感染

23. [单选题] 70岁老年男性患者，左侧腹股沟突出半球形包块。不降入阴囊，咳嗽冲击试验阴性，易还纳，应诊断为

A) 鞘膜积液

B) 隐睾

C) 股疝

D) 斜疝

E) 直疝

24. [单选题] 20世纪50年代，发现某省部分地区居民长期应用高碘水，导致高碘性甲状腺肿，随机抽查该地区的甲、乙两村常住居民的高碘性甲状腺肿患病率，甲村为20.6%，乙村为25.3%。则甲乙村该病合计患病率为（ ）。

A) 甲乙两村调查人群中患该病总人数除以调查总人数

B) 两患病率的集合平均数，得29.11%

C) 两患病率相加，得45.9%

D) 两患病率相乘，得5.21%

E) 两患病率的平均数，为22.95%

25. [单选题] 支气管肺炎重症往往出现

A) 代谢性碱中毒

B) 混合性酸中毒

C) 呼吸性碱中毒

D) 呼吸性酸中毒

E) 代谢性酸中毒

26. [单选题] 下列属于假药的是

A) 超过有效期的

B) 不标明或者更改生产批号的

C) 未标明有效期或者更改有效期的

D) 国务院药品监督管理部门规定禁止使用的

E) 直接接触药品的包装材料和容器未经批准的

27. [单选题] 在调查研究中，先将总体按照某种特征分成若干组群，然后在每组群中进行随机抽样的方法为（ ）。

A) 分层抽样

- B) 系统抽样
- C) 整群抽样
- D) 单纯随机抽样
- E) 普查

28. [单选题] 子宫颈原位癌与不典型增生的鉴别主要在于原位癌

- A) 细胞排列极向消失
- B) 细胞具有异型性
- C) 累及上皮全层
- D) 细胞增生活跃，层数增多
- E) 增生细胞表层为不全角化层

29. [单选题] 下列关于记述伦理学的提法中，正确的是

- A) 研究行为的善恶
- B) 制定善恶的标准
- C) 对道德现象进行经验性描述和再现
- D) 研究伦理学的性质
- E) 制定行为的规范

30. [单选题] 从情感范畴来看，廉洁奉公是一种

- A) 责任感
- B) 道德感
- C) 美感
- D) 理智感
- E) 情操

31. [单选题] 单纯慢性左心衰最常见的临床表现是

- A) 黄疸
- B) 少尿
- C) 下肢水肿
- D) 劳力性呼吸困难
- E) 咳粉红色泡沫样痰

32. [单选题] 引起支气管平滑肌舒张的肾上腺素能受体为

- A) α
- B) $\beta 1$
- C) $\beta 2$
- D) M
- E) N1

33. [单选题] 临终病人的一般心理变化规律是

- A) 愤怒期、否认期、抑郁期、妥协期、接受期
- B) 否认期、愤怒期、妥协期、接受期、抑郁期
- C) 愤怒期、否认期、妥协期、抑郁期、接受期
- D) 否认期、妥协期、愤怒期、接受期、抑郁期
- E) 否认期、愤怒期、妥协期、抑郁期、接受期

34. [单选题] 反映体内储备铁的指标是

- A) 血清铁
- B) 血清铁蛋白
- C) 总铁结合力

- D) 血红蛋白
- E) 转铁蛋白

35. [单选题] 男性，50岁，突然呼吸困难，咳粉红色泡沫样痰，呼吸急促，检查：血压190/110mmHg，心率110次/分，律齐，无杂音，双肺底湿性啰音，该患者的最佳治疗药物是

- A) 硝酸甘油
- B) 氨茶碱
- C) 毛花苷C（西地兰）
- D) 硝普钠
- E) 多巴酚丁胺

36. [单选题] 下列胃癌组织学类型中，哪种分化最好

- A) 管状腺癌
- B) 硬癌
- C) 髓样癌
- D) 粘液癌
- E) 印戒细胞癌

37. [单选题] 心理治疗的主要手段不包括

- A) 宣泄
- B) 教导
- C) 通情
- D) 增强自信心
- E) 强化自我控制

38. [单选题] 男性，25岁，腹部被倒墙压伤，中腹部剧痛，伴呕吐3小时，血压120/86mmHg，体温38℃，腹胀，肌紧张，压痛，反跳痛阳性，肠鸣音消失。最可能的诊断是（ ）。

- A) 腹壁挫伤
- B) 腹膜后血肿
- C) 肝破裂
- D) 小肠破裂
- E) 右肾挫伤

39. [单选题] 惊厥持续状态的处理，错误的是

- A) 尽快找出病因
- B) 吸氧
- C) 禁用甘露醇
- D) 首先地西洋止惊
- E) 积极降温

40. [单选题] 女，70岁。反酸，烧心一年，时轻时重，胃镜结果：食管下段可见条状糜烂。最适合的治疗是（ ）。

- A) 奥美拉唑
- B) 雷尼替丁
- C) 碳酸镁
- D) 枸橼酸铋钾
- E) 西咪替丁

41. [单选题] 酚妥拉明药理作用叙述不正确的是

- A) 血压下降
- B) 具有阻断血管平滑肌 α_1 受体的作用
- C) 外周血管阻力降低

- D) 能使血管舒张
- E) 静脉和小静脉收缩明显

42. [单选题] 女，2岁。因智力低下就诊，查染色体核型为46, XX, -21, +t(21q21q)，其母亲核型为45, XX, -21, -21, +t(21q21q)。若再生育，其下一代发生本病的风险为

- A) 10%
- B) 50%
- C) 25%
- D) 75%
- E) 100%

43. [单选题] 男性，42岁，喘息发作4小时来诊，为了鉴别是否为上气道梗阻最为简便的方法是

- A) 描绘MEFV曲线
- B) 胸部CT
- C) 拍摄X线胸片
- D) 判断哮鸣音发生于呼气相还是吸气相
- E) 纤维支气管镜检查

44. [单选题] 溃疡性结肠炎（重症）

- A) 利福平
- B) 糖皮质激素
- C) 奥美拉唑
- D) 柳氮磺胺吡啶
- E) 左羟氨苄青霉素

45. [单选题] 心因性呼吸困难最常见的呼吸形式是

- A) 呼气性呼吸困难
- B) 叹息样呼吸
- C) 吸气性呼吸困难
- D) 呼吸过缓
- E) 潮式呼吸

46. [单选题] 急性心包炎的心电图改变为

- A) 常规12个导联（除aVR外），皆出现ST段呈弓背向下抬高
- B) 出现病理性Q波
- C) 各导联ST段呈弓背向上抬高
- D) 与冠状动脉所支配区域相应的导联上出现弓背向上的ST段抬高
- E) 与冠状动脉所支配区域相应的导联上出现ST段水平下降

47. [单选题] 男，23岁。主诉自高中毕业后，越来越不能与人发生近距离的接触，近一年来发展为与熟人甚至自己的父母说话也紧张，总怕说错话。对于该患者，心里治疗首选的方法为

- A) 生物反馈
- B) 自由联想
- C) 系统脱敏
- D) 催眠治疗
- E) 梦的分析

48. [单选题] 关于癫痫治疗减药停药的原则不正确的是

- A) 全面强直-阵挛发作完全控制4~5年后，方可考虑减药
- B) 失神发作停止半年后，方可考虑减药
- C) 减药应缓慢

- D) 有自动症患者可能需要长期服药
- E) 强直性发作、阵挛性发作完全控制1年后，可考虑减药

49. [单选题]自律性最高的部位是

- A) 窦房结
- B) 心房肌
- C) 房室交界
- D) 浦肯野纤维
- E) 房室束

50. [单选题]研究某种药物对某种疾病的治疗效果时，研究对象应选择

- A) 患该疾病人群中有代表性的样本
- B) 未患该疾病人群中有代表性的样本
- C) 身体健康的人群作为对照组
- D) 患该疾病人群中症状较轻的病人
- E) 样本中男女人数相等

51. [单选题]磷酸戊糖途径的主要生理意义在于

- A) 提供能量
- B) 生成磷酸丙糖
- C) 糖代谢联系的枢纽
- D) 将NADP⁺还原成NADPH
- E) 为氨基酸合成提供原料

52. [单选题]干性支气管扩张是指

- A) 反复咯血、无咳嗽、咳痰，其发生部位引流不畅
- B) 反复咯血、无咳嗽、咳痰，其发生流良好
- C) 反复痰中带血、但痰极少，流良好
- D) 反复咳嗽、大量脓血痰，其发生部位多位于下叶
- E) 反复咯血、干咳，其发生部位多位于右下基底段

53. [单选题]因抢救危急患者，未能及时书写病历的，有关医务人员应在抢救结束后多长时间内据实补记

- A) 6小时
- B) 2小时
- C) 4小时
- D) 12小时
- E) 8小时

54. [单选题]B肝性脑病注射支链氨基酸的主要作用是

- A) 减少肠道内氨的形成和吸收
- B) 纠正氨基酸不平衡
- C) 降低门静脉压力
- D) 纠正电解质紊乱
- E) 纠正酸碱平衡紊乱

55. [单选题]非竞争性拮抗药

- A) 不降低激动药的最大效应
- B) 使激动药量效反应曲线右移，且能抑制最大效应
- C) 使激动药的量效反应曲线平行右移
- D) 与激动药作用于不同受体
- E) 与激动药作用于同一受体

56. [单选题]表明中国古代医德学已进入近、现代医学伦理学阶段的是宋国宾主编的

- A) 生命伦理学
- B) 生态伦理学
- C) 护理伦理学
- D) 医业伦理学
- E) 普通伦理学

57. [单选题]幼儿急疹的好发年龄是

- A) 3个月内
- B) 3~9个月
- C) 6~18个月
- D) 2~3岁
- E) 3岁以上

58. [单选题]颅前窝骨折

- A) 鼻流血
- B) 双眼睑皮下青紫，逐渐加重，出现熊猫眼征
- C) 乳突下瘀血斑出现Battle征
- D) 脑脊液耳漏
- E) 颞部头皮肿胀淤血

59. [单选题]雷贝拉唑的主要作用机制是

- A) 中和胃酸
- B) 抑制胃酸分泌
- C) 阻断胃泌素受体
- D) 促进胃排空
- E) 黏膜保护作用

60. [单选题]用于解救麻醉性镇痛药急性中毒的药物是

- A) 哌替啶
- B) 芬太尼
- C) 美沙酮
- D) 哌罗美辛
- E) 纳洛酮

61. [单选题]患者女性，24岁。停经58天，13天前行人工流产吸宫术。术后持续阴道流血。并有轻微腹痛。为明确诊断，首先应选用的辅助检查方法是

- A) A型超声检查
- B) 血常规检查
- C) 腹腔镜检查
- D) HBG测定
- E) 宫腔镜检查

62. [单选题]支气管扩张症合并咯血时治疗一般不主张应用

- A) 止血药
- B) 抗生素
- C) 镇静药
- D) 支气管扩张药
- E) 镇咳药

63. [单选题]有关水肿的论述不正确的是

- A) 心源性水肿好发于肢体下垂部位
- B) 肾源性水肿多见于眼睑等皮下组织疏松的部位
- C) 严重水肿时可以出现胸腔或腹腔积液
- D) 大量腹水时，不论有无下肢或骶部的水肿都属于重度水肿
- E) 黏液性水肿为非可凹性水肿

64. [单选题]男，20岁。3天前受凉后出现咳嗽、咳白黏痰，发热39℃，胸片示左下肺大片渗出影，予青霉素静脉滴注。如有效则最先出现的是（ ）。

- A) 胸片示片状阴影消散
- B) 咳嗽好转
- C) 体温降至正常
- D) 痰色转黄
- E) 痰量减少

65. [单选题]21-三体综合征染色体核型分析最多见的是（ ）。

- A) 46, XX (XY)
- B) 47, XX (XY), +21
- C) 46, XX (XY), -14, +t (14q21q)
- D) 46, XX (XY), -21, +t (21q21q)
- E) 46, XX (XY) /47, XX (XY), +21

66. [单选题]下列关于脑干的描述正确的是

- A) 由脑桥和延髓组成
- B) 脑干的背面与大脑相连
- C) 12对脑神经根依次在脑干出入
- D) 延髓上接脑桥下连脊髓
- E) 中脑上接间脑下连延髓

67. [单选题]有关畸胎瘤的描述，错误的是

- A) 好发于卵巢、睾丸
- B) 由两个胚层以上的组织构成
- C) 未成熟型可见原始神经组织
- D) 多呈囊性，囊内充满油脂、毛发
- E) 肿瘤起源于生发上皮

68. [单选题]在肾损失盐时，一般可见到的情况是

- A) 等张性高水化状态
- B) 等张性脱水
- C) 高张性脱水
- D) 低张性高水化状态
- E) 低张性脱水

69. [单选题]钟摆律（或胎心律）不出现于

- A) 长期发热
- B) 严重休克
- C) 急性心肌梗死
- D) 心动过速
- E) 心肌肥厚

70. [单选题]男性，28岁，因江水泛滥，饮用江水，突然出现剧烈腹泻，随后呕吐，由水样物转为“米泔水”样物，最

可能的诊断是

- A) 金葡菌胃肠炎
- B) 急性细菌性痢疾
- C) 大肠杆菌性肠炎
- D) 病毒性肠炎
- E) 霍乱

71. [单选题]卡比多巴治疗帕金森病的机制是

- A) 抑制中枢氨基酸脱羧酶的活性
- B) 抑制外周氨基酸脱羧酶的活性
- C) 抑制多巴胺的再摄取
- D) 激动中枢多巴胺受体
- E) 激动外周多巴胺受体

72. [单选题]男性，68岁，20年前有“肝功能异常”史，高血压15年，4年前患心肌梗死。突发呕血500ml，黑便2次，共500g。查体：血压110/70mmHg，脉搏96次/分，巩膜明显黄染，腹部膨隆，腹部移动性浊音阳性。可能的诊断为

- A) 急性胃黏膜病变
- B) 消化性溃疡出血
- C) 食管静脉曲张破裂出血
- D) 胃癌出血
- E) 食管癌出血

73. [单选题]使胃蛋白酶原转变成胃蛋白酶的刺激物是

- A) NA^+
- B) Cl^-
- C) K^+
- D) hCl
- E) 内因子

74. [单选题]对苯海索的叙述，哪项是错误的

- A) 对帕金森病疗效不如左旋多巴
- B) 对氯丙嗪引起的震颤麻痹无效
- C) 对僵直和运动困难疗效差
- D) 外周抗胆碱作用比阿托品弱
- E) 阻断中枢胆碱受体

75. [单选题]男，50岁。3个月前因肺癌行手术治疗。10天来感气短、下肢水肿。1天来症状加重。查体：BP105/84mmHg，呼吸急促，颈静脉怒张，双肺未闻及啰音，心界两侧扩大，HR120次/分，心音遥远，有奇脉，肝脏肋下2cm，下肢水肿。心电图示窦速。该患者诊断为

- A) 心包压塞
- B) 心力衰竭
- C) 呼吸衰竭
- D) 心动过速
- E) 上腔静脉综合征

76. [单选题]关于骨折愈合的标准中，下列哪一项不正确

- A) X线片显示骨折线模糊，有连续骨痂通过骨折线
- B) 连续观察2周，骨折不变形
- C) 局部无压痛及纵向叩击痛
- D) 骨折后已满100天
- E) 局部无反常活动

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/768141044113006072>