

中耳炎的诊断与治疗

汇报人：xxx
2023-12-13





contents

目录

- 中耳炎概述
- 诊断方法
- 治疗原则与方法
- 并发症预防与处理
- 康复管理与随访安排
- 总结与展望

01

中耳炎概述

定义与分类



定义

中耳炎是指发生在中耳部位的炎症，通常是由于感染引起。



分类

中耳炎可分为急性中耳炎、慢性中耳炎和分泌型中耳炎等类型。



发病原因及危险因素



发病原因

常见的发病原因包括细菌感染、病毒感染、咽鼓管功能障碍等。

危险因素

婴幼儿、免疫力低下人群、长期吸烟者等是患中耳炎的高危人群。

临床表现与分型

01



急性中耳炎



表现为耳痛、听力下降、
耳鸣、发热等症状，鼓膜
充血、肿胀。

02



慢性中耳炎



表现为长期或反复发作的
耳流脓、听力下降等症状，
鼓膜穿孔。

03



分泌型中耳炎



表现为听力下降、耳闷胀
感等症状，鼓膜无明显充
血但内陷，鼓室有积液。

02

诊断方法



病史采集与体格检查



病史采集

详细询问患者病史，包括症状出现时间、持续时间、伴随症状等。



耳部检查

观察外耳道及鼓膜情况，注意有无红肿、溢液等异常表现。



鼻部检查

检查鼻腔通畅情况，排除鼻窦炎等可能导致中耳炎的病变。



听力检查

纯音测听

评估患者气导和骨导听力损失情况，了解听力受损程度。

声导抗测试

检测中耳传音结构功能，辅助诊断中耳炎类型。



影像学检查

颞骨CT扫描

观察中耳腔内病变情况，如听骨链破坏、鼓室积液等。

MRI检查

评估内耳及颅内病变，排除其他原因引起的听力下降。



03

治疗原则与方法

药物治疗

抗生素

针对细菌感染引起的中耳炎，医生通常会开具抗生素药物，如头孢菌素、红霉素等，以清除感染。



消炎止痛药

对于耳朵疼痛和炎症，医生可能会开具消炎止痛药，如布洛芬等，以缓解症状。



耳滴剂

对于外耳道感染或炎症，医生可能会建议使用耳滴剂，如醋酸可的松等，以减轻炎症和疼痛。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/775203220130011222>