

心血管外科考试试题(一)

一、单选题（本大题 100 小题，每题 1.0 分，共 100.0 分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

第 1 题

肺动脉瓣狭窄，哪一种检查手段可确诊

- A 心电图
- B 拍心脏 X 线片
- C 右心导管检查
- D 心脏听诊
- E 左心导管检查

【正确答案】： E

【本题分数】： 1.0 分

第 2 题

关于慢性缩窄性心包炎的病理和生理下列哪项描述最恰当

- A 仅限于心包壁层增厚、钙化
- B 膈面心包增厚最厚
- C 无心肌萎缩，但心包腔完全消失
- D 心脏舒张期不能充分扩张
- E 肺动脉压力降低

【正确答案】： D

【本题分数】： 1.0 分

第 3 题

怀疑肺癌的病人应首选哪项检查

- A 纤维支气管镜检查
- B 痰脱落细胞检查

C 胸部 X 线检查

D 经皮肺穿

E 剖胸探查术

【正确答案】： C

【本题分数】： 1.0 分

第 4 题

患者，女性，30 岁，一年多来心悸，乏力，腹胀，下肢浮肿，体检：颈静脉怒张，奇脉，心脏搏动增大，腹水征(+)，心电图示 QRS 波低电压，肘静脉压 250mmH₂O，临床诊断首选

A 肝硬化，门脉高压征

B 风湿性心脏瓣膜病

C 心力衰竭

D 缩窄性心包炎

E 心肌病

【正确答案】： D

【本题分数】： 1.0 分

第 5 题

病因明确的慢性缩窄性心包炎，哪一种感染最常见

A 链球菌

B 葡萄球菌

C 结核杆菌

D 肺炎球菌

E 真菌

【正确答案】： C

【本题分数】： 1.0 分

第 6 题

肺动脉口狭窄最确切的确诊方法是

- A 右心导管
- B 心脏听诊
- C 心电图
- D 胸部 X 线
- E 彩色多普勒

【正确答案】： E

【本题分数】： 1.0 分

第 7 题

男性，45 岁，腹胀，下肢水肿，气急 5 年，检查：颈静脉怒张，心音遥远，肝肋下 3 指，X 线：心影呈三角形，左肺有浸润性肺结核病灶，此病人最好的处理方法是

- A 抗结核治疗，待肺部病变痊愈后二年手术
- B 抗结核治疗，待肺部病变稳定后尽早手术
- C 加强营养，纠正低蛋白血症
- D 利尿治疗
- E 反复抽腹水，注入抗结核药

【正确答案】： B

【本题分数】： 1.0 分

第 8 题

女，42 岁，心慌气促 2 年，有风湿病史，体检发现心尖部舒张期隆隆样杂音，第一心音低闷，心脏超声学检查二尖瓣口面积是 0.8cm^2 ，两瓣叶同向运动，明显钙化，瓣下结构变形挛缩，其最佳治疗方案是

- A 抗风湿治疗
- B 抗结核治疗
- C 闭式二尖瓣交界分离术
- D 二尖瓣置换术
- E 二尖瓣成形术

【正确答案】：D

【本题分数】：1.0分

第9题

男患儿，9岁，活动后心悸3年，胸骨左缘第二肋间扪及收缩期震颤，并于此部位听到4级粗糙的喷射性收缩期杂音，肺动脉瓣第二心音减弱，X线胸片显示肺血管影减少，心电图右室大，临床诊断最可能是

- A 房间隔缺损
- B 室间隔缺损
- C 主动脉瓣狭窄
- D 动脉导管未闭
- E 肺动脉口狭窄

【正确答案】：E

【本题分数】：1.0分

第10题

先天性心脏病肺动脉口狭窄，造成的病理生理改变主要是

- A 肺动脉压力升高
- B 左向右分流
- C 左室肥大
- D 右室压力升高
- E 肺淤血

【正确答案】：D

【本题分数】：1.0分

第11题

关于肋骨骨折的叙述不正确的是

- A 为最多见的胸部损伤
- B 多发生于长而固定的4~7肋
- C 反常呼吸存在是诊断连枷胸的唯一依据

D 胸部 X 线片多能明确诊断，也是最可靠的依据

E 单根肋骨骨折一般需完全复位矫正

【正确答案】： E

【本题分数】： 1.0 分

第 12 题

下列为肺动脉瓣狭窄的临床表现除了

A 胸骨左缘第二肋间可扪及的收缩期震颤

B 心电图右室大

C 胸骨左缘第 2 肋间可听到 3~4 级的收缩期杂音

D X 线示左室大

E 活动后心跳气短

【正确答案】： D

【本题分数】： 1.0 分

第 13 题

某 10 岁男孩，活动后心悸气促 6 年，近 1 年来出现活动时昏厥 4 次，查体：愚型面容，胸骨左缘第二肋间 III 级全收缩期喷射性杂音，第二心音减弱，为确诊应首选

A 颅脑 CT

B 彩色超声心动图

C 心电图

D 心向量

E X 线胸片

【正确答案】： B

【本题分数】： 1.0 分

第 14 题

风湿性心脏病二尖瓣狭窄时，心脏听诊的最典型杂音是

A 胸骨左缘第三、四肋间 IV 级以上收缩期杂音

- B 胸骨左缘第二肋间 II-III 级吹风样杂音
- C 胸骨左缘第二肋间连续性的机器样杂音
- D 心尖区舒张中期隆隆样杂音
- E 心尖区全收缩期杂音

【正确答案】：D

【本题分数】：1.0 分

第 15 题

患者右胸被撞伤 2h，胸痛，右胸呼吸幅度小，呼吸音弱，胸部 X 线检查，右胸 5~8 后肋单处骨折，无血气胸，治疗应选择

- A 吸氧
- B 输液
- C 切开内固定
- D 大量抗生素预防感染
- E 多头胸带固定胸部

【正确答案】：E

【本题分数】：1.0 分

第 16 题

女性，30 岁，活动后心悸气促 5 年，咯血 2 天，胸片示：肺纹理增粗，双侧散在粟粒形阴影，心影增大，左心房向后明显推压食管，肺动脉段隆出，最可能的诊断是

- A 支气管扩张
- B 风湿性二尖瓣狭窄
- C 支气管肺癌
- D 支气管腺瘤
- E 肺结核

【正确答案】：E

【本题分数】：1.0 分

第 17 题

风湿性心脏病二尖瓣狭窄，出现急性肺水肿的最可能的原因是

- A 肺泡与毛细血管之间组织增厚
- B 肺毛细血管压力超过正常血浆渗透压 (30mmH)
- C 肺小动脉痉挛
- D 肺血管阻力增高
- E 右心衰竭

【正确答案】： B

【本题分数】： 1.0 分

第 18 题

二尖瓣狭窄，产生肺水肿的最可能的原因是

- A 肺泡与毛细血管之间组织增厚
- B 肺毛细血管压力升高，超过血浆渗透压
- C 左心室负担过重
- D 肺血管痉挛、阻力增高
- E 水钠潴留、多种脏器水肿

【正确答案】： B

【本题分数】： 1.0 分

第 19 题

下列哪些病人不应该怀疑肺癌

- A 出现刺激性咳嗽持续 2~3 周，治疗无效
- B 持续或反复在短期内痰中带血而无其他原因可解释者
- C 局限而固定的喘鸣音或湿罗音，随咳嗽而改变者
- D 原因不明的肺脓肿，中毒症状轻、痰量少，抗炎治疗效果不明显者
- E 近期出现原因不明的四肢关节痛及杵状指，或前述副癌综合征表现者

【正确答案】： C

【本题分数】： 1.0 分

第 20 题

男，18 岁，半小时前被刀刺在胸骨左缘第四肋间，急诊室检查患者神志清楚，血压低，脉搏快、弱，听诊双肺呼吸音清晰，心音低远，最可能的诊断是

- A 心脏挫伤
- B 胸主动脉破裂
- C 心包填塞
- D 血胸
- E 气胸

【正确答案】： C

【本题分数】： 1.0 分

第 21 题

在肺动脉口狭窄的诊断中最具确诊价值的是

- A 听到收缩期粗糙杂音
- B 心电图呈现右室肥厚
- C X 线检查示右心扩大
- D 右心阻力负荷增加
- E 肺动脉和右心室间的压力阶差 10mmHg

【正确答案】： E

【本题分数】： 1.0 分

第 22 题

慢性缩窄性心包炎，手术指征最强的临床表现是

- A 胸部 X 线检查显示心包钙化
- B 心电图显示 QRS 波低电压
- C 超声心动图显示心包腔内积液
- D 心导管检查显示右房右室舒张压升高
- E 周围静脉压明显升高

【正确答案】：E

【本题分数】：1.0分

第23题

一患者，在心尖部听到第一心音亢进，舒张期隆隆样杂音，可闻及开放拍击音，病人心功能II级，由此，首先考虑

- A 二尖瓣狭窄(漏斗型)
- B 二尖瓣狭窄(隔膜漏斗型)
- C 二尖瓣狭窄(隔膜型)
- D 二尖瓣狭窄并主动脉瓣狭窄
- E 二尖瓣狭窄并主动脉关闭不全

【正确答案】：D

【本题分数】：1.0分

第24题

肺动脉口狭窄诊断在心室与肺动脉的收缩压差为

- A 大于50mmHg
- B 大于20mmHg
- C 大于60mmHg
- D 大于40mmHg
- E 大于10mmHg

【正确答案】：B

【本题分数】：1.0分

第25题

不适用于治疗慢性脓胸的术式是

- A 胸腔闭式引流术
- B 胸膜纤维板剥除术
- C 胸廓成形术
- D 肺叶切除术

E 胸膜肺切除术

【正确答案】：A

【本题分数】：1.0分

第26题

食管癌的X线表现不包括

A 管壁僵硬

B 黏膜皱襞增粗

C 黏膜呈串珠样改变

D 黏膜皱襞断裂

E 充盈缺损或龛影

【正确答案】：C

【本题分数】：1.0分

第27题

关于闭合性气胸的叙述不正确的是

A 伤侧胸膜腔内压力升高，但仍低于大气压

B 进气少、肺萎陷在50%以下者，常无明显症状，可自行吸收，不需特殊治疗

C 大量进气则将纵隔推向健侧，患者胸闷、气促，伤侧叩诊鼓音，听诊呼吸音减弱或消失

D X线检查显示伤侧肺萎陷和胸膜腔积气，纵隔向健侧移位

E 重者需于伤侧锁骨中线第2肋间穿刺抽尽积气，或行胸腔闭式引流

【正确答案】：B

【本题分数】：1.0分

第28题

女性38岁，农民，气短、心慌半年，查体：颈静脉怒张，心尖搏动减弱，肝肋下4指，腹移动性浊音(+)，胸部X线检查示右胸少量积液，心包有钙化，病人临床诊断最可能是

A 充血性心力衰竭

B 肝硬化腹水

- C 结核性腹膜炎
- D 心肌病晚期
- E 慢性缩窄性心包炎

【正确答案】： E

【本题分数】： 1.0 分

第 29 题

正常成年人，二尖瓣口面积为 $4\sim 5\text{cm}_2$ ，血流在舒张期和右心房通过二尖瓣的口流入左心室，当风湿性二尖瓣狭窄病变时，在何种病理情况下最可能产生急性肺水肿

- A 瓣口面积 $< 4\text{cm}_2$
- B 瓣口面积 $< 3\text{cm}_2$
- C 瓣口面积 $< 2\text{cm}_2$
- D 瓣口面积 $< 1.5\text{cm}_2$
- E 瓣口面积缩小到 1cm_2 以下时

【正确答案】： D

【本题分数】： 1.0 分

第 30 题

下列为缩窄性心包炎的临床表现除了

- A 肝大、腹水、胸水
- B 颈静脉怒张
- C 周围静脉压增高
- D X 光片示心包钙化
- E 周围血管搏动征阳性

【正确答案】： E

【本题分数】： 1.0 分

第 31 题

肺动脉口狭窄常由于以下因素出现周围性紫绀，除了

- A 肺小动脉阻力增高
- B 静脉回心血流受阻
- C 右房压力增高
- D 右心室压力增高
- E 右心排血障碍

【正确答案】：A

【本题分数】：1.0分

第32题

患者男性，33岁，劳力性心慌气促10年，心尖区可听到舒张期隆隆样杂音，胸部X线检查见心影增大呈梨形，并见双心房阴影，该患者二维或切面超声心动图检查可发现

- A 二尖瓣瓣口狭小
- B 左心房变小
- C 主动脉瓣瓣口狭小
- D 三尖瓣瓣口狭小
- E 肺动脉瓣瓣口狭小

【正确答案】：A

【本题分数】：1.0分

第33题

进行性血胸特点不包括

- A 反常呼吸运动
- B 胸腔内压进行性增高
- C 静脉压升高，心搏微弱、动脉压降低
- D 呼吸时的纵隔扑动
- E 胸腔引流血量 $>200\text{ml/h}$ ，连续3h

【正确答案】：B

【本题分数】：1.0分

第 34 题

外伤性心包填塞最可靠最合理的诊断办法是

- A 胸部 X 线片
- B 心脏计波摄影
- C 超声检查
- D 静脉压测定
- E 心包穿刺

【正确答案】： C

【本题分数】： 1.0 分

第 35 题

慢性缩窄性心包炎，确诊后首选治疗原则是

- A 抗结核治疗
- B 使用抗生素
- C 尽早手术
- D 少量输血
- E 使用强心利尿药

【正确答案】： C

【本题分数】： 1.0 分

第 36 题

风湿性心脏病二尖瓣狭窄的临床症状轻重最主要取决于

- A 风湿活动与否及程度
- B 二尖瓣瓣口的狭窄程度
- C 体力活动的程度
- D 抗风湿药物的应用与否
- E 有无心房纤颤的存在

【正确答案】： B

【本题分数】： 1.0 分

第 37 题

缩窄性心包炎的临床治疗原则是

- A 抗结核药物治疗
- B 强心利尿
- C 尽早施行手术治疗
- D 心包穿刺或胸腔穿刺
- E 全身支持治疗，不需手术治疗

【正确答案】： C

【本题分数】： 1.0 分

第 38 题

下列哪条不符合慢性缩窄性心包炎的临床表现

- A 颈静脉怒张
- B 肝大、腹水、下肢浮肿
- C 心搏动减弱或消失
- D 心律正常、脉搏细速有奇脉
- E 心浊音界增大

【正确答案】： E

【本题分数】： 1.0 分

第 39 题

食管癌的早期临床表现不包括

- A 食管内异物感
- B 胸骨后针刺样疼痛
- C 咽下食物时梗噎感
- D 进行性吞咽困难

E 上腹部烧灼感

【正确答案】：D

【本题分数】：1.0分

第40题

下列为慢性缩窄性心包炎的X线特征除了

A 心影大小接近正常

B 心影明显增大

C 心影呈三角形

D 心脏搏动减弱

E 有时可见心包钙化

【正确答案】：B

【本题分数】：1.0分

第41题

单纯二尖瓣狭窄早期最常见的X线改变是

A 右侧胸腔积液

B 右房区域的双房影

C 心内钙化影

D 肺动脉段突出

E Kerlry 线

【正确答案】：D

【本题分数】：1.0分

第42题

下列哪一个是二尖瓣狭窄最常见症状

A 二尖瓣面容

B 气促、心悸

C 咯血

D 肝大

E 下肢水肿

【正确答案】： B

【本题分数】： 1.0 分

第 43 题

中度以上二尖瓣狭窄，心电图最主要表现是

A 正常

B 电轴左偏，P 波高尖

C P 波增宽且有切迹，右室大

D P 波倒置，双室大

E PR 间期延长，左室大

【正确答案】： C

【本题分数】： 1.0 分

第 44 题

缩窄性心包炎不能出现下述哪一种体征

A 脉搏细弱、快

B 静脉压升高

C 肝大、腹水

D 收缩压升高

E 心音减弱

【正确答案】： D

【本题分数】： 1.0 分

第 45 题

食管癌较多发生在

A 胸中段食管

B 胸上段食管

C 胸下段食管

D 食管贲门部

E 颈部食管

【正确答案】：A

【本题分数】：1.0分

第46题

二尖瓣狭窄时，最典型的体征是

A 心尖收缩期杂音

B 左2肋间连续杂音

C 主动脉瓣区舒张期杂音

D 心尖部舒张期杂音

E 心尖部双期杂音

【正确答案】：D

【本题分数】：1.0分

第47题

下列哪一项可确诊肺动脉口狭窄

A 颈静脉怒张

B 肺动脉瓣区听到收缩期杂音

C X线显示右室扩大

D 右室与肺动脉收缩期压力阶差 20mmHg

E 心电图P波高尖

【正确答案】：B

【本题分数】：1.0分

第48题

主动脉窦动脉瘤破裂导致

A 左向右分流，心力衰竭

- B 脉压变小
- C 肺血流减少
- D 心前区响亮的收缩期杂音
- E 以上均不是

【正确答案】： A

【本题分数】： 1.0 分

第 49 题

肺动脉口狭窄时最常发生的部位是

- A 瓣膜部
- B 右室漏斗部
- C 瓣膜部、肺动脉干
- D 肺动脉干
- E 左室漏斗部和瓣膜

【正确答案】： A

【本题分数】： 1.0 分

第 50 题

关于慢性缩窄性心包炎的病理生理改变，下列错误的是

- A 心脏的舒张功能受损
- B 心肌萎缩
- C 心排量减少
- D 左心后负荷增加
- E 静脉血回流减少

【正确答案】： D

【本题分数】： 1.0 分

第 51 题

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/775302114242011102>