

三甲创建应知应会知识竞赛题库附答案（100 题）

一、单选题

1. 住院患者病情超出本科专业范围，需要其他专科协助诊疗者，需行科间会诊。应邀科室应在 0 时间内安排 0 职称以上人员进行会诊。

- A. 12 小时主治医师
- B. 24 小时住院医师
- C. 12 小时副主任医师
- D. 24 小时主治医师（正确答案）

2 . 关于疑难病例讨论制度，下列说法错误的是 0

- A. 医疗机构应根据本机构诊疗范围和医疗技术水平，明确本机构疑难病例识别的基本特征
- B. 临床科室应根据本机构疑难病例讨论范围，进一步细化，明确本科室的疑难病例识别标准
- C. 疑难病例讨论应将讨论过程中各发言人的发言要点记入病历

D. 疑难病例讨论原则上由科主任主持

3 . 下列关于首诊负责制，理解正确的是 0

A. 谁首诊谁负责，首诊医生应仔细询问病史，进行体格检查，认真进行诊治，做好病历记录（正确答案）

B. 首诊医生发现患者所患疾病不属于本专业范畴，可以建议转相关科室，无需做病历记录。

C. 对于新入院患者必须在 1 小时内诊治，危急中患者必须立即接诊，并报告上级医生

D. 急危重患者借用他人信息挂号，医院不承担首诊职责

4, 对新入院患者，一级医师每日至少查房 0 次，二级医师首次查房不得超过（）小时。

A. 2、48（正确答案）

8 . 1、48

C. 3、24

D. 2、24

5. 急诊会诊，相关科室在接到会诊通知后，应在多长时间到

位？

A. 10 分钟（正确答案）

B. 15 分钟

C. 20 分钟

D. 30 分钟

6. 出院记录及死亡记录应当在 0 内完成

A. 6 小时

B. 12 小时

C. 24 小时（正确答案）

D. 3 天

7. 死亡病例，一般情况下应在 0 内组织讨论，特殊病例（存在医疗纠纷）应在 0 内进行讨论。

A. 1 天、6 小时（正确答案）

B. 2 天、6 小时

C. 3 天、12 小时

D. 5 天、12 小时

8. 在抢救危重症时，未能及时记录的，有关医务人员应当在抢救结束后 0 小时内据实补记，并加以说明。

A. 2 小时

B. 6 小时（正确答案）

C. 4 小时

D. 8 小时

9. 查对制度正确的是 0

A. 护士根据医嘱给药，可以更改，对有疑问的医嘱，应了解清楚后方可给药，避免盲目执行 Q

B. 严格执行三查七对制度。

C. 三查：操作前、操作中、操作后。（正确答案）

D. 八对：床号、姓名、住院号、药名、剂量、用法、时间、效期。

10. 11（急）诊病历书写的基本要求错误的是（）

A. 要简明扼要。主诉、现病史、既往史、各种阳性体征和必要的阴性体征、诊断及治疗、处理意见等均需记载于病历上。

B. 11（急）诊病历分为初诊病历记录和复诊病历记录 Q

C. 急诊病历应具体到秒。（正确答案）

D. 11（急）诊病历记录应当由接诊医师在患者就诊时及时完成

H 手术及有创操作分级：手术指各种开放性手术、介入手术、腔镜手术、内镜手术及操作（以下统称手术）。依据其技术难度、复杂性和风险度，将手术分为 0 级。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四（正确答案）

12. 新技术、新项目手术需经过（）组织的新技术新业务评审准入后，科主任签字同意，由 0 备案审批 Q

A. 医疗技术临床应用委员会医务科（正确答案）

B. 医学伦理委员会医务部

C. 医疗技术临床应用委员会质控办

D. 医学伦理委员会质控办

13. 住院病历保存时间自患者最后一次住院出院之日起不少于 0 年。

A. 10

B. 20

C. 30（正确答案）

D. 40

14 . 同一患者一天申请备血量达到或超过（）ml 的，由具有中级以上专业技术职务任职资格的医师提出申请，科室主任核准签发后，报医务部门批准，方可备血。

A. 800

B. 1000

C. 1200

D. 1600（正确答案）

15 . 手术安全核查要求在（）严格按照卫生部相关规定进行医师、麻醉师、手术室护士的三方核对并签字。

A, 麻醉前、麻醉中、麻醉后

B. 麻醉前、麻醉中、手术前

C. 麻醉前、手术前、手术后（正确答案）

D. 麻醉前、手术中、手术后

16. 会诊医师必须具备的最低职称条件是（）

- A. 住院医师
- B. 主治医师（正确答案）
- C. 副主任医师
- D. 主任医师

17 .2021 年 3 月 30 日提交二届四次职代会审议通过医院“十四五”规划，全文共（）章 0 条。0

- A. 12 章 54 条
- B. 12 章 53 条（正确答案）
- C. 10 章 52 条
- D. 10 章 51 条

18 . 是医院感染暴发的定义是？

A. 指在医疗机构或其科室的患者中，短时间内发生 2 例以上同种同源感染病例的现象

B. 指在医疗机构或其科室的患者中，短时间内发生 3 例以上同

种

C. 指在医疗机构或其科室的患者中，短时间内发生 4 例以上同种同源感染病例的现象

D. 指在医疗机构或其科室的患者中，短时间内发生 5 例以上同种同源感染病例的现象

19 . 发生锐器伤后积极采取补救措施，以下正确的是（）

A. 捏住伤口远心端，以阻断静脉回流

B. 立即用流动水冲洗，向伤口部位方向持续推挤，挤出伤口部位的污血，注意不要一挤一松，避免将污血倒吸入血液循环

C. 双氧水消毒伤口（正确答案）

D. 艾滋病病毒职业暴露后尽早服用双汰芝，最好在 2 小时内实施

20 . 以下安全用电，正确的是 0

A. 可以拆卸、安装电源电路、插座、插头，用工具撬开带锁配电箱

B. 发现有人触电时要设法及时关断电源；或者用干燥的木棍等物将触电者与带电体分开，用手去直接救人

C. 不用湿手触摸电器，用湿布擦拭电器

D. 电器使用完毕后应拔下电源插头：插拔电源插头时不要用力拉

21. 2021年8月20日第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过《中华人民共和国医师法》，共七章六十七条。0时间执行。

- A. 自2021年12月1日起施行
- B. 自2022年1月1日起施行
- C. 自2022年2月1日起施行
- D. 自2022年3月1日起施行（正确答案）

22. 以下属于限制类技术的是（）

- A. 临床应用安全性、有效性不确切
- B. 存在重大伦理问题
- C. 技术难度大、风险高，对医疗机构的服务能力、人员水平有较高专业要求，需要设置限定条件的（正确答案）
- D. 未经临床研究论证的医疗新技术

23. 医疗事故处理条例中，根据对患者人身造成的损害程度，医疗事故分为四级，以下错误的是0

- A. 一级医疗事故：造成患者死亡、重度残疾的；
- B. 二级医疗事故：造成患者中度残疾、器官组织损伤导致严重功

能障碍的；

C. 三级医疗事故：造成患者轻度残疾、器官组织损伤导致一般功能障碍的；

D. 四级医疗事故：造成患者其他后果的。（正确答案）

24. 医师接到“危急值”报告后做法错误的是 0

A. 结合病情对“危急值”进行分析评估

B. 积极采取救治措施（如用药、手术、会诊、转诊、转院）

C. 必要时向上级医师报告，请上级医师到场指导救治

D. 未在病历中详细记录报告结果、分析、处理情况（正确答案）

25. 紧急情况下住院医师可越级使用高于权限的抗菌药物多长时间间的用量（）

A. 24 小时（正确答案）

B. 2 天

C. 3 天

D. 没有限制

26. 卫生手消毒：监测的细菌菌落数应 0

A. $\leq 5\text{cfu} / \text{cm}^2$

B. $10\text{Cfu}/\text{cm}^2$ (正确答案)

C. $\leq 10\text{cfu} / \text{cm}^2$

D. $\leq 10\text{cfu} / \text{cm}^2$

27 . 外科手消毒：监测的细菌菌落数应 ()

A. $\leq 1\text{cfu} / \text{cm}^2$

B. $\leq \text{cfu} / \text{cm}^2$

C. $5\text{cfu} / \text{cm}^2$ (正确答案)

D. $\leq 10\text{cfu} / \text{cm}^2$

28 . 入院病历应当于患者入院后 0 内完成，首次病程记录应当在患者入院后 0 完成 (B)

28. 入院病历应当于患者入院后 0 内完成，首次病程记录应当在患者入院后 () 完成

A. 8h, 24h

B. 24h, 8h (正确答案)

C. 16h, 8h

D. 24h, 8h

29. 门（急）诊病历由医疗机构保管的，门（急）诊病历及住院病历保存时间自患者最后一次就诊/出院之日起分别不少于多少 0 年

- A. 5 年，10 年
- B. 10 年，15 年
- C. 15 年，20 年
- D. 15 年，30 年（正确答案）

30 .VTE 基础预防措施，不正确的是 0

- A. 手术避免静脉内膜损伤
- B. 规范下肢止血带的应用
- C, 术中和术后补液、饮水、避免脱水
- D. 抬高患肢，抬高下肢 25-350（正确答案）

31 . 器械不良事件定义正确的是 0

- A. 医疗器械在正常的使用下导致人体伤害的任何与医疗器械预期使用效果无关有害事件
- B. 合格的医疗器械在不正常的使用下导致人体伤害的任何与医疗器械预期使用效果无关的有害事件

C. 合格的医疗器械在正常的使用下导致人体伤害的任何与医疗器械预期使用效果的无关有害事件（正确答案）

D. 医疗器械在正常的使用下导致人体伤害的任何与医疗器械预期使用效果无关的有害事件

32 . 外科预防用药，不正确的是 0

A. 静脉输液应在皮肤、黏膜切开前 2 小时给药（正确答案）

B. 如手术时间超过 3 小时或超过所用药物半衰期的 2 倍以上，或成人出血量超过 1500ml，术中应追加一次

C, 术后不超过 24h

D. 一类切口预防使用抗菌药物比率不超过 30%

33 . 特殊管理药品不包括 0

A. 麻醉药品

B. 精神药品

C. 医疗用毒性药品

D. 农药（正确答案）

34 . 不是 VTE 的基础预防措施的是（）

A. 抬高患肢抬高下肢 20-35。略高于心脏水平禁止胭窝及小腿下

单独垫枕（正确答案）

- B. 手术操作轻巧避免静脉内膜损伤
- C. 术中和术后补液、饮水、避免脱水
- D. 早期活动尽早下床

35 . 下列哪项不是抢救记录必须记录的内容 0

- A. 记录时间
- B. 抢救时间
- C. 病情变化
- D, 抢救地点（正确答案）

36 . 下列哪项不是高警示药品？（）

- A. 高浓度电解质制剂
- B. 肌肉松弛剂
- C. 胰岛素制剂
- D. 限制使用级抗生素（正确答案）

37 .关于急救药品物品管理制度，下面哪项是错误的？（）

A. 管理应做到“五定”，即定数量品种、定时检查、定专人管理、定期清洁、定期检查（正确答案）

B. 急救药品要有清晰的药品目录，要注意防潮防晒，要放置在通风、干燥、避光处

C. 根据药品种类与性质（如针剂、内服、外用、麻精药等）分别放置，编号管理

D. 急救药品物品要求双人管理，要专人定期对急救药品进行清点，对用过的药品要及时补充

38 .关于病情评估的概念、范围，下列说法错误的是？（）

A 患者病情评估是指具备病情评估资格的医务人员通过询问病史、体格检查、临床实验室检查、医技部门辅助检查等途径。

B 对患者的病情严重程度做出综合评估。（正确答案）

C. 医院对接诊的每位患者都应进行病情评估。

D. 重点应加强住院患者入院评估、术前评估、麻醉风险评估、急危重患者病情评估、危重病人营养评估、住院患者再评估、手术后评估、住院时间长的患者评估、出院前评估等。

39 .患者发生输液反应时的处理措施哪项是错误的？0

A. 情况严重者应就地抢救，必要时进行心肺复苏

B. 应及时报告医院感染管理科、消毒物品供应中心、护理部和药学部

C. 应立即停止输液或保留静脉通路，观察 5 分钟后无特殊情况继续输液（正确答案）

D. 保留输液器和药液送药剂科，同时取相同批号的液体、输液器和注射器分别送检

40 . 分级护理的依据是什么？ 0

A. 根据患者病情和医生的判断

B. 根据患者病情和生活自理能力确定护理等级（正确答案）

C. 根据患者生活自理能力和家属意愿

D. 根据医生的判断和患者生活自理能力

41 . 关于医嘱管理，下列哪项是错误的？（）

A. 医嘱不得涂改，更改或撤销

B. 未在我院注册的医师所开具的医嘱，必须有上级医师审核签字

C. 无医师医嘱，护士一般可以先给病员进行对症处理（正确答案）

D. 严格执行查对制度，下班前执行查对情况，需下一班执行的医

嘱，交代清楚，在护士值班记录上注明

42 .关于急危重患者抢救制度，下列说法错误的是？

A. 指为控制病情、挽救生命，对急危重患者进行抢救并对抢救流程进行规范的制度

B. 急危重患者的范围，包括但不限于：病情危重，不立即处置可能存在危及生命或出现重要脏器功能严重损害；生命体征不稳定并有恶化倾向等

C. 医疗机构应当建立抢救资源配置与紧急调配的机制，确保各单元抢救设备和药品可用。建立绿色通道机制，确保急危重患者优先救治。医疗机构应当为非本机构诊疗范围内的急危重患者的转诊提供必要的帮助

D. 临床科室急危重患者的抢救，由主管医师主持，抢救完成后2小时内应当将抢救记录记入病历（正确答案）

43 .关于压疮好发部位，下列哪项是错误的？0

A. 仰卧位时：好发于枕骨粗隆、肩胛部、肘部、舐尾部及足跟处，尤其好发于肘部（正确答案）

B. 侧卧位时：好发于耳廓、肩峰、肋骨、髓骨、股骨粗隆、膝关

C. 俯卧位时：好发于面颊、耳廓、肩峰、女性乳房、肋缘突出部、

男性生殖器、髂前上棘、膝部和足趾等处

D. 坐位时：好发于坐骨结节、肩胛骨、足跟等处

44 .关于标准预防，下列哪项是错误的？0

A. 标准预防是保护医患双方安全的重要措施

B. 包括手卫生、正确使用个人防护用品（PPE）、呼吸卫生和咳嗽礼仪、诊疗设备及环境清洁消毒、患者安置、安全注射、医用织物洗涤和医疗废物管理等。

C. 落实标准预防的关键措施是医务人员的行为要规范，建立起行为屏障。

D. 以阻断接触传播、飞沫传播或空气传播途径为目的，而采取的针对性综合防控措施。（正确答案）

45 .关于扑救火灾的方法，下列哪项是错误的？0

A. 发生火灾时，在场人员应立即扑救、报警，同时要迅速通知值班人员或法定代表人，以便组织灭火和疏散。

B. 应遵循先救人、先控制后灭火、先重点后一般原则

C. 利用现有消防设施和器材组织扑救；

D. 电器起火，立即用水扑救，或者用多功能干粉和二氧化碳灭火

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/776110043230010041>