

外科护理学考试试题及答案题库

XXX

外科护理学考试试题（专升本）

A

1

题型(单选，每题 1 分，共 20 分)

1.男性，45 岁，因幽门梗阻引起反复呕吐、缺水。测得血清钾为 3mmol/L ，动脉血 $\text{pH}7.52$ ，剩余碱 10mmol/L ，

CO

2

分压 $6\text{kPa}(45\text{mmHg})$ 。应诊断为(。)A.高渗性缺水合并低钾血症 B.代谢性碱中毒合并低钾血症

C.代谢性酸中毒合并低钾血症 D.代谢性碱中毒合并呼吸性碱中毒 E.代谢性碱中毒合并呼吸性酸中毒

2.休克的实质是(。)

A.血压下降 B.中心静脉压下降 C.脉压下降

D.心脏指数下降 E.微循环灌流不足

3.术后切口裂开，其处理下列哪一项不妥(。)

A.安慰患者 B.立即在病床上将内脏还纳 C.立即用灭菌盐水纱布覆盖 D.用腹带包扎 E.送手术室缝合

4.为判别胃肠手术病人手术后入手下手进流食的时间，护士应该评估病人(。)A.引流液是否削减 B.生命体征是否安稳 C.麻醉反应是否消失 D.腹部痛苦悲伤是否减轻 E.肠鸣音是否恢复，是否排气

5.XXX38 岁，被开水烫伤右手右下肢(未烫及臀部)，右侧腹部也有 3 个手掌大小的烫伤创面，创面水肿明显，剧烈疼痛，局部有大小不等的水疱.其烧伤面积和深度是(。)A.23%浅 II 度 B.25. 5%深 II 度 C.26%浅 II 度

D.28. 5%深 II 度 E.31%浅 II 度

6.使用抗癌药物的护理，下列哪一项有错(。)

A.配制药液时应核对无误，注意有效期

B.一切药液必须一次性配足，以供多次使用

C.操纵时穿长袖防护衣，戴帽子，口罩

D.多次给药应有计划使用静脉，避免过早闭塞

E.如药液外漏引起局部痛苦悲伤，肿胀，应立即停止注药或输液，局部冷敷

7.颅内压增高病人的体位宜采取 ()

A.床头抬高 15° — 30° B.床尾抬高 15° — 30° C.平卧位

D.床头床尾均举高 15° E.俯卧位

8.枕骨大孔疝最危急的临床表现： ()

A.枕下部疼痛 B.颈项强直 C.意识障碍

D.频仍呕吐 E.早期突发呼吸骤停

9.甲状腺危象的好发时间是（）。

A. 术后 36—72 小时 B. 术后 12-36 小时 C. 术后 48 小时
D. 术后 24—48 小时 E.术后 6 小时

10.男性，40 岁，右胸外伤后出现极度呼吸困难、紫绀、胸壁皮下气肿，伤侧叩诊鼓音，呼吸消失，诊断首先考虑(。)

A. 闭合性多根多处肋骨骨折 B. 闭合性气胸 C. 开放性气胸

D. 张力性气胸 E. 进行性气胸

11.胸腔闭式引流后的护理，下列哪项是错误的（）

A. 病人取半卧位 B. 保持引流管通畅 C.引流瓶不能高于病人胸腔平面 D. 观察记录引流物的量及性质 E. 引流瓶内短玻璃管与引流管相接，长玻璃管开放
12.疝修补术后，预防腹内压升高的措施，下列（）不妥。

A. 预防上呼吸道感染 B. 保持大便通畅 C. 加强锻炼如跑步、练气功等 D. 及时治疗咳嗽、便秘等症状 E.避免剧烈运动

13.急性腹膜炎术后腹腔安置引流管的护理，下列错误的是（）

A.术后 6h 后接通引流管 B.妥善固定 C.保持通畅
D.窥察引流液性状 E.记出入量

14.我国门静脉高压症常见的病因是（）

A.血吸虫病 B.门脉性肝硬变 C.肝炎后肝硬变
D.胆汁性肝硬变 E.门静脉血栓形成

15.甲胎蛋白(AFP)阳性最常见于（）

A.原发性肝癌 B.继发性肝癌 C.肝硬化
D.慢性活动性肝炎 E.重症肝炎

16.上尿路梗阻最常见的缘故原由是（）

A.前列腺增生 B.肾盂输尿管交界处先天性狭窄 C.肿瘤 D.
炎症 E.以上全是

17.骨折和脱位共有的特殊体征是（）

A.异常举动 B.弹性固定 C.骨擦音 D.畸形 E.枢纽盂空虚

18.石膏或夹板外固定之后最应注意的是（）

A.松脱 B.骨折再移位 C.榨取性溃疡 D.血循环受阻 E.石膏
变形 19.预防肾和输尿管结石形成和增大的最有效的方法是（）

A.大量饮水 B.应用抗生素 C.口服维生素 CD.碱化尿液 E.
以上全是

20.引起急性胰腺炎的主要病理机制为（）

A.构造细胞破坏 B.消化酶缺乏 C.胰腺的自我消化 D.消化酶生成过多 E.细胞自溶

A

2

题（单选，每题 1 分，共 20 分）

21.女性，45 岁，因饱餐后出现右上腹疼痛而入院，诊断为胆囊结石，应禁食()A.蛋白食物 B.纤维食物 C.高热量食物 D.油腻食物 E.高维生素食物 22.右半结肠癌不常见的症状体征为()

A.腹泻、脓血黏液便 B.肠梗阻症状 C.贫血、消瘦、低热 D.营养不良 E.右腹触及肿块

23.男，67 岁，间歇性跛行 6 年，弯腰及下蹲时疼痛减轻，腰椎压痛(一)，后伸痛明显。x 线平片显示腰椎骨质增生明显。最可能的诊断是 ()

A.腰椎管狭窄症 B.腰椎间盘突出症 C.慢性腰肌劳损 D.马尾肿瘤 E.棘间韧带损伤

24.XXX，被同学从背后突撞腓窝跪倒在地，造成髌骨骨折，其致病因属于 () A.间接暴力 B.间接暴力 C.肌肉牵力 D.积聚劳损 E.骨骼病损

25.女性，45岁。左胫腓骨下1/3开放性骨折，行清创缝合石膏固定治疗，3个月后局部仍有压痛，x线显示骨折线尚存在，有少量外骨痂，骨折对位良好，下列哪项是影响骨折延迟愈合的主要因素（）

A.年岁大 B.开放性骨折 C.XXX血液供应差 D.软构造损伤 E.石膏固定

26.XXX师长教师，60岁。患左下肢静脉曲张20年，行大隐静脉高位，加小腿静脉分段。术后3小时下床行走时，小腿处伤口突然出血不止。紧急处理应（） A.当场包扎 B.指压止血 C.用止血带

D.钳夹止血 E.平卧，举高患肢，加压包扎

27.男性，42岁，因严重交通事故致全身多发性损伤，其抢救措施不包括（） A.第一处理危及生命的损伤 B.脱出的肠管应及时还纳 C.置病人于恰当的体位 D.及时包扎损伤部位

E.对腹腔内脏破碎出血者应在抗休克同时手术止血

28.男性，40岁，逐日大便十余次，不成形，间有脓血便，伴随明显的里急后重感3个月，腹痛较轻，内科药物治疗1个月无好转，全身症状尚好，最可能的诊断是（） A.急性菌痢 B.过敏性结肠炎 C.乙状结肠炎

D.结肠息肉 E.肠结核

29.男性，36岁，因急性阑尾炎穿孔行“阑尾切除术”。术后5天，感腹部持续性胀痛，伴恶心呕吐，未排便排气。体检：全腹膨胀，肠鸣音消失，未触及腹部肿块，腹部X线片检查见小肠及结肠均有大量充气及气液平面。对于该病人的处理，最适宜的是()A.立即剖腹探查 B.口服钡剂全胃肠道透视 C.腹腔穿刺，灌洗

D.钡剂灌肠 E.胃肠减压及支持疗法

30.男性，41岁，乙肝史10年余，近来自觉右上腹胀痛，首选的检查是()A.MRI。 B.B型超声波检查 C.肝动脉造影 D.核素肝扫描 E.腹腔镜 31.男性，59岁，患胃溃疡5年余。晨起突然排出大量柏油样黑便，并出现心悸、头晕、无力，由家人送至医院急诊。体检：体温36.1℃，血压95/55mmHg，脉搏105次/分钟；病人面色苍白、出冷汗、四肢湿冷等。急查血常规，示红细胞计数、血红蛋白值、血细胞比容明显下降。考虑并发了()

A.急性穿孔 B.胃溃疡大出血 C.瘢痕性幽门梗阻

D.胃溃疡恶性变 E.胃溃疡伴溃疡性结肠炎

32.女性，58岁，急性化脓性腹膜炎术后第一天。病人对留置胃管的作用不理解，要求拔除。护士对胃管作用的解释不妥的是()

A.能够预防胃出血 B.有利于胃肠功用的恢复 C.能够减轻腹胀 D.避免胃肠内积气积液 E.有利于胃肠符合口的愈合

33. 男性，57岁，直肠癌行 Milex 手术。术后10天，病人呈现腹部胀痛，恶心。腹壁造口检查：肠壁浅白色，弹性差，可伸入一小指。该病人可能呈现的术后并发症是(。)A.造口肠段血运停滞 B.符合口瘘 C.肠粘连

D.造口狭窄 E. 便秘

34.女，45岁，行胆总管切开取石 T 管引流术后，T 管引流液每天均在 2000ml 左右，提示(。)

A.胆汁量过少 B.胆汁量正常 C.胆管下端梗阻 D.胆管上端梗阻 E.胆管中部梗阻

35.男性，45岁，10年前有乙型肝炎病史，因呕血、黑便，伴头晕出冷汗而入院，经治疗后出血停止，但呈现低卵白血症和腹水，常常SGP丁降低，择期手术治疗的最主要目标是(。)

A 减轻肝性脑病 B. 纠正血小板削减 C. 预防腹水并发熏染 D. 防治食管胃底静脉破碎出血 E. 治疗固执性腹水

36.男性 22岁右胸刺伤 2h，创口与胸腔相通，病人极度呼吸困难，急救措施是 () A.迅速封闭胸壁伤口 B.立即手术 C.输血、输液 D.胸腔闭式引流 E.吸氧

37.女性，29岁，产后30d出现右侧乳房疼痛，全身畏寒、发热、脉快。体检：右冲明显，可扪及一压痛性硬块，同侧腋窝淋巴结肿大。下列处理措施中，不正确的是(。)

A.患乳停止哺乳 B.局部用硫酸镁溶液湿敷 C.按医嘱应用抗菌药

D.局部理疗 E.局部行切开引流

38.女性，42岁，行单侧甲状腺大部分切除术，术后12h，发现病人颈部肿大呼吸困难，应立即()

A.吸氧 B.气管切开 C.拆除缝线，清除血肿

D.蒸气吸入 E.吸痰

39.男性，25岁，因车祸造成多发性损伤，抢救时发觉有梗塞，腹部内脏脱出，股骨开放性骨折，病人血抬高，脉微速。第一要处理的情形是(。)

A.窒息 B.腹部外伤 C.股骨开放性骨折 D.休克 E.脉搏微弱

40.一女患者，胃大部切除术后5天，切口疼痛，发热38.5℃.应考虑(。)

A.外科热 B.腹部切口感染 C.盆腔脓肿 D.肺部感染 E.膈下脓肿 A

3

题型(单选，每题1分，共30分)

男性，23岁，双下肢挤压伤，神志尚清楚，表清淡漠，很口渴，面色苍白，皮肤湿冷，脉搏112次/min，血压12/9.33kPa(90/70mmHg)。毛细血管充盈迟缓。血pH值为7.32。

41) 该病人的情况是 ()

A.未发生休克 B.中度休克 C.休克代偿期 D.重度休克 E.虚脱

42) 其循环体系的病理生理改变是 ()

A.血容量严重缺乏 B.心功用不全 C.血容量相对过多
D.血容量不足 E.容量血管过度收缩

43) 采取下列哪项措施最为有效 ()

A.应用收缩血管药物 B.充分补给液体 C.纠正酸中毒
D.给予强心药物 E.应用扩张血管药物

男性，48岁，“急性出血坏死性胰腺炎”术后23天，曾经深静脉导管行TPN治疗20天。今日突发寒战、高热，T39.8℃、头痛、头晕、面色潮红。病人极度焦躁、P132次/分钟，R36次/分钟。血通例检查：白细胞计数 $25 \times 10^9 / L$ 、中性核左移。(44) 此时应第一考虑病人呈现了： ()

A.静脉导管感染引起脓毒症 B.肠源性感染引起脓毒症

C.厌氧菌感染引起脓毒症 D.坏死组织毒素吸收引起毒血症 E.

腹腔内感染引起脓毒症

45) 若疑为导管熏染, 以下处理措施哪项不妥: ()

A. 拔除 TPN 导管、更换 TPN 液体 B. 剪下导管尖端送细菌培养

C. 寒战、高热时采血送细菌造就 D. 保留 TPN 液体送细菌造就

E. 原位置更换 TPN 导管

46) 对静脉导管感染的首要处理措施是: ()

A. 大剂量使用抗生素 B. 停止输注营养液 C. 采血送细菌造就 D. 拔除导管并剪下尖端送细菌造就和作药敏试验 E. 保留

TPN 液体送细菌造就 (47) 关于抗生素的使用, 下列哪项错误: ()

A. 严重感染时应尽量静脉给药 B. 尽量联合用药以减少副作用 C. 根据感染特点尽早足量应用 D. 近早应用大剂量广谱抗生素 E. 根据细菌培养和药敏试验结果选用

48) 若治疗过程中病人出现真菌感染, 下列哪项不符合其应用原则: () A. 全身应用抗真菌药物 B. 尽量应用窄谱抗生素 C. 局部应用抗真菌药物 D. 尽量停用广谱抗生素 E. 根据真菌培养和药敏试验结果选用

女, 21 岁, 自诉痛苦悲伤入手下手于上腹及脐周, 位置不定, 以后痛苦悲伤位置转移到右下腹部, 并呈现全腹持续性痛

苦悲伤。体检示：体温 39.2℃，脉搏 124 次 / 分钟，血压 105 / 65mmHg；右下腹压痛、肌严重、有反跳痛、肠鸣音消失，闭孔内肌试验阳性；WBC12.5X10⁹ / L，中性粒细胞比例 0.82；腹部 X 线平片可见盲肠扩大和液平面。行急诊手术治疗,术后第 3 天病人体温为 38.9℃，暗语红肿、压痛。

49)入院时应考虑(。)

A.急性单纯性阑尾炎 B. 急性化脓阑尾炎 C.坏疽性阑尾炎

D.穿孔性阑尾炎 E. 急性胰腺炎

50)该病人阑尾位置最可能为(。)

A.靠近盲肠后方 B.靠近盲肠前方 C.靠近腰大肌前方 D.靠近腰大肌后方 E.靠近闭孔内肌

51)该病人术后发生(。)

A.腹腔内出血 B.暗语熏染 C.腹腔熏染

D.盆腔感染 E.腹腔脓肿

52)手术第 3 天后，下列哪项护理措施最关键(。)

A.继续静脉补液 B.做好引流管护理 C.及时更换被渗液污染的敷料 D.做好生活护理 E.康复知识教育

男，36 岁，反复右上腹痛、寒战、黄疸 5 年，此次发病后黄疸持续不退。体检示：体温 39.5℃，脉搏 122 次 / 分钟，

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/776200032124010045>