

心血管内科实习医师出科理论考核

一、选择题

1、循环系统疾病引起呼吸困难最常见的病因（ ）[单选题]。

A、左心衰竭✓

B、右心衰竭

C、心包炎

D、心肌炎

2、心源性水肿最常见的病因为（ ）[单选题]。

A、左心衰竭

B、右心衰竭✓

C、渗液性心包炎

D、缩窄性心包炎

3、可引起左心室前负荷过重的疾病是（ ）[单选题]。

A、高血压

B、主动脉瓣狭窄

C、二尖瓣关闭不全✓

D、肺动脉高压

4、引起左心室后负荷增加的疾病是（ ）[单选题]。

A、二尖瓣狭窄

B、高血压✓

C、肺动脉狭窄

D、主动脉瓣关闭不全

5、引起心力衰竭最常见的诱因是 () [单选题]。

A、呼吸道感染✓

B、心房颤动

C、劳累

D、情绪激动

6、以下哪项不属于左心衰竭的表现 () [单选题]。

A、呼吸困难

B、恶心，呕吐✓

C、疲乏无力

D、咯血

7、以下哪项不是右心衰竭的特点 () [单选题]。

A、双下肢水肿

B、发绀

C、颈静脉怒张

D、咳嗽✓

8、左心衰竭最早出现的症状是 () [单选题]。

A、劳力性呼吸困难✓

B、端坐呼吸

C、刺激性干咳

D、心源性哮喘

9、心力衰竭病人使用利尿剂时应特别注意（ ）[单选题]。

- A、心率变化
- B、血压变化
- C、电解质变化✓
- D、肾功能变化

10、目前地高辛用于治疗心力衰竭最常用的给药方法是（ ）[单选题]。

- A、维持量法✓
- B、大剂量冲击疗法
- C、隔日疗法
- D、顿服法

11、以下哪种情况最适于选用西地兰（ ）[单选题]。

- A、心衰伴快速房颤✓
- B、急性心衰
- C、慢性心衰加重
- D、快速房颤

12、以下哪项不是循环系统疾病病人的常用检查（ ）[单选题]。

- A、心电图
- B、超声心动图
- C、动态心电图
- D、肺功能检查✓

13、给病人服用洋地黄类药物前应测量（ ）[单选题]。

- A、体温

B、脉搏✓

C、呼吸

D、血压

14、洋地黄中毒最重要的不良反应是（ ）[单选题]。

A、恶心、呕吐

B、视物模糊、黄视

C、心律失常✓

D、心力衰竭

15、洋地黄中毒引起的快速性心律失常首选抗心律失常药为（ ）[单选题]。

A、心得安

B、普罗帕酮

C、苯妥英钠✓

D、维拉帕米

16、引起快速性心律失常的最常见机制是（ ）[单选题]。

A、自律性增高

B、折返✓

C、触发活动

D、阻滞及干扰

17、临床上最常见的心律失常是（ ）[单选题]。

A、心房颤动

B、病窦综合征

C、期前收缩✓

D、房室传导阻滞

18、室性阵发性心动过速的首选药物是 () [单选题]。

A、利多卡因✓

B、苯妥英钠

C、普罗帕酮

D、胺碘酮

19、以下哪种心律失常病人听诊心律绝对规则 () [单选题]。

A、室上性阵发性心动过速✓

B、心房颤动

C、心房扑动

D、期前收缩

20、以下关于心房颤动临床特点的描述，错误的是 () [单选题]。

A、第一心音强弱不等

B、短绌脉

C、心房内易形成血栓

D、奇脉✓

21、室性阵发性心动过速最常见于 () [单选题]。

A、急性心肌梗死✓

B、心肌病

C、心肌炎

D、电解质紊乱

22、慢性心房颤动的常见并发症是 () [单选题]。

A、完全性房室传导阻滞

B、肺炎

C、动脉栓塞✓

D、感染性心内膜炎

23、以下哪项心律失常采用机械兴奋迷走神经的方法可能终止发作（ ）[单选题]。

A、阵发性室上性心动过速✓

B、房室传导阻滞

C、房室颤动

D、频发室性期前收缩

24、胺碘酮最常见的不良反应（ ）[单选题]。

A、心律失常

B、转氨酶升高

C、甲亢

D、肺纤维化✓

25、第一房室传导阻滞是指 PR 间期超过（ ）[单选题]。

A、0.11s

B、0.12s

C、0.20s✓

D、0.40s

26、心脏骤停病人的心电图表现，最常见的是（ ）[单选题]。

A、心脏停搏

B、心室停顿

C、心室扑动或颤动✓

D、无脉性电活动

27、建立人工通气的最好方法是（ ）[单选题]。

A、口对口人工呼吸

B、气管内插管✓

C、气管切开

D、清理呼吸道分泌物

28、心肺复苏基础生命支持是内容包括（ ）[单选题]。

A、人工呼吸、恢复循环、药物治疗

B、气管插管、人工呼吸、恢复循环

C、保持气道通畅、人工呼吸、电除颤

D、开放气道、人工呼吸、恢复循环✓

29、以下哪种药物用于缓慢型心律失常和房室停顿的病人（ ）[单选题]。

A、利多卡因

B、普鲁卡因酰胺

C、心律平

D、阿托品✓

30、正常二尖瓣口面积为（ ）[单选题]。

A、4~6 c m²✓

B、1.5~2 c m²

C、1~1.5 c m²

D、2~3 c m²

31、主动脉瓣狭窄最有意义的体征是（ ） [单选题] *

A、抬举性心间搏动

B、脉压减小

C、细迟脉

D、主动脉瓣区闻及粗糙而响亮的喷射性收缩期吹风样杂音✓

32、下列哪项疾病最易并发脑血管栓塞（ ） [单选题] *

A、二尖瓣狭窄伴房颤✓

B、主动脉瓣狭窄

C、心力衰竭

D、高血压

33、根本性解决风湿性心脏瓣膜病的手段是（ ） [单选题] *

A、人工瓣膜置换术✓

B、抗风湿治疗

C、并发症治疗

D、介入治疗

34、诊断二尖瓣狭窄最可靠的检查方法是（ ） [单选题] *

A、心电图

B、超声心动图✓

C、胸部平片

D、运动心电图

35、脉压增大时可出现（ ） [单选题]。

A、奇脉

- B、重脉
- C、细迟脉
- D、水冲脉✓

36、动脉粥样硬化最重要的危险因素是（ ）[单选题]。

- A、高血压
- B、血脂代谢异常✓
- C、年龄
- D、性别

37、冠心病具有确诊价值的检查手段是（ ）[单选题]。

- A、冠状动脉造影✓
- B、心电图
- C、超声心动图
- D、运动负荷试验

38、典型的心绞痛与心肌梗死病人胸痛症状鉴别最重要的是（ ）[单选题]。

- A、疼痛的部位
- B、疼痛持续的时间✓
- C、疼痛的性质
- D、疼痛是伴随的症状

39、心绞痛发作时最重要的缓解方法是（ ）[单选题]。

- A、立即到医院就诊
- B、立即含服硝酸甘油✓
- C、吸氧

D、避免情绪激动

40、对于不稳定型心绞痛病人，最优先考虑的护理诊断/问题是（ ）[单选题]。

A、疼痛

B、知识缺乏

C、焦虑

D、潜在并发症：心肌梗死✓

41、稳定型心绞痛与不稳定型心绞痛的主要区别在于（ ）[单选题]。

A、发病机制不同✓

B、发病诱因不同

C、发病部位不同

D、疼痛性质不同

42、急性心肌梗死病人首要的护理诊断/问题通常是（ ）[单选题]。

A、自理缺陷

B、知识缺乏

C、疼痛✓

D、有便秘的危险

43、急性心肌梗死发生时应用尿激酶的作用在于（ ）[单选题]。

A、控制心源性休克

B、减轻心脏负荷

C、溶解冠脉内血栓✓

D、消除心律失常

44、心肌梗死最早出现的最突出的症状是（ ）[单选题]。

A、胃肠道症状

B、胸痛✓

C、心律失常

D、心力衰竭

45、急性心肌梗死早期最常见的致病原因是 () [单选题]。

A、室性心律失常✓

B、心源性休克

C、心脏破裂

D、室壁瘤

46、急性心肌梗死发生的第一个 24h 不主张应用 () [单选题]。

A、洋地黄制剂✓

B、吗啡

C、ACEI 类

D、血管紧张素受体拮抗剂

47、急性心肌梗死发生后，下列哪项情况不考虑溶栓治疗 () [单选题]。

A、高血压危象✓

B、腹部手术后半年

C、高血糖

D、高血脂

48、急性心肌梗死时，缓解疼痛最有效的药物为 () [单选题]。

A、地西洋

B、硝酸甘油

C、吗啡✓

D、消心痛

49、心肌梗死病人在进行康复训练时 ,表现出下列哪项情况应鼓励病人进行高一个阶段的运动水平()。

A、心律较运动前增加小于 10 次/分✓

B、运动后出现胸痛

C、运动过程中伴有轻度头晕症状

D、收缩压降低超过 15mmHg

50、原发性高血压的病因是 () [单选题]。

A、进食盐量过多

B、周围血管阻力增加

C、动脉粥样硬化

D、在一定的遗传背景下多种后天环境因素作用✓

51、高血压病人服药原则不包括 () [单选题]。

A、服药后病人血压降至正常时方可停药✓

B、病人应经常测血压,根据血压调节用药

C、要防止直立性低血压

D、多数病人要终生服药

52、下列应用硝普钠的注意事项不当的叙述是 () [单选题]。

A、快速静滴 , 将血压迅速降至正常✓

B、避光输入

C、现用现配

D、每 6h 换一次

53、有引起刺激性干咳不良反应的降压药物是 () [单选题]。

- A、阿替洛尔
- B、卡托普利✓
- C、硝苯地平
- D、氨苯蝶啶

54、病毒性心肌炎的护理重点在于 () [单选题]。

- A、加强锻炼，增强机体抵抗力
- B、接种流感疫苗，预防感冒
- C、充分休息，保证丰富的营养✓
- D、绝对卧床 3 个月，低盐饮食

55、关于病毒性心肌炎的药物治，不恰当的是 () [单选题]。

- A、首选糖皮质激素✓
- B、大剂量维生素 (C) 静滴
- C、中药
- D、干扰素

56、梗阻性肥厚性心肌病病人出现胸痛，不宜采用的处理方法是 () [单选题]。

- A、卧床休息
- B、硝酸甘油含服✓
- C、给氧
- D、合心爽口服

57、梗阻性肥厚型心肌病首选的治疗为 () [单选题]。

- A、 β 受体阻滞剂✓

B、肥厚心肌切除术

C、洋地黄制剂

D、硝酸酯制剂

58、扩张型心肌病 X 线检查的主要特点是 () [单选题]。

A、心影呈梨形

B、心脏扩大，脉搏减弱✓

C、心影左缘明显突

D、心影呈烧瓶样

59、下列哪一项对梗阻性肥厚型心肌病的诊断最有帮助 () [单选题]。

A、晕厥病史

B、反复出现心力衰竭

C、心电图

D、超声心动图✓

60、梗阻性肥厚型心肌病最有意义的体征是 () [单选题]。

A、心尖部舒张期杂音

B、奇脉

C、胸骨左缘收缩期吹风样杂音✓

D、心包摩擦音

61、急性感染性心内膜炎最常见的症状是 () [单选题]。

A、贫血

B、发热✓

C、栓塞

D、乏力

62、感染性心内膜炎致病菌为真菌是首选的抗生素是 () [单选题]。

A、两性霉素 B ✓

B、庆大霉素

C、万古霉素

D、阿米卡星

63、急性自体瓣膜心内膜炎的主要致病菌是 () [单选题]。

A、青绿色链球菌 ✓

B、肺炎球菌

C、淋球菌

D、流感嗜血杆菌

64、大量渗血性心包炎最突出的症状是 () [单选题]。

A、呼吸困难 ✓

B、发热

C、声音嘶哑

D、乏力

65、Kussmaul 征常见于 () [单选题]。

A、高血压

B、心肌梗死

C、心力衰竭

D、缩窄性心包炎 ✓

66、对于渗出性心包炎最具有诊断价值的检查是 () [单选题]。

- A、血沉
- B、超声心动图✓
- C、心电图
- D、血常规

67、缩窄性心包炎最常见的病因为（ ）[单选题]。

- A、结核性✓
- B、化脓性
- C、外伤性
- D、肿瘤性

68、急性心包炎病人出现心脏压塞时最突出的症状是（ ）[单选题]。

- A、呼吸困难✓
- B、血压升高
- C、发热
- D、上腹痛

69、心脏电复律前后的护理配合不当的是（ ）[单选题]。

- A、做好心理护理，解除病人的思想顾虑
- B、提前 1~3 天给予洋地黄药物✓
- C、复律后继续服用抗心律失常药物
- D、监测生命体征变化

70、心房扑动进行电复律治疗时，通常能量选择为（ ）[单选题]。

- A、50~100J✓
- B、100~150J

C、150~200J

D、200~360J

71、某心脏病病人轻体力活动时无症状，但较重体力活动即出现呼吸困难等症状，则此病人的心脏功能状态是（ ）[单选题]。

A、心功能Ⅰ级

B、心功能Ⅱ级✓

C、心功能Ⅲ级

D、心功能Ⅳ级

72、16岁女学生，平素体健，学校体检时心率96次/分，律齐，心尖区闻及3/6级收缩期吹风样杂音，心界增大不明显，最恰当的保健指导是（ ）[单选题]。

A、避免剧烈运动，防止感染，定期随访✓

B、保持卧床休息

C、及早用洋地黄治疗

D、给予利尿剂

73、男性，40岁，因扩张型心肌病入院，治疗后气急、水肿好转。1h前突感心悸、胸闷、头晕、心率180次/分。心电图示阵发性室上性心动过速，首选药物为：（ ）[单选题]。

A、阿托品

B、利多卡因

C、维拉帕米✓

D、洋地黄

74、男性，20岁，学生，自诉心慌。心电图：提前出现形态异常的QRS波群，时限0.12s，T波与QRS主波方向相反，期前无相关P波。该病人的心电图诊断为（ ）[单选题]。

- A、房性期前收缩
- B、室性期前收缩✓
- C、房性心动过速
- D、心房颤动

75、女性，56岁，有“风湿性心脏病”病史，自诉心慌。心电图：P波消失，代之以间距振幅不等的畸形波，频率360次/分，QRS波形态正常，律绝对不规则。该病人的心电图诊断为（ ）[单选题]。

- A、室上性心动过速
- B、室性心动过速
- C、心房扑动
- D、心房颤动✓

76、女性，33岁，劳累后心悸、气急6年。查体：二尖瓣面容，第一心音亢进，心尖部可闻及隆隆样舒张期杂音，有开瓣音，心律规则。本次因呼吸困难不能平卧入院。该病人首选的护理问题是（ ）[单选题]。

- A、气体交换受损✓
- B、肺淤血
- C、活动无耐力
- D、心力衰竭

77、急性心肌梗死病人，突然出现烦躁，呼吸困难，两肺听诊满布干、湿罗音，心律110次/分，此时，应首选考虑病人发生了（ ）[单选题]。

- A、肺感染
- B、心源性休克
- C、急性左心衰✓
- D、肺栓塞

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/778016003006006037>