

## 中医眼科学试题及答案

1、狭义的内障专指

- A. 绿风内障
- B. 青风内障
- C. 圆翳内障
- D. 高风内障
- E. 黑风内障

**【答案】**C

2、患者 15 岁,胞睑内生硬核,皮色如常,按之不痛,睑内呈灰蓝色隆起,舌苔薄白,脉缓,宜采用下列何方加减治疗

- A. 化坚二陈汤
- B. 温胆汤
- C. 四君子汤
- D. 仙方活命饮
- E. 以上都不是

**【答案】**A

3、视网膜由外向内分为（）层

- A. 3
- B. 5
- C. 6

D. 8

E. 10

**【答案】E**

4、黑睛疾病向纵深发展时应重视什么治疗

A. 缩瞳

B. 散瞳

C. 抗病毒

D. 抗细菌

E. 抗霉菌

**【答案】B**

5、下列哪一种眼病不属于内障范畴

A. 瞳神紧小

B. 视瞻昏沙

C. 青盲

D. 混睛障

E. 云雾移睛

**【答案】D**

6、泻火解毒法主要用于治疗

A. 外感火热之邪所致的眼病

- B. 外感风热之邪所致的眼病
- C. 阴虚火旺所致的眼病
- D. 气血凝滞所致的眼病
- E. 肝气郁结所致的眼病

【答案】A

7、患者,女,32岁。右眼3点位近瞳孔缘处有一3mm×4mm翳障,其表面光滑,边缘清晰,无红赤肿痛,可诊断为

- A. 宿翳
- B. 凝脂翳
- C. 湿翳
- D. 混睛障
- E. 暴露赤眼生翳

【答案】A

8、治疗暴露赤眼生翳属肝经风热证的主方是

- A. 石决明散
- B. 龙胆泻肝汤
- C. 小柴胡汤
- D. 新制柴连汤
- E. 银翘散

【答案】A

9、暴风客热的病名首载于

- A. 《审视瑶函》
- B. 《龙树菩萨眼论》
- C. 《银海精微》
- D. 《证治准绳》
- E. 《古今医统》

**【答案】** C

10、西医学之近视眼,相当于中医之

- A. 能远怯近症
- B. 能近怯远症
- C. 视矇
- D. 青盲
- E. 眯目外障

**【答案】** B

11、治疗惊震内障的原则是

- A. 视功能正常时可定期检查观察,若视功能损伤严重应手术治疗,术后配合弱视训练
- B. 及时手术治疗
- C. 防止紫外线照射
- D. 晶珠破损,继发绿风内障,应及时手术治疗

E. 继发绿风内障时可点用抗生素类和糖皮质激素类眼药水

**【答案】D**

12、下列哪项不是惊震内障的临床表现

A. 晶珠全混, 视力下降

B. 晶珠脱位

C. 继发绿风内障

D. 灼热疼痛, 畏光流泪

E. 泪下频频, 泪水清冷稀薄

**【答案】E**

13、眼之能够明视万物, 辨别颜色, 有赖于

A. 肾精充养

B. 脾气温养

C. 肝气条达

D. 肝血升运

E. 五脏六腑精气的滋养

**【答案】E**

14、眼科时复病的主要发病特点是

A. 猝感疔气, 邪犯白睛

B. 畏光流泪, 时作时止

- C. 热泪如涌, 眵多似脓
- D. 变化迅速, 病势凶险
- E. 目痒难忍, 呈周期性发作

**【答案】E**

15、患者眼珠高突, 转动失灵, 胞睑红肿, 眼珠跳痛, 壮热神昏, 便秘溲赤者, 宜选下列何方加减治疗

- A. 散热消毒饮子
- B. 仙方活命饮
- C. 清瘟败毒饮
- D. 泻心汤合导赤散
- E. 九味羌活汤

**【答案】C**

16、患漏睛疮属于风热上攻型, 症见大眦角处红肿疼痛, 头痛泪多, 恶寒发热者应用何方为宜

- A. 黄连解毒汤
- B. 千金托里散
- C. 驱风散热饮子
- D. 驱风一字散
- E. 竹叶泻经汤

**【答案】C**

17、患眼被剪刀刺伤,剧痛畏光.热泪频流.视力剧降。白睛混赤,黑睛破损,黄仁组织脱出,神水混浊.黄液上冲,舌红苔黄.脉数。证属

A. 气滞血瘀

B. 络伤出血

C. 毒伤健眼

D. 脓毒侵袭

E. 阴亏翳留

**【答案】D**

18、下列哪一种眼病与疔气犯目有关

A. 风赤疮痍

B. 暴风客热

C. 天行赤眼暴翳

D. 漏睛疮

E. 凝脂翳

**【答案】C**

19、眼部的神经支配丰富,与眼相关的脑神经共有

A. 4对

B. 5对

C. 6对

D. 7对

E. 8 对

**【答案】** C

20、第一次提出食用牛羊等动物肝脏具有明目作用的是

A. 《外台秘要》

B. 《备急千金要方》

C. 《伤寒杂病论》

D. 《银海精微》

E. 《龙树眼论》

**【答案】** B

**【解析】**

21、患者 12 岁, 针眼屡发, 面色少华, 倦怠无力, 舌淡苔白, 脉细数, 内治宜 ( )

A. 祛风清热, 消肿散结

B. 清热解毒, 消肿止痛

C. 健脾益气, 扶正祛邪

D. 清热化痰散结

E. 以上都不是

**【答案】** C

22、视乳头上的血管偏向鼻侧, 并呈屈膝状改变, C/D 扩大加深, 常见于下列哪种疾病

A. 目系猝病

- B. 视瞻昏渺
- C. 云雾移睛
- D. 高风雀目
- E. 青风内障

**【答案】** E

23、全科医疗的基本特征不包括

- A. 为社区居民提供连续性服务
- B. 提供以患者为中心的服务
- C. 提供以社区为基础的服务
- D. 提供以家庭为单位的服务
- E. 提供以家庭病床为主的服务

**【答案】** E

24、关于早产儿视网膜病变表现, 下列哪项不是

- A. 视网膜嵴
- B. 视网膜外纤维血管组织增生
- C. 视网膜脱离
- D. 视网膜血管化与非血管化区域之间存在分界线
- E. 视网膜出血. 水肿

**【答案】** E

25、患者突发双眼白睛红赤,痒涩刺痛,羞明流泪,眵多黏稠,胞睑肿胀,伴有头痛鼻塞,恶风发热;舌质红,苔薄白或微黄,脉浮数。多因

- A. 风热外袭,热重于风
- B. 风热外袭,风热并重
- C. 脾经风热夹湿
- D. 风热外袭,风重于热
- E. 以上都不是

**【答案】** D

26、消风散适用的白睛疾病是

- A. 时复病
- B. 暴风客热
- C. 天行赤眼
- D. 金疳
- E. 火疳

**【答案】** A

27、疏风清热法主要是用来治疗

- A. 火热毒邪或脏腑热毒上攻所致眼病
- B. 外感风寒所致眼病
- C. 湿邪外侵或内生所引起的眼病
- D. 外感风热所致眼病

E. 因肝气郁结所致眼病

【答案】A

28、中医眼科解剖名词“眼带”是指现代眼科中的

A. 悬韧带

B. 晶状体

C. 视神经

D. 眼外肌

E. 睫状体

【答案】D

29、患者检查见胞睑内面有状如铺路卵石样的扁平颗粒,其诊断应为

A. 时复病

B. 金疳

C. 火疳

D. 椒疮

E. 粟疮

【答案】A

30、天行赤眼患眼灼热刺痒, 碜涩疼痛, 羞明流泪, 眼眵稀薄, 白睛红赤有点片状溢血; 伴见发热头痛, 鼻塞流涕, 耳前颌下可扪及肿核; 舌质红, 苔薄黄, 脉浮数。治宜选用

A. 驱风散热饮子加减

B. 泻肺饮加减

- C. 泻白散加减
- D. 菊花决明散加减
- E. 黄连解毒汤

【答案】A

31、络损暴盲,眼底视网膜静脉纤曲扩张,视网膜火焰状出血.水肿,胸胁胀痛,或情志抑郁,食少暖气,或烦躁易怒;舌有瘀斑,脉涩。治疗宜选

- A. 活血化瘀法
- B. 凉血止血法
- C. 泻肝降逆法
- D. 泻火止血法
- E. 息风活络法

【答案】A

32、麻痹性斜视时,斜视角检查为

- A. 第二斜视角大于第一斜视角
- B. 第二斜视角小于第一斜视角
- C. 第一斜视角等于第二斜视角
- D. 斜视角不稳定
- E. 视角查不出

【答案】A

33、对眼的解剖生理,眼病的病因病机.临床证候.针刺疗法等有初步论述,为后世中医眼科学发展提供了一定理论基础的中医早期文献是

- A. 《难经》
- B. 《黄帝内经》
- C. 《伤寒杂病论》
- D. 《神农本草经》
- E. 《龙树眼论》

**【答案】** B

**【解析】**

34、患者病起突然,双眼睑肿胀,白睛红赤,黑睛生翳,眼痒眼痛,羞明流泪,脉浮数,当用

- A. 泻火解毒法
- B. 疏风清热法
- C. 祛风散寒法
- D. 祛湿法
- E. 退翳明目法

**【答案】** B

35、宿翳中之最轻者为

- A. 云翳
- B. 冰瑕翳

- C. 厚翳
- D. 斑脂翳
- E. 气翳

【答案】B

36、突起睛高的病因病机是

- A. 肝郁化火, 攻冲目窍
- B. 风痰上逆, 阻滞脉络
- C. 恣嗜烟酒, 过食肥甘之品而生
- D. 素体阴亏, 阴虚阳亢
- E. 风热邪毒侵袭或邻近病灶毒邪蔓延所致

【答案】E

37、患者眼前黑影遮挡, 视力骤降, 血灌瞳神, 全身伴急躁易怒, 口苦咽干, 胸胁胀痛, 舌红苔黄, 脉弦涩, 治宜()

- A. 清肝泻火, 凉血止血
- B. 滋阴降火, 止血散瘀
- C. 健脾养心, 益气摄血
- D. 行气活血, 祛瘀通络
- E. 疏肝解郁, 和血明目

【答案】A

38、眼球穿通伤最严重的并发症是

- A. 角膜穿破, 遗留白斑
- B. 眼内感染致视力突降
- C. 发生交感性眼炎
- D. 产生外伤性白内障
- E. 引起伤眼视网膜脱离

【答案】C

39、《诸病源候论·目病诸候》“谓眼本无异, 瞳子黑白分明, 直不见物耳”指的是  
( )病

- A. 青盲
- B. 视瞻昏渺
- C. 聚星障
- D. 云雾移睛
- E. 暴盲

【答案】A

40、患儿内眦部白睛暴露少, 似有“对眼儿”, 经下列哪项检查可排除内斜视

- A. 眼压正常
- B. 眼球转动不受限制
- C. 角膜映光正位
- D. 双眼视力对称
- E. 以上都不是

**【答案】** C

41、根据《原机启微》，与神水生成关系最密切的是

A. 脾之精

B. 肾之精

C. 肝之精

D. 肺之精

E. 心之精

**【答案】** B

42、不属于突起睛高范畴的眼病是

A. 全眼球炎

B. 眼眶蜂窝织炎

C. 眶骨膜炎

D. 眼球筋膜炎

E. 甲状腺相关眼病

**【答案】** E

43、五轮学说中,黑睛属于()

A. 肉轮

B. 血轮

C. 气轮

D. 风轮

E. 水轮

**【答案】D**

44、患者,男,35岁,视力下降,眼前黑影,视大为小,视物变性;黄斑水肿.渗出;兼见胸膈胀满,眩晕心悸,肢体乏力,舌苔白腻,脉沉滑,多因于

A. 肝肾两亏

B. 脾失健运

C. 痰湿蕴结

D. 肝经郁热

E. 以上都不是

**【答案】C**

45、以下哪些眼病不属于内障眼病

A. 暴盲

B. 视瞻昏渺

C. 青盲

D. 混睛障

E. 云雾移睛

**【答案】D**

46、哪个项目不是乌风内障诊断必须具备的

A. 有眼原发病变史

- B. 头痛, 眼胀, 视力下降
- C. 抱轮红赤, 瞳神散大
- D. 眼压明显增高
- E. 房角检查小梁新生血管膜形成, 虹膜周边前粘连, 甚至房角完全闭塞

**【答案】** C

47、 何种组织产生房水

- A. 睫状肌
- B. 睫状突
- C. 虹膜
- D. 脉络膜
- E. 前房角

**【答案】** B

**【解析】**

48、 根据五轮学说, 白睛属于

- A. 血轮
- B. 火轮
- C. 气轮
- D. 水轮
- E. 肉轮

**【答案】C**

49、患眼被剪刀刺伤,剧痛畏光.热泪频流.视力剧降。白睛混赤,黑睛破损,黄仁组织脱出,神水混浊.黄液上冲,舌红苔黄.脉数。证属

- A. 气滞血瘀
- B. 络伤出血
- C. 毒伤健眼
- D. 脓毒侵袭
- E. 阴亏翳留

**【答案】D**

50、下列哪种眼病不属于眼外伤范畴

- A. 撞击伤目
- B. 真睛破损
- C. 异物入目
- D. 漏睛
- E. 化学性眼损伤

**【答案】D**

51、“神膏”相当于西医眼科解剖名称是

- A. 房水
- B. 晶状体
- C. 玻璃体

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/778043061076006036>