

消化内科临床带教老师理论考核试题

一、单选题（共 50 题，每题 1 分）

1 . 急性胰腺炎时，血清淀粉酶增高的时间是

- A 发病后立即增高
- B 发病后四小时开始增高
- C 发病后八小时开始增高
- D 发病后二十小时开始增高
- E 发病后二十四小时开始增高

2 . 原发性肝癌终末期最常见的致死并发症是

- A 食管胃底静脉曲张破裂出血
- B 肝性脑病
- C 腹水继发感染
- D 肝癌结节破裂出血
- E 应激性溃疡出血

3 . 肝硬化患者出现肝掌，蜘蛛痣与下列那些因素有关

- A. 门脉高压
- B 肾上腺皮质激素
- C 凝血因子合成减少
- D 雌激素增多
- E 醛固酮增多

4 . 复合性溃疡是指同时有

- A 胃大、小弯溃疡

B 胃体、窦溃疡

C 胃小弯与幽门管溃疡

D 胃与十二指肠溃疡 I

E 胃底、小弯溃疡

5 .

患者男性，28 岁，上腹痛 1 年伴反酸，最近出现夜间痛醒及黑便，X 线钡餐检查未发现异常，下步检查应首先考虑

A 便潜血 : < >

B 胃液分析

C 胃泌素测定

D 复查 X 线钡餐

E 胃镜检查

6 . 不是肝肾综合症特征的是

A 少尿或无尿

B 低尿钠

C 稀释性低钠血症

D 氮质血症

E 肾小管坏死

7 . 幽门梗阻伴严重呕吐可造成

A 低钾性酸中毒

B 低钾低氯性酸中毒

C 低氯高钾性碱中毒

D 低氯高钠性碱中毒

E 低钾低氯性碱中毒 I

8 .以下哪项不是肝性脑病昏迷期的临床表现

A 昏迷

B 各种反射消失

C 扑翼样震颤

D 脑电图异常

E 可有踝阵挛

9 .晚期肝硬化发生酸碱平衡紊乱中，最常见的是

A 呼吸性碱中毒

B 代谢性碱中毒

C 代谢性酸中毒

D 呼吸性酸中毒

E 呼吸性碱中毒，代谢性酸中毒

10 .冠心病伴肝硬化上消化道出血治疗错误的是

A 三腔管压迫

B 去甲肾上腺素胃管滴注

C 垂体后叶素静脉滴注 I

D 6-氨基己酸静脉滴注

E 冰盐水洗胃

11 .幽门梗阻伴严重呕吐可造成

A 低钾性酸中毒

- B 低钾低氯性酸中毒
- C 低氯高钾性碱中毒
- D 低氯高钠性碱中毒
- E 低钾低氯性碱中毒 I₁

12 .肝细胞严重坏死时，肝功能异常主要表现为

- A 单胺氧化酶升高
- B 白、球比例倒置
- C 凝血酶原时间延长
- D 谷丙转氨酶升高
- E AST(GoT)活力高于 ACT(GpT)IF1; G>

13 .对上消化道出血的病人以下哪项处置是错误的

- A 积极补充血容量
- B 立即行 X 线钡餐检查<
- C 急诊胃镜检查
- D 药物治疗止血
- E 必要时行手术治疗

14 .

患者男性，28 岁，上腹痛 1 年伴反酸，最近出现夜间痛醒及黑便，X 线钡餐检查未发现异常，下步检查应首先考虑

- A 便潜血
- B 胃液分析
- C 胃泌素测定
- D 复查 X 线钡餐

E 胃镜检查 LL: 」

15 .消化性溃疡临床表现特点哪项不正确

A 常表现发作期与缓解期相互交替

B 发作期常出现于秋冬或冬春之交

C 周期性不受并发症有无的影响(正确明性)

D 部分患者可无节律性疼痛

E 精神紧张常是诱因

16 .消化性溃疡活动期大便隐血试验阳性，提示每日出血量为：

A. <1ml

B. 1-2ml

C. 2-3ml

D. 3-4ml

E. >5ml

17 .原发性肝癌肝外血行转移最多见于：

A.肺

B.骨

C 肾

D.脑

E.皮肤

18 .急性胰腺炎是：

A.感染性疾病

B.遗传性疾病

C.自身消化性疾病，

D.免疫性疾病

E.结缔组织病

19 .肝性脑病病人应当:

A.供给足量的热能与蛋白质

B.给予足量脂肪以提供热能

C.供给足量的糖和钠盐

D.每天给水不少于 2500ml

E.给予足量的碳水化合物。 (府 Gw)

20 .在我国肝硬化的主要原因是:

A.酒精中毒

B.中毒性肝炎

C.病毒性肝炎

D.营养失调

E.慢性肠道感染

21 .对肝硬变病人的护理是:

A.应严格限制蛋白质,以预防肝性脑病发生

B.可以进食普通食物,无特殊要求

C.少量饮酒可以扩张血管改善门静脉循环

D.避免粗糙食物

E.腹水时,每天给水量也不能少于 1500ml

22.可以确诊胰腺炎的血清淀粉酶数值是:

- A. 125 苏氏单位
- B. 250 苏氏单位
- c.500 苏氏单位 (mz)
- D. 350 苏氏单位
- E. 1000 苏氏单位

23 .急性胰腺炎出现休克，最主要的治疗措施是：

- A.补充血容量 (U
- B.应用升压药
- C.应用肝素
- D.使用抑肽酶
- E.使用肾上腺皮质激素

24 .治疗十二指肠球部溃疡的最重要措施是：

- A.少食多餐
- B. 保护胃黏膜
- C.制止胃酸
- D.中枢镇静
- E.早期手术

25 .最能提示幽门梗阻的临床表现是：

- A.上腹部触及包块
- B.剑突下偏右压痛明显
- C.吐出大量的宿食
- D.餐后腹胀
- E.胃部振水音

26 .下面哪一项不是门脉高压的常见表现:

- A.脾肿大
- B.肝肿大 (正确答案)
- C.食管静脉曲张破裂出血
- D.腹水
- E.痔核形成

27. 肝昏迷前驱期的主要表现是:

- A.轻度性格和行为改变
- B.扑翼样震颤
- C.脑电图异常
- D.意识错乱
- E.昏睡但可唤醒

28.治疗消化性溃疡, 应用下列何种药物抑制胃酸和胃蛋白酶分泌最有效:

- A.甲鼠咪呱 [正确答案)
- B.阿托品
- C.硫糖铝
- D.前列腺素
- E₂ (PGE₂)
- E.氢氧化铝凝胶

29.紧急胃镜检查应在上消化道出血后:

- A. <24h
- B. 24-48h
- C.48-72h

D.>72h

E.出血停止

30.抑制胃酸药作用最强的药物是:

A. H₂ 受体拮抗剂

B.抗胆碱能药物

C.丙谷胺

D.奥美拉唑

E.前列腺素比

31 .胃溃疡患者上腹部疼痛典型节律是:

A.疼痛—进食—疼痛

B.进食—疼痛—缓解

C.缓解—疼痛—进食

D.进食—缓解—疼痛

E.疼痛—进食—缓解

32 .肝性脑病发生代谢性碱中毒时可用:

A.谷氨酸钠

B.谷氨酸钾

C.乙酸谷氨酸胺

D.精氨酸 I

E.不作处理

33 .血清淀粉酶在发病后开始升高的时间是:

A.3-4h

B. 6-8h [正确答案)

C. 10-12h

D. 16-20h

E. 24h 左右

34 .消化性溃疡病的主要临床表现:

A.持续性上腹痛

B.反酸、暖气

C.食欲不振、上腹部不适

D.精神、神经症状

E.慢性、周期性、节律性上腹痛

35 .胃溃疡发病的最主要因素是:

A.胃酸分泌增高

36 胃黏膜屏障减弱(-)

C.遗传因素

D.免疫因素

E.饮食不节

36 .出现黑粪提示一次出血量至少在:

A. 5ml 以上

B. 50ml 以上 (正战答案)

C. 100ml 以上

D. 150ml 以上

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/778113015116006027>