

# 2023 年上海（妇产科）产院上岗人员考试

## 一、选择题

1 .乙肝疫苗的免疫程序"0. 1,6"方案中:0"是指新生儿出生后（） [单选题] \*

A.2 小时

2 .24 小时内  V

C.12 小时

D.36 小时

3 .我国于（）年将乙肝疫苗纳入免疫规划 [单选题] \*

A.2000

B.2001

C.2002  ✓

D.2004

4 .下列关于卡介苗的补种说法错误的是 [单选题] \*

A.接种卡介苗后未形成卡疤的需要重新补种  V

B.未接种卡介苗的<3 月龄儿童可直接补种

C.3 月龄~3 岁儿童对结核菌素或卡介菌纯蛋白衍生物（PPD）试验阴性者补种

D.≥4 岁儿童不予补种

4 .对于卡介苗的接种，以下正确的是 [单选题] \*

A.对已接种卡介苗者，不推荐复种  ✓

B.对已接种卡介苗但卡疤阴性者，直接复种

C.出生时初免，6 周岁加强

D.对已接种卡介苗但卡疤阴性者，任何年龄段都需要先做结素试验，阳性者复种

5 . 现场接种时，接种证上不需要登记的资料是 [单选题] \*

A.疫苗名称

B.接种时间

C.疫苗批号

D.环境温度 ✓

6 . 乙肝疫苗接种对象为 [单选题] \*

A.乙型肝炎病毒表面抗原阳性母亲所生的新生 J1

B.乙型肝炎病毒表面抗原和 e 抗原双阳性的母亲所生的新生儿

C.家庭成员中有乙型肝炎感染者的新生 J1

D.以上均是 ✓

7 . 每台冰箱均应配有温度计, 每天上午和下午各 2 次, 间隔不少于 () 小时, 观察冰箱内的温度及其运转情况, 并填写"冷链设备温度记录表" [单选题] \*

A.2 小时

8 . 4 小时

C.6 小时 ✓

D.8 小时

9 . 卡介苗和乙肝疫苗应在 () °C 保存 [单选题] \*

A. -20°C

B. 1~2°C

C. 2~8°C ✓

D. 室温保存

10 卡介苗接种事故中常用的治疗药物是 ( ) [单选题] \*

A. 异烟肼 ✓

B. 链霉素

C. 利福平

D. 吡嗪酰胺

11 卡介苗安瓿开启后, 超过 ( ) 小时应废弃 [单选题] \*

A. 0.5h ✓

B. 1h

C. 1.5h

D. 2h

12 有关接种乙肝疫苗技术的说法, 正确的是 ( ) [单选题] \*

A. 皮下注射, 进针角度 10~15°

B. 皮下注射, 进针角度 15~30°

C. 皮下注射, 进针角度 30~40°

D. 持毛笔式, 进针角度 90°

13 有关接种卡介苗进针角度的说法, 正确的是 ( ) [单选题] \*

A. 10-15° ✓

B. 15~30°

C.30~40°

D..60~90°

14 .关于冻结过的疫苗下列说法正确的是（） [单选题] \*

A.一律不得使用 ✓

B.可以使用

C.摇匀后可以使用

15 .有以下哪几种情况时暂缓接种乙肝疫苗（） [单选题] \*

A.严重出生缺陷

B.重度窒息

C.极低出生体重儿（出生体重小于 1500g 者）

D.呼吸窘迫综合征

E.以上均正确 ✓

16 .卡介苗应在（）部位接种 [单选题] \*

A.左上臂三角肌外下缘皮内 ✓

B.右上臂三角肌外下缘肌内

C.左上臂三角肌外下缘皮下

D.右上臂三角肌外下缘皮下

17 .乙肝疫苗应在（）部位接种 [单选题] \*

A.左上臂三角肌外下缘皮内

B.右上臂三角肌中部肌内 ✓

C.左上臂三角肌外下缘皮下

D.右上臂三角肌外下缘皮下

18 .关于卡介苗接种下述哪项是正确的？（） [单选题] \*

A.菌苗为无毒人型活结核菌

B.儿童每隔 5 年复种一次

C.卡介苗效果是绝对肯定的

D.接种前均需做 PPD 试验

E.使人产生免疫力同时也产生变态反应 ✓

19 . 根据 WHO 对 HIV 感染者的卡介苗接种政策, 以下哪项说法是错误的? [单选题] \*

A.HIV(-)且无症状的儿童可接种卡介苗

B.HIV(±)而无症状的儿童可接种卡介苗,

C.HIV(+) 且有症状的儿童不准接种卡介苗

D.无论有无症状, HIV(+) 均不准接种卡介苗

20 . 按国家免疫程序, 新生儿应接种()疫苗 [单选题] \*

A.仅乙肝疫苗

B.仅卡介苗

C.乙肝疫苗和卡介苗 ✓

21 .按上海市免疫规划工作现状, 新生儿预防接种证基本由()发放 [单选题] \*

A.产院 ✓

B.社区卫生服务中心

C.区疾控中心

D.居委

21.HBsAg 阳性或不详的母亲所生的低体重儿也应在出生后 12 小时内尽早接种第 1 剂乙肝疫苗, 但在

该低体重儿满 1 月龄后, 建议再按( )程序接种乙肝疫苗。 [单选题] \*

A.0、16 ✓

B.0、1

D.0、6

22.产科接种室应告知其监护人，建议儿童接种第3剂乙肝疫苗1~2个月后进行HBsAg和抗-HBs检测。若发现HBsAg阴性、St-HBs<10mIU/ml,监护人应将检测结果告知社区接种门诊，社区接种门诊可按照（ ）免疫程序再接种乙肝疫苗 [单选题] \*

A.0、1、6√

B.0、1

C.0

D.0、6

23. 以下乙肝疫苗接种操作错误的是（ ） [单选题] \*

A.注意核对新生儿姓名

B.检查疫苗有无过期、冻融等

C.酒精消毒、针面朝下抽吸疫苗、排除气泡

D.确定接种部位：左上臂三角肌中部，和卡介苗接种部位一致√

24. 以下接种操作正确的是（ ） [单选题] \*

A.及时在新生儿乙肝疫苗和卡介苗接种登记册和预防接种证上完整记录接种疫苗的日期、批号、接种者等

B.出院时给予家长预防接种证

C.产院医生应将新生儿接种和有关母亲的信息填在证上，告知家长出院后到居住地社区卫生服务中心办理相关接种手续

D.对于HBsAg阳性母亲或未做HBsAg检测但所生孩子属于<低体重儿的母亲，发放《新生儿乙肝疫苗接种告家长书》

E.以上说法均正确√

25. 卡介苗每支（ ）毫升，皮内注射剂量（ ）毫升 [单选题] \*

A.0.5ml/0.1ml

B.1 ml/0.1ml

C.1ml/0.2ml

D.0.5ml/0.2ml

26 .以下卡介苗操作正确的是 [单选题] \*

A.皮肤消毒：75%酒精（禁用含碘消毒剂）螺旋式，≥5cm 待干；避开疤痕、炎症、结节等

B.左手绷紧皮肤，右手持针筒，针尖斜面及针筒刻度一致向上

C.针头稍向下压平行刺入绷紧的表皮

D.射处皮内应出现直径>6 毫米桔皮样隆起小泡

E.以上均正确 ✓

27 .关于卡介苗安全注射,正确的说法是 [单选题] \*

A.疫苗开启超过半小时未用完应废弃

B.注射后将注射器统一回收处置

C.一人一针一管，使用有批准文号、合格的一次性 1 毫升注射器及 4.5 号针头

D.有卡介苗接种史者，无论是否有卡痕，无论 PPD 试验结果如何，均不再接种卡介苗

E.以上均正确 ✓

28 以下关于卡介苗接种后操作错误的是 [单选题] \*

A.接种当天，注射部位不要用水洗，保持干燥

B.出现白色小脓疱期间，洗澡时用干净手帕/消毒纱布包扎局部以免水溅入

C.不要经常用手去触摸

D.给新生儿勤剪指甲，勤换内衣，以保持局部清洁，避免其他细菌感染



E.BCG 的局部反应尽快热敷 ✓

29. 乙肝疫苗不主张臀部注射，主要原因是： [单选题] \*

A.易损伤坐骨神经

B.易损伤腓总神经

C.臀部肌肉丰富，疫苗吸收太快

D.臀部脂肪丰富，妨碍疫苗吸收 ✓

E.

30.卡介苗开启后，对未用完的疫苗处理正确的是： [单选题] \*

A.卡介苗为活疫苗，超过半小时未用完，应废弃 ✓

B.卡介苗为活疫苗，超过 1 小时未用完，应废弃

C.卡介苗为非活疫苗，超过 1 小时未用完，应废弃

D.卡介苗为非活疫苗，超过半小时未用完，应废弃

31.卡介苗的接种方法为： [单选题] \*

A.皮下注射法

B.皮内注射法 ✓

C.肌肉注射法

D.划痕法

32. 接种卡介苗的主要作用是： [单选题] \*

A.预防结核分枝杆菌的感染

B.阻止感染发生

C.预防婴幼儿结核也解莫炎和播散性疾病 ✓

D.降低结核病的发病率

33.卡介苗的接种剂量为： [单选题] \*

A.0.05ml

B.0.1ml√

C.0.5ml

D.1.0ml

34 .下列有关卡介苗接种操作不正确的是： [单选题] \*

A.用含碘消毒剂螺旋式皮肤消毒,范围≥5cm√

B.针头稍向下压平行刺入绷紧的表皮

C.注射处皮内应出现直径>6毫米桔皮样隆起小泡

D.将针头捻转 180。退出

35 .受种部位消毒应由内向外螺旋式进行,涂擦直径为： [单选题] \*

A.≥1cm

B.≥3cm

C.≥4cm

D.≥5cm√

36 .下列有关接种卡介苗之后的一般反应,说法不正确的是： [单选题] \*

A.接种部位可出现红肿浸润、化脓,形成小溃疡

B.一般经过 8~12 周自行吸收、结痂,留下永久性凹陷疤痕,俗称"卡疤":不需处理

C.个别出现淋巴肿大(<10mm)者,可自行消退

D.BCG 的局部反应需要进行热敷 V

37 .下列有关接种卡介苗后的护理,说法不正确的是： [单选题] \*

A.接种当天,注射部位需用清水冲洗,保持清洁 V

B.出现白色小脓疱期间，洗澡时用干净手帕/消毒纱布包扎局部以免水溅入

C.不要经常用手去触摸

D.给新生儿勤剪指甲，勤换内衣，以保持局部清洁，避免其他细菌感染

38 .下列哪一项不属于接种卡介苗之后的异常反应： [单选题] \*

A.接种部位出现组中浸润、化脓，形成小溃疡 ✓

B.接种局部溃疡直径>10mm 或≥12周不愈者

C.腋下淋巴结肿大≥10mm,出现化脓、破溃

D.BCG 骨髓炎和 BCG 全身播散症

39.BCG 最常见的偶合症状为： [单选题] \*

A.局部溃疡

B.淋巴结肿大

C.骨髓炎

D.湿疹 ✓

40.目前，上海市卡介苗不良反应治疗定点医疗卫生部门是： [单选题] \*

A.市疾控中心

B.市公共卫生中心、复旦 J1 科医院 ✓

C.上海市儿童医学中心

D.上海市儿童医院

41.在卡介苗差错事故中常见的种类是： [单选题] \*

A.误种皮下

B.误种肌肉

C.超剂量接种

D.以上均是 ✓

42.接种卡介苗时，卡介苗液溅入眼睛，正确的处理方法是： [单选题] \*

A.仅用流动的清水冲洗

B.仅用大量生理盐水冲洗

C.即刻用大量生理盐水冲洗，后利福平眼药水滴眼 ✓

D.无需特殊处理

43. 新生儿如果因为禁忌症未在产院接种卡介苗，出院后，如禁忌疾病已治愈，应该到哪里补种卡介苗？ [单选题] \*

A.回到出生的产院接种

B.所有的二三级医院均可

C.卡介苗门诊 ✓

D.社区卫生服务中心

44.在儿童出生后，从产院回到居住地，其监护人常规应当带儿童到哪里为其办理预防接种登记和接种事宜？ [单选题] \*

A.区儿童医院

B.区疾控中心

C.区妇幼保健院

D.居住地所在的社区卫生服务中心 ✓

45.接种卡介苗后，需要在预防接种证上记录的内容有： [单选题] \*

A.日期

B.批号

C.接种者信息

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/785011124322011104>