

2024年山东德州市德城区卫生健康事业单位招聘笔试参考题库 含答案详解

一、A1型题（每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、下列哪项是引起脑萎缩最常见的原因？（ ）

- A. 脑水肿
- B. 脑外伤
- C. 脑动脉粥样硬化
- D. 脑脓肿
- E. 脑结核

【正确答案】

C

【答案解析】

脑动脉粥样硬化可引起脑萎缩、脑软化和脑出血。脑萎缩表现为大脑皮质变薄、脑回变窄、脑沟变宽且加深、脑的重量减轻。脑软化主要发生于颞叶、内囊、豆状核和丘脑。脑动脉粥样硬化可引起小动脉瘤形成，当血压突然升高时小动脉瘤可破裂引起脑出血。故本题答案为C项。

2、男性，52岁，9月18日来诊，发热两周伴腹泻。查体：皮肤可见荨麻疹，脾可及，肝未及，血WBC $12 \times 10^9/L$ ，嗜酸性粒细胞40%，ALT 86U/L。采集病史时应特别注意询问（ ）。

- A. 肝病史
- B. 结核病史
- C. 疫水接触史
- D. 近期用药史
- E. 腹泻次数、性质

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

3、为防止新生儿溶血症的发生（ ）。

- A. 给孩子输入母亲的红细胞
- B. 孩子出生后用抗Rh血清给孩子做被动免疫
- C. 孩子出生后用抗Rh血清给母亲做被动免疫
- D. 用抗原中和母亲的抗Rh抗体
- E. 孩子出生后马上用免疫抑制剂防治

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

4、男，5岁。患结核性脑膜炎，控制炎症首选的治疗是（ ）。

- A. 链霉素+异烟肼+利福平+吡嗪酰胺
- B. 链霉素+异烟肼
- C. 链霉素+对氨基水杨酸钠
- D. 链霉素+异烟肼+对氨基水杨酸钠
- E. 异烟肼+对氨基水杨酸钠

『正确答案』

A

『答案解析』

控制炎症强化治疗阶段联合使用异烟肼（INH）、利福平（RFP）、吡嗪酰胺（PZA）及链霉素（SM）。此阶段为3~4个月，其中INH每日15~25mg/kg。开始治疗1~2周内INH全日量的一半加入10%葡萄糖中静滴，余量口服。答案A正确。

5、对于断肢再植原则，下述哪一项是错误的？（ ）

- A. 可将骨骼短缩
- B. 首先进行彻底的清创
- C. 肌腱常做二期缝接
- D. 主要的动、静脉均应做吻合
- E. 神经应一期修复

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

6、下列哪项为只受对侧大脑运动皮层支配的脑神经运动核？（ ）

- A. 三叉神经运动核
- B. 迷走神经背运动核
- C. 疑核
- D. 舌下神经核
- E. 动眼神经核

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

7、下列化学键维系蛋白质分子二级结构的是（ ）。

- A. 离子键
- B. 二硫键
- C. 疏水键
- D. 氢键
- E. 肽键

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

8、骨盆骨折最危险的并发症是（ ）。

- A. 盆腔内出血
- B. 膀胱破裂
- C. 尿道断裂
- D. 骶丛神经损伤
- E. 直肠损伤

『正确答案』

A

『答案解析』

题中所列各项都是骨盆骨折可能发生的并发症。其中最危险的是出血。骨盆骨主要是松质骨，邻近又有许多动、静脉丛，血液供应丰富，骨折可引起广泛出血，并沿腹膜后疏松结缔组织广泛蔓延，大量出血可致失血性休克，如主要大动、静脉破裂可迅速死亡。

9、男孩，7岁半。患有法洛四联症。每当哭闹后出现呼吸困难，即出现抽搐。这种现象是由于肺动脉漏斗部狭窄的基础上，突然发生该处肌肉

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/785031102342011114>