

耳鼻喉科知识练习题库（附答案）

一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1、取鼻腔异物时要注意防止的并发症是

- A、鼻腔感染
- B、异物后落引起气道异物
- C、鼻中隔损伤
- D、鼻出血
- E、疼痛性休克

正确答案：B

2、声波自鼓膜传送至镫骨足板时约可增益

- A、45dB
- B、27dB
- C、15dB
- D、36dB
- E、60dB

正确答案：B

3、婴幼儿容易发生急性化脓性中耳炎的主要原因是

- A、咽鼓管短、宽、平直
- B、婴幼儿上呼吸道感染较常见
- C、婴幼儿抵抗力低
- D、咽鼓管发育不成熟
- E、咽鼓管峡部较窄

正确答案：A

4、食管镜检查术前做法正确的是

- A、以上都对
- B、6 小时内禁食水
- C、以上都错
- D、术前半小时注射阿托品
- E、术前 1 小时注射镇静剂

正确答案：A

5、声音传入内耳的途径是

- A、外耳—鼓膜—听骨链—前庭窗
- B、外耳—鼓膜—听骨链—咽鼓管
- C、外耳—鼓膜—听骨链—椭圆囊

D、外耳—鼓膜—听骨链—半规管

E、外耳—鼓膜—听骨链—圆窗

正确答案：A

6、关于鼻窦炎的治疗，下述不正确的是

A、鼻窦炎手术后仍需要相当长时间的综合治疗

B、成功的鼻内镜手术基本上可治愈鼻窦炎

C、鼻窦炎多采用综合治疗

D、鼻窦炎的治疗效果，因人、病因而异

E、儿童鼻窦炎保守治疗多有效，不宜过早手术干预

正确答案：B

7、患者男，45岁，咽部不适，异物梗阻感10余年，干咳，晨起刷牙恶心。检查：咽部黏膜慢性充血，咽后壁淋巴滤泡增生，下咽喉部未见新生物，颈部无包块及压痛，在诊断为“慢性咽炎”时，不需相鉴别的疾病是

A、慢性中耳炎

B、茎突过长综合征

C、咽异感症

D、慢性胃炎

E、早期食管癌

正确答案：A

8、病史不明确时，诊断气管、支气管异物最可靠的方法是

A、呼吸困难

B、咳嗽、发热

C、胸部听诊

D、胸部正、侧位片

E、支气管镜检查

正确答案：E

9、鼻腔内侧壁支架组成不包括

A、腭骨垂直部

B、腭骨鼻嵴

C、梨骨

D、筛骨正中板

E、中隔软骨

正确答案：A

10、下面不会引起喉阻塞的疾病是

- A、喉部、气管异物
- B、双侧喉返神经完全性麻痹
- C、喉部肿瘤
- D、喉血管神经性水肿
- E、小儿急性喉炎

正确答案：B

11、筛窦外伤后视力下降，经糖皮质激素治疗多少小时以上视力无改善者可考虑做视神经管减压

- A、32h
- B、12h
- C、18h
- D、24h
- E、6h

正确答案：B

12、鼓室隔分隔的结构是

- A、中后鼓室
- B、以上都不是
- C、中下鼓室
- D、前后鼓室
- E、中上鼓室

正确答案：E

13、下列治疗喉狭窄的基础措施是

- A、气管切开术
- B、喉成形术
- C、CO₂ 激光瘢痕切除术
- D、T 型硅胶管喉扩张术
- E、甲状气管吻合术

正确答案：A

14、单侧性突眼最常见的病因是

- A、鼻窦疾病
- B、甲状腺疾病
- C、肾上腺疾病
- D、眼角膜性疾病

E、颅内疾病

正确答案：A

15、下列哪种结构华特位不能显示

A、蝶窦

B、眼眶

C、筛窦

D、上颌窦

E、鼻腔

正确答案：A

16、患者女，32岁，咽部剧痛2小时，吞咽加重，伴憋气，检查见软腭腭垂、杓会厌壁高度水肿呈半透明状，无明显三凹征，临床诊断为“急性水肿性咽炎”。处理时应立即进行的是

A、激素+抗过敏药雾化吸入

B、复方硼砂液漱口

C、大剂量糖皮质激素静滴

D、大剂量抗生素静滴

E、气管切开术

正确答案：C

17、明确有支气管异物，即应

A、吸氧

B、支气管镜下取出异物

C、开胸手术

D、抗生素等治疗

E、喉插管

正确答案：B

18、迷路主要的血管供应是

A、耳后动脉的分支

B、脑膜前动脉的分支

C、内听动脉

D、咽升动脉

E、脑膜中动脉的分支

正确答案：C

19、睡眠呼吸暂停综合征最常见的类型是

A、混合行

- B、阻塞型
- C、中枢型
- D、低通气型
- E、普通型

正确答案：B

20、在喉镜检查中，如用探针触及喉黏膜，患者无明显反应，可考虑为

- A、喉感觉消失
- B、喉感觉减退
- C、喉感觉异常
- D、喉瘫痪
- E、喉感觉过敏

正确答案：A

21、鼻腔上部出血多发生于

- A、青少年
- B、老年人
- C、中壮年
- D、儿童
- E、幼儿

正确答案：C

22、男，34岁。误食鱼刺后感咽痛，间接喉镜检查未见鱼刺，为排除食管异物，应首先进行的检查是

- A、食管镜检查
- B、X线胸片
- C、食管钡剂摄片
- D、胸部CT
- E、动态喉镜检查

正确答案：C

23、击出性骨折眶内组织“疝”入

- A、筛窦
- B、额窦
- C、上颌窦
- D、蝶窦
- E、海绵窦血栓性静脉炎

正确答案：C

24、下咽部 3 个分区中癌瘤各有其特点，下列选项中正确的是

- A、下咽后壁癌多见于女性
- B、梨状窝癌多见
- C、下咽后壁癌一般较局限，手术易彻底切除
- D、环后癌不易发生颈淋巴结转移
- E、梨状窝与环后癌多见于女性

正确答案：B

25、有关室带的说法，错误的是

- A、外面为黏膜
- B、韧带由甲状上韧带和弹性圆锥组成
- C、后端附着杓状软骨声带突上方
- D、中间有少量肌纤维
- E、前端附着会厌的上方

正确答案：E

26、慢性中耳炎有胆脂瘤的鼓膜穿孔常位于

- A、紧张部后上边缘或松弛部
- B、紧张部前上方
- C、紧张部中央区
- D、紧张部后下方
- E、光锥区

正确答案：A

27、与扁桃体癌的发生关系不大的是

- A、人乳头状瘤病毒
- B、长期的炎症刺激
- C、扁桃体息肉恶变
- D、饮酒
- E、吸烟

正确答案：C

28、成人气管的左右径为

- A、2.0~3.0cm
- B、1.0~1.5cm
- C、2.0~2.5cm
- D、2.5~3.0cm
- E、0.5~1.5cm

正确答案：C

29、下列症状中，不属于听神经瘤临床表现的是

- A、声嘶
- B、逐渐听力下降
- C、面部麻木感
- D、突聋
- E、眩晕和失平衡感

正确答案：A

30、鼻中隔矫正手术的适应症包括

- A、鼻中隔偏曲特别是高位偏曲影响鼻窦通气引流者
- B、蝶窦炎引起头痛者
- C、凝血功能障碍导致反复鼻出血者
- D、变应性鼻炎导致严重鼻塞者
- E、鼻中隔偏曲无临床症状者

正确答案：A

31、开放性软组织损伤清创后可作一期缝合，下列叙述哪项不正确？

- A、创面内暴露三大血管、神经和关节已 24 小时
- B、头皮创口已 36 小时
- C、伤后 6~8 小时创口污染严重
- D、颜面部创口已 24 小时
- E、伤后 12 小时创口污染很轻

正确答案：B

32、IV度喉阻塞的治疗原则是

- A、明确病因，积极进行病因治疗
- B、立即行气管切开术
- C、吸氧
- D、大剂量皮质类固醇激素
- E、大剂量抗生素

正确答案：B

33、咽后隙与咽旁隙之间相隔的结构是

- A、筋膜
- B、茎突咽肌
- C、翼内肌
- D、咽上缩肌

E、疏松结缔组织

正确答案：A

34、关于经鼻无创正压通气治疗 OSAHS 原理和作用机制，错误的是

A、可纠正部分由睡眠呼吸暂停综合征(SAS)而引起的心律失常及高血压

B、通过增加咽腔内的正压来对抗吸气负压，防止气道塌陷

C、增加肺容量

D、可以使 OSAHS 患者的红细胞生成增加，血容量减少，从而增加血红蛋白的含量，血液的黏度升高

E、可以减少 OSAHS 引起的尿量增多，使夜间的小便次数减少

正确答案：D

35、以下不是评估 OSAHS 上气道阻塞部位的方法的是

A、上气道持续压力测定

B、头颅 CT / MRI 检查

C、头颅 X 线测量

D、纤维鼻咽喉镜辅以 Müller 检查法

E、嗜睡评分量表

正确答案：E

36、咽隐窝有结节状隆起，表面粗糙不平，易出血的可能是

A、慢性扁桃体炎

B、急性腺样体炎

C、急性化脓性扁桃体炎

D、腺样体肥大

E、鼻咽癌

正确答案：E

37、左耳感音神经性聋，音叉检查结果为

A、RT 右耳阴性，左耳阳性，WT 偏左

B、RT 右耳阳性，左耳阳性，WT 偏右

C、以上都不对

D、林纳试验(RT)右耳阴性，左耳阳性，韦伯试验(WT)偏右

E、RT 右耳阳性，左耳阴性，WT 偏左

正确答案：B

38、鼻窦炎中发病率最高的是

A、全组鼻窦炎

B、筛窦炎

- C、蝶窦炎
- D、上颌窦炎
- E、额窦炎

正确答案：D

39、下列选项中，错误的是

- A、成人咽全长 12cm
- B、咽部上起颅底，下至第 6 颈椎下缘
- C、咽与食管连接处最窄
- D、咽前壁与椎前筋膜相邻
- E、咽是呼吸道和消化道上端的共同通道

正确答案：D

40、患者，男，40 岁，因急性周围性面瘫就诊，以下鉴别诊断中应该首先除外的疾病是

- A、颞骨骨折
- B、面神经鞘瘤
- C、贝尔面瘫
- D、耳带状疱疹
- E、急性化脓性中耳炎

正确答案：B

41、急性化脓性中耳变化脓期临床表现不包括

- A、鼓膜周边血管充血
- B、传导性聋
- C、有搏动样闪光
- D、鼓膜内陷
- E、鼓膜紧张部穿孔

正确答案：D

42、下列关于咽部表麻药的描述，错误的是

- A、普鲁卡因不作表麻用
- B、提高表麻药的浓度能增强麻醉效果
- C、1%丁卡因是常用的表麻药
- D、表麻的作用是止痛和制止反射的发生
- E、利多卡因亦可作表麻用

正确答案：B

43、适用于 0~6 个月婴幼儿的行为测听方法为

- A、视觉强化测听
- B、条件定向反应测听
- C、游戏测听
- D、可触奖品条件强化操作测听
- E、行为观察测听

正确答案：E

44、鼻中隔偏曲的正确概念是

- A、以上都不是
- B、鼻中隔不完全垂直即可称为鼻中隔偏曲
- C、生理性偏曲即为临床意义上的鼻中隔偏曲
- D、鼻中隔有偏曲，并有相应症状
- E、鼻中隔尖锥样突起，称之为鼻中隔嵴突

正确答案：E

45、与喉乳头状瘤发病无关的是

- A、母亲生殖器尖锐湿疣
- B、细菌感染
- C、病毒感染
- D、内分泌因素
- E、慢性炎症刺激

正确答案：B

46、急性鼻炎的恢复期可引起

- A、脓性鼻漏
- B、血性鼻漏
- C、干酪样鼻漏
- D、黏脓性鼻漏
- E、水样鼻漏

正确答案：D

47、人平静呼吸时，声带处于的位置是

- A、中间位
- B、轻外展位
- C、旁正中位
- D、中线位
- E、深外展位

正确答案：B

48、在诊断变应性鼻炎时最有价值的是

- A、病史及临床检查
- B、血清 RAST
- C、食谱排除试验
- D、皮肤试验
- E、食物激发试验

正确答案：A

49、急性腺样体炎常见于

- A、青少年
- B、3~10 岁的儿童
- C、新生儿
- D、成年男性
- E、成年女性

正确答案：B

50、鼻源性眼部并发症的解剖因素不包括

- A、蝶窦侧壁极菲薄或先天缺损
- B、鼻窦围绕着眼眶的上、下、后和内侧
- C、眶下孔及同名血管和神经贯通筛窦和眶内
- D、筛前、后孔及同名血管和神经贯通筛窦和眶内
- E、纸样板极菲薄或先天缺损

正确答案：C

51、引起自发性水平性眼震的主要病变位于

- A、眼
- B、小脑
- C、前庭核
- D、脑桥与小脑
- E、迷路

正确答案：E

52、急性耳鸣是指多长时间内发生的耳鸣

- A、3 天内
- B、1 天内
- C、3 个月内
- D、1 周内
- E、3 周内

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/785302203134011102>