

医学高级职称正高《口腔医学》（题库）模拟试卷一

[多选题]1. 慢性增生性牙髓炎的临床表现包括

- A. (江南博哥) 多见于青少年患者
- B. 患牙进食时易出血
- C. 龋洞内有牙髓息肉
- D. 常有自发痛
- E. 长期不用患牙咀嚼

参考答案: ABCE

[多选题]2. 黏固烤瓷冠修复体前, 修复体组织面需做的处理是

- A. 清洁
- B. 干燥
- C. 酸蚀
- D. 消毒
- E. 涂分离剂

参考答案: ABD

[多选题]3. 𠵼支托的作用包括

- A. 防止食物嵌塞
- B. 恢复咬合关系
- C. 稳定和支持作用
- D. 使𠵼力沿基牙长轴方向传导
- E. 固位作用

参考答案: ABCD

[多选题]4. 全冠粘固后出现松动, 脱落, 其主要原因可能有

- A. 修复冠边缘不密合
- B. 修复冠边缘过长
- C. 预备牙体轴壁聚合角过大
- D. 牙周病
- E. 轴壁突度恢复不良

参考答案: AC

[多选题]5. 瓷全冠的耐磨性优于

- A. 纯金铸造冠
- B. 钴铬合金铸造冠
- C. 贱金属烤瓷冠
- D. 硬质树脂冠
- E. 贵金属烤瓷冠

参考答案: AD

[多选题]6. 下列属于择期手术的是

- A. 唇裂修复术

- B.颞下颌关节成形术
- C.唇癌根治术
- D.下牙槽骨骨折复位固定术
- E.口底蜂窝织炎切开引流术

参考答案：AB

[多选题]7. 安放牙钳时，正确的方法是

- A.钳喙应与牙长轴平行
- B.钳喙应置于牙冠釉质上并与之贴紧
- C.安放时钳喙应沿颊腭侧插入
- D.安放好牙钳后应再次核对牙位
- E.正确选用拔牙钳

参考答案：ACDE

[多选题]8. 在制作可摘局部义齿过程中，蜡型装盒所用的方法有

- A.倒置法
- B.整装法
- C.分装法
- D.混装法
- E.直立法

参考答案：BCD

[多选题]9. 口腔颌面部感染并发海绵窦化脓性血栓性静脉炎时可累及的颅神经是

- A.外展神经
- B.动眼神经
- C.滑车神经
- D.面神经
- E.三叉神经

参考答案：ABC

[多选题]10. 口腔颌面部损伤患者怀疑有颅脑损伤时，应注意观察

- A.神志
- B.脉搏
- C.呼吸
- D.血压
- E.瞳孔

参考答案：ABCDE

[多选题]11. 可摘局部义齿中的三臂卡环，其组成部分是

- A.胎支托
- B.卡环体
- C.卡环臂

- D.连接体
- E.对抗臂

参考答案：ABCD

[多选题]12. 下列哪些血液疾病在未控制前暂时不宜拔牙

- A.血友病
- B.血小板减少性紫癜
- C.白血病
- D.再生障碍性贫血
- E.轻度贫血

参考答案：ABCD

[多选题]13. 对于骨折线上的牙，应拔除的是

- A.已明显松动的牙
- B.已冠折的牙
- C.有深龋的牙
- D.大部分牙根裸露的牙
- E.有炎症的牙

参考答案：ACDE

[多选题]14. 以下牙位的部位记录法中正确的是

- A.Ⅵ表示左下颌第一乳牙
- B.5表示右上颌第二前磨牙
- C.C区的6表示左下颌第一磨牙
- D.B区的1表示左上颌中切牙
- E.第三磨牙记录为3

参考答案：BD

[多选题]15. 牙周塞治剂的主要作用是

- A.保护作用
- B.止痛作用
- C.止血作用
- D.固定作用
- E.充填作用

参考答案：ABCD

[多选题]16. 拔牙术中，引起牙根折断的原因是

- A.用力方向不当
- B.牙钳选择不当
- C.牙钳未与牙长轴平行
- D.用力过猛
- E.钳喙紧贴于牙面

参考答案：ABCD

[多选题]17. 正确色彩的再现，有赖于准确的记录与比色结果的有效传递，临床与技术室相互沟通应该做到

- A.使用相同的比色板
- B.比色板与所用瓷粉品牌相同
- C.用统一的描绘语言
- D.有研究模上的标记
- E.修复卡上有色彩的比色选项

参考答案：ABCDE

[多选题]18. 酚醛树脂

- A.可用作液体根管充填材料
- B.其聚合前能很好地充填根管
- C.聚合后能将根管内残留的病原刺激物包埋固定，使其成为无害物质
- D.聚合后对根尖周组织刺激性小
- E.有较强的抑菌作用

参考答案：ABCDE

[多选题]19. 下列哪项是舍格仑综合征的病理表现

- A.导管扩张
- B.小叶间隔破坏，消失
- C.腺泡萎缩，变性，消失
- D.导管细胞增生，形成上皮细胞岛
- E.大量淋巴细胞浸润

参考答案：ACDE

[多选题]20. 釉板是

- A.裂隙状的结构
- B.从釉质表面伸向釉质内或牙本质内
- C.制片过程中形成的
- D.有利于龋齿病原菌扩展的通道
- E.釉板经脱钙后即无有机物残留

参考答案：ABD

[多选题]21. 关于氢氧化钙说法正确的是

- A.呈弱酸性
- B.呈弱碱性
- C.pH值为5~7
- D.能促进牙本质桥的形成
- E.有一定的抗菌作用

参考答案：BDE

[多选题]22. 腺样囊性癌的病理变化为

- A.肿瘤细胞包括导管内衬上皮细胞和肌上皮细胞

- B. 常见神经受侵
- C. 肿瘤细胞排列成筛孔状
- D. 肿瘤细胞体积小，核分裂象少见
- E. 一般不侵犯神经

参考答案：ABCD

[多选题]23. 关于神经支配说法错误的是

- A. 分布于321|123腭侧牙龈及黏骨膜的神经是腭前神经
- B. 支配321|123的牙周膜，牙槽骨及唇侧牙龈的神经是上牙槽前神经
- C. 支配876|678牙周膜，牙槽骨以及颊侧牙龈的神经是上牙槽后神经
- D. 分布于87654|45678腭侧牙龈及黏骨膜的神经是腭前神经
- E. 有时候3|3腭侧牙龈为鼻腭神经和腭前神经共同分布

参考答案：AC

[多选题]24. 慢性盘状红斑狼疮的病理改变有

- A. 上皮过角化或不全角化
- B. 上皮棘层变薄
- C. 上皮棘层变厚
- D. 血管扩张，周围有类纤维蛋白沉积
- E. 基底膜尚清晰

参考答案：ABD

[多选题]25. 早期诊断青少年牙周炎的依据为

- A. 年轻患者
- B. 牙石等刺激物不多
- C. 多数牙松动，移位或有邻面深牙周袋
- D. 局部炎症不明显
- E. 𪚩翼片上第一磨牙和切牙有改变

参考答案：ABCDE

[多选题]26. 用于矫治不良唇习惯的矫治器有

- A. 前庭盾
- B. 带舌刺的活动矫治器
- C. 焊唇挡丝的活动矫治器
- D. 唇挡
- E. FR-III

参考答案：ACD

[多选题]27. 下列窝洞预备的原则中，哪项是正确的

- A. 不可完全去净腐质
- B. 保护牙髓
- C. 制备抗力形
- D. 制备固位形

E. 窝洞点线角为钝角

参考答案：BCD

[多选题]28. 患有下述何种心脏病时应禁忌拔牙

- A. 前壁心肌梗死 3 个月
- B. 充血性心力衰竭
- C. 频发的室性早搏，未治疗
- D. 完全性右束支传导阻滞
- E. 不稳定的心绞痛

参考答案：ABCE

[多选题]29. 儿童长期吮拇指可造成

- A. 前牙开𪙇
- B. 牙弓狭窄
- C. 腭盖宽大
- D. 前牙深覆盖
- E. 上牙前突拥挤

参考答案：ABDE

[多选题]30. 全口义齿初戴前要检查什么

- A. 系带是否让开
- B. 义齿组织面是否有小瘤子
- C. 在口外时义齿咬合关系是否良好
- D. 基托边缘是否符合要求
- E. 技工加工单的姓名是否与患者相符

参考答案：ABCDE

[多选题]31. 错𪙇畸形的局部危害性包括

- A. 影响颌面部的发育
- B. 影响口腔的健康
- C. 影响口腔功能
- D. 影响美观影响胃肠功能
- E. 影响面容美观

参考答案：ABCE

[多选题]32. 牙片可检查

- A. 龋损情况
- B. 牙齿色泽
- C. 髓角位置
- D. 牙槽骨情况
- E. 根管长短

参考答案：ACDE

[多选题]33. 釉丛是

- A. 自釉质牙本质界向牙表面方向散开
- B. 其高度约为釉质厚度的  $1/5 \sim 1/4$
- C. 其本质亦是釉柱
- D. 含钙量高
- E. 蛋白含量较低

参考答案: AB

[多选题]34. 结合上皮描述正确的有

- A. 有角化层, 无上皮钉突
- B. 无角化层, 也无上皮钉突
- C. 比牙龈表面上皮快 1 倍
- D. 比牙龈表面上皮快 2~3 倍
- E. 结合上皮与牙面的连接方式是贴合

参考答案: BC

[多选题]35. 牙源性角化囊肿易复发的组织学、生物学基础是

- A. 囊壁薄易碎, 手术难以完整摘除
- B. 主囊的囊壁内可含卫星囊或微小的子囊
- C. 囊肿的生长方式特殊, 常沿抗性小的途径生长
- D. 穿破骨组织与软组织粘连, 手术不易彻底
- E. 衬里上皮有异形性

参考答案: ABCD

[多选题]36. 头面部外伤后, 以下各项处理措施中, 哪些是正确的

- A. 姿势引流
- B. 用消毒棉球填塞外耳道
- C. 耳鼻应经常消毒, 保持干净
- D. 鼓励咳嗽和打喷嚏
- E. 用抗生素预防感染

参考答案: ACE

[多选题]37. 扁平苔藓的病理改变有

- A. 基底细胞变性
- B. 上皮浅层细胞水肿
- C. 基底膜界限不清, 有纤维素样物质沉积
- D. 固有层有均匀致密的淋巴细胞浸润带
- E. 大量中性粒细胞浸润

参考答案: AC

[多选题]38. 口腔颌面部特异性感染病原菌有

- A. 铜绿假单胞菌
- B. 结核杆菌
- C. 梅毒螺旋体

- D.放线菌
- E.厌氧菌

参考答案：BCD

[多选题]39. 正畸治疗后保持的原因为

- A.肌动力平衡的最终改建尚未完成
- B.牙周膜纤维张力未恢复平衡
- C.口腔不良习惯未破除
- D.殆的平衡尚未建立
- E.生长型可能影响矫治效果

参考答案：ABCDE

[多选题]40. 口腔念珠菌病的临床表现分为

- A.红斑型
- B.假膜型
- C.增生型
- D.口角炎
- E.颗粒型

参考答案：ABCD

共享题干题

某女性患者，50岁， $\overline{8765|5678}$ 缺失，余牙正常，义齿修复设计金属支架， $\overline{4|4}$ 上设置RPI卡环组。

[单选题]1.  $\overline{4|4}$ 基牙预备时应制备出

- A.近中支托窝，舌侧导平面
- B.远中支托窝，舌侧导平面
- C.近中支托窝，远中导平面
- D.远中支托窝，远中导平面
- E.近远中支托窝

参考答案：C

[单选题]2.RPI卡环组的优点，错误的是

- A.减小对基牙扭力
- B.减轻牙槽嵴的负担
- C.病人感觉舒适
- D.基牙龋坏机会少
- E.在水平方向的稳定作用强

参考答案：B

[单选题]3. 如大连接体采用舌杆，下列叙述正确的是

- A.舌杆应做成中间厚，两边薄

- B.为减少异物感，舌杆的宽度为 2.5~3mm
- C.舌杆应做成上缘的边缘薄，下缘呈圆形状
- D.若患者舌侧口底浅，舌系带附丽高，舌杆的位置可位于余留牙舌侧龈缘区
- E.舌杆表面采用皱纹型

参考答案：C

[单选题]4.义齿蜡型完成后，采用的装盒方法是

- A.整装法
- B.分装法
- C.混装法
- D.分装法或混装法
- E.分装法或整装法

参考答案：C

如果未按常规程序进行塑料热处理操作，结果义齿基托会出现花基板，且发生变形，密合度差

[单选题]5.下列哪项因素不是产生花基板的原因

- A.升温过快，或过高
- B.粉液比过多或过少
- C.填充塑料过迟或过早
- D.压力不足
- E.热处理时间过长

参考答案：E

[单选题]6.常规热处理方法是

- A.100° 恒温 2h
- B.100° 恒温 20min
- C.70° 恒温 24h
- D.70° 恒温 1.5h，100° 恒温 1h
- E.60° 恒温 12h

参考答案：D

[单选题]7.分析基托发生变形的原因可能是

- A.压力太小
- B.填胶过早
- C.升温过慢
- D.冷却过快，开盒过早
- E.升温过低

参考答案：D

[单选题]8.热凝塑料经水浴处理，其后果是

发生聚合

- B.MNA发生聚合
- C.平均分子量比牙托粉高
- D.其不含残留单体
- E.MNA单体完全挥发

参考答案：B

男，70岁，戴全口义齿一周，诉：口腔处于休息状态时固位尚可，说话时义齿易脱落，咀嚼时前牙区咬不紧东西，偶尔咬颊，临床检查可见，颊黏膜后部有一血疱。

[单选题]9. 前牙咬不紧东西的原因是

- A.正中时前牙区无接触
- B.前伸时前牙无接触
- C.侧方时前牙无接触
- D.前伸时后牙无接触
- E.以上全不对

参考答案：B

[单选题]10. 对于前牙咬不紧东西，此时应调磨

- A.上后牙舌尖与下后牙的颊尖
- B.上后牙的颊尖与下后牙的舌尖
- C.上下后牙的所有牙尖
- D.上后牙牙尖远中斜面和下后牙牙尖的近中斜面
- E.上后牙牙尖近中斜面和下后牙牙尖远中斜面

参考答案：D

[单选题]11. 该患者咬颊的原因是

- A.后牙排列覆盖过大
- B.舌体增大
- C.上、下后牙区远中基托过厚
- D.上、下后牙区远中基托过薄
- E.以上全不是

参考答案：C

[单选题]12. 消除咬颊的方法是

- A.减小上下后牙的覆盖
- B.让患者适应
- C.增加上下后牙区远中基托厚度
- D.磨薄上下后牙区远中过厚的基托
- E.以上全不对

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/785334301330011232>