

公共卫生与预防医学考试题库

第一部分 单选题(300题)

1、婴儿室【单选题】——

- A. $\leq 10 \leq 5 \leq 5$
- B. $\leq 200 \leq 5 \leq 5$
- C. $\leq 500 \leq 10 \leq 10$
- D. $=- \leq 15 \leq 15$

【答案】：B

2、属半污染区的区域是【单选题】——

- A. 治疗室. 值班室
- B. 走廊及病区化验室
- C. 配餐室与更衣室
- D. 浴室. 洗涤间 病室及厕所

【答案】：B

3、对医院发生的医院感染流行、暴发流行进行调查分析,提出控制措施,并组织实施【单选题】——

- A. 卫生部医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：D

4、穿过皮肤或黏膜进入无菌的组织或器官内部的器材【单选题】——

- A. 灭菌剂或物理. 化学灭菌方法
- B. 应用灭菌剂或高效消毒剂
- C. 杀灭结核杆菌的消毒剂或中. 低效消毒剂
- D. 应用物理灭菌方法 杀灭细菌繁殖体的消毒剂

【答案】：A

5、下列哪项不是医院感染病原学的特点【单选题】——

- A. 细菌是最常见的病原体,细菌的种类和分布因感染类型、医院类别、患者具体情况和采取措施不同
- B. 目前以革兰阴性杆菌为主,如肠杆菌和非发酵菌,这些细菌常有耐药性
- C. 近年来随着抗生素的大量使用,革兰阳性球菌感染,特别是耐甲氧西林金黄色葡萄球菌感染、凝固酶阴性葡萄球菌感染正在增加
- D. 厌氧菌和深部真菌是机体正常菌群常引起内源性感染 真菌感染正在减少

【答案】：E

6、二级医院【单选题】——

- A. 医院感染发生率 $\leq 8\%$
- B. 切口感染率 $\leq 0.5\%$
- C. 两者均是
- D. 两者均不是

【答案】：C

7、下列关于交叉感染描述正确的是【单选题】——

- A. 在诊疗过程中,由于器械消毒不严或制剂不纯引起的感染
- B. 病人在家中已发生的感染
- C. 病人入院时已处于另一种传染病的潜伏期,入院后发病,并传给其他病人
- D. 病原体来源于病人本身的感染 病人与医生及其他病人通过直接或间接传播引起的感染

【答案】：E

8、根据我国卫生标准回答以下问题:进行医院内感染管理的策略研究,为国家提供咨询意见的应是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C.

各级医院的医院感染管理委员会

D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：A

9、下列关于自身感染的描述正确的是【单选题】——

A. 病人与医生及其他病人通过直接或间接传播引起的感染

B. 病人在家中已发生的感染

C. 病人入院时已处于另一种传染病的潜伏期,入院后发病,并传给其他病人

D. 在诊疗过程中,由于器械消毒不严或制剂不纯引起的感染 病原体来源于病人本身的感染

【答案】：E

10、一般病室、办公室、治疗室、换药室、走廊等使用的拖把【单选题】——

A. 拖把应有明显的标记,严格分区使用

B. 拖把用 500mg/L 有效氯消毒液浸泡 30min 后,再洗干净,晾干备用

C. 应先消毒,用 500mg/L 有效氯消毒液浸泡 30min,再用水洗干净,然后用 500mg/L 有效氯消毒液浸泡 30min,悬挂晾干备用

D. 先用 1000mg/L 有效氯消毒剂适量倒在污染地面 30min 后,用拖把拖干净 每次使用后清水冲洗,悬挂晾干备用

【答案】：E

11、传染病区所采取的隔离措施,下列不正确【单选题】——

A. 同住一室的不同的呼吸道传染病患者只要做好床边隔离

B. 给同一种病种患者测血压时可不换血压计

C. 斑疹伤寒患者须更衣后才可入病房

D. 护理消化道隔离病人时,须按病种分别穿隔离衣 严密隔离患者禁止走出病房

【答案】：A

12、黏膜消毒可使用下列哪一种药液【单选题】——

A. 苯扎溴铵(新洁尔灭)

B.

聚维酮碘(碘伏)

- C. 乙醇
- D. 碘酊 氯己定

【答案】： B

13、医务人员发生艾滋病职业暴露后预防性用药最好在几小时内实施

【单选题】——

- A. 24h
- B. 12h
- C. 8h
- D. 4h 2h

【答案】： D

14、下列哪项违反了隔离原则【单选题】——

- A. 给同一种病种患者测血压时可不换血压计
- B. 护理消化道隔离病人时,须按病种分别穿隔离衣
- C. 严密隔离患者禁止走出病室
- D. 斑疹伤寒患者须更衣后才可入病房 只要做好床边隔离,不同的呼吸道传染病患者可同住一室

【答案】： E

15、关于输血科预防医院内感染的措施,下列哪项是错误的【单选题】

——

- A. 保持环境清洁,每天清洁桌面
- B. 被血液污染的台面可用苯扎溴铵消毒处理
- C. 工作人员上岗前应注射乙型肝炎疫苗,并定期检查抗体水平
- D. 血浆置换术应在II类环境中进行并注意消毒隔离 每月对储血冰箱的内壁进行生物学监测,不得检出致病性微生物和真菌

【答案】： B

16、传染病区中划分为清洁区的是【单选题】——

- A. 走廊

B. 洗漱室

C.

配餐室

D. 化验室 浴室

【答案】：C

17、当被沾有 HBsAg 阳性血的针头刺伤时,立即应做的主要处理是【单选题】——

A. 伤口立即涂以碘酊

B. 给受伤者立即注射丙种球蛋白

C. 受伤者立即抽血作乙型肝炎病毒全套抗原抗体检测

D. 乙型肝炎病毒高价免疫血清注射 乙型肝炎病毒疫苗注射

【答案】：D

18、拟定各级医院感染管理政策【单选题】——

A. 卫生部医政司医院感染管理委员会

B. 省市卫生行政部门医院感染管理委员会

C. 医院的医院感染管理委员会

D. 医院感染管理科 临床科室以下各项工作是哪个部门的职责

【答案】：A

19、对本地区的医院感染管理进行技术指导【单选题】——

A. 卫生部医院感染管理咨询专家委员会

B. 省医院感染管理专家咨询委员会

C. 各级医院的医院感染管理委员会

D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：B

20、下列内镜需灭菌但除外【单选题】——

A. 脑室镜

B. 胸腔镜

C. 腹腔镜

D. 关节镜 支气管纤维镜

【答案】：E

21、属于低水平消毒剂的是【单选题】——

- A. 戊二醛
- B. 过氧乙酸
- C. 碘伏
- D. 氯己定 异丙醇

【答案】：D

22、目前胃镜消毒首选的消毒剂是【单选题】——

- A. 乙醇
- B. 84 消毒液
- C. 2%戊二醛
- D. 洗必泰 新洁尔灭

【答案】：C

23、医务人员发生艾滋病职业暴露后预防性用药最迟不得超过【单选题】——

- A. 72h
- B. 48h
- C. 24h
- D. 12h 4h

【答案】：D

24、牙科手机和耐湿热、需要灭菌的口腔诊疗器械,首选灭菌方法为【单选题】——

- A. 环氧乙烷熏蒸灭菌
- B. 压力蒸汽灭菌
- C. 等离子体灭菌
- D. 化学方法进行浸泡灭菌 煮沸消毒

【答案】：B

25、医疗区域属于半污染区的是【单选题】——

- A. 患者洗涤间
- B.

病区化验室

- C. 病室及厕所
- D. 治疗室 病区营养配餐室

【答案】：B

26、洗手的指征中哪一项不合理【单选题】——

- A. 新生儿室入室常规规定应彻底洗手
- B. 接触污物前、后应洗手
- C. 侵入性操作前、后应洗手
- D. 接触病人后应洗手 脱手套后需洗手

【答案】：B

27、根据我国卫生标准回答以下问题：对本地区的医院内感染管理进行技术指导的应是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：B

28、下排气式灭菌器灭菌包体积不应大于【单选题】——

- A. 30cm×30cm×20cm
- B. 30cm×30cm×40cm
- C. 30cm×40cm×30cm
- D. 30cm×30cm×25cm 20cm×30cm×40cm

【答案】：D

29、关于消毒因子对人体的危害,错误的是【单选题】——

- A. 微波对人体无害
- B. 液体消毒剂可以造成人体过敏
- C. 紫外线直接照射可伤害人体皮肤和角膜
- D. 环氧乙烷泄漏不仅对人体直接有毒,还可以发生爆炸 吸

入戊二醛气体对人体有害

【答案】：A

30、刘某,被诊断为霍乱,对其应该采取的隔离方式是【单选题】——

- A. 消化道隔离
- B. 严密隔离
- C. 昆虫隔离
- D. 保护性隔离 呼吸道隔离

【答案】： B

31、小儿流感嗜血杆菌感染首选的药物是【单选题】——

- A. 青霉素
- B. 氨苄西林
- C. 磺胺嘧啶
- D. 头孢唑啉 林可霉素

【答案】： B

32、下列哪种情况属于医院感染【单选题】——

- A. 烧伤创面培养出金黄色葡萄球菌
- B. 经产道感染的乙型肝炎
- C. 红霉素静脉滴注后发生静脉炎;拔出的导管在血平皿上滚动培养,细菌菌落数8个
- D. 羊肠线吸收不佳的炎症反应 入院后5天发生的甲型肝炎

【答案】： B

33、根据《综合医院建筑标准》有关的卫生学标准及预防医院感染的要求,对医院的改建、扩建和新建,提出建设性意见【单选题】——

- A. 卫生部医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】： C

34、高效消毒剂【单选题】——

- A.

0.5%碘伏

B. 2%戊二醛

C. 两者均是

D. 两者均否

【答案】：B

35、接触传染病患者后隔离衣应放在【单选题】——

A. 治疗区,清洁面向外

B. 走廊,清洁面向外

C. 走廊,清洁面向内

D. 办公室,清洁面向外 病室,清洁面向外

【答案】：B

36、自身感染【单选题】——

A. 病人入院时已处于另一种传染病的潜伏期,入院后发病,并传给其他病人

B. 病原体来源于病人本身的感染

C. 在诊疗过程中,由于器械消毒不严或制剂不纯引起的感染

D. 病人与医生及其他病人通过直接或间接传播引起的感染 病人在家中已发生的感染

【答案】：B

37、不属于高度危险物品的是【单选题】——

A. 腹腔镜

B. 导尿管

C. 体温表

D. 穿刺针 手术器材

【答案】：C

38、传染病院应设置在【单选题】——

A. 靠近综合性医院

B. 城市中心

C.

远离公共场所

D. 交通便利的地方 水源充足的地方

【答案】：C

39、根据我国下列卫生标准回答:进入组织、器官或接触破损皮肤、黏膜的医疗用品的卫生标准是【单选题】——

A. 必须无菌

B. 细菌菌落总数应 $\leq 20\text{cfu/g}$ 或 $\leq 20\text{cfu}/100\text{cm}^2$,致病性微生物不得检出

C. 细菌菌落总数应 $\leq 200\text{cfu/g}$ 或 $\leq 200\text{cfu}/100\text{cm}^2$,致病性微生物不得检出

D. 细菌菌落总数应 $\leq 100\text{cfu/mL}$,致病性微生物不得检出 细菌菌落总数应 $\leq 300\text{cfu/mL}$,致病性微生物不得检出

【答案】：A

40、美国一护士在护理埃博拉感染患者时,也被诊断为埃博拉出血热,其属【单选题】——

A. 外来病毒感染

B. 非接触性感染

C. 自患传染性疾病

D. 医院感染 因空气造成的感染

【答案】：D

41、下列消毒剂中哪一种为高效消毒剂【单选题】——

A. 聚维铜碘

B. 碘酊

C. 乙醇

D. 含氯消毒剂 酚类消毒剂

【答案】：D

42、下述监测不合格的有【单选题】——

A. 层流洁净手术室空气细菌数 $\leq 10\text{cfu}/\text{m}^3$

B. 重症监护室医护人员手 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$

C.

供应室无菌区物体表面细菌数 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$

D. 一次性注射器和输液器细菌培养阴性, 噬试验阳性 传染病病房物体表面 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$

【答案】：D

43、碘伏属于【单选题】——

A. 中效消毒剂

B. 低效消毒剂

C. 以上都不是

D. 高效消毒剂 中低效消毒剂

【答案】：A

44、监督、指导医师和医技人员严格执行无菌技术操作规程、抗感染药物合理应用、一次性医疗用品的管理等有关医院感染管理的制度【单选题】——

A. 卫生部医院感染管理咨询专家委员会

B. 省医院感染管理专家咨询委员会

C. 各级医院的医院感染管理委员会

D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：E

45、对于医院感染控制指标描述错误的是【单选题】——

A. 100~500张病床的医院, 一类切口手术部位感染率应低于0.5%

B. 100~500张病床的医院, 医院感染发病率应低于8%

C. 500张病床以上的医院, 医院感染发病率应低于10%

D. 100张病床以下的医院, 一类切口手术部位感染率应低于2%

100张病床以下的医院, 医院感染发病率应低于7%

【答案】：D

46、关于医院感染知识培训要求, 下述中错误的是【单选题】——

A. 培训内容包括管理知识和专业知识

B. 培训对象包括管理、医务、工勤人员

C.

非专职人员每年培训不少于 2 小时

D. 进修医师必须培训 实习医师必须培训

【答案】：C

47、医院内最多见的多重耐药菌株是【单选题】——

A. 耐甲氧西林/苯唑西林的金黄葡萄球菌(MRSA)

B. 耐万古霉素肠球菌(VRE)

C. 耐万古霉素金黄葡萄球菌(VRSA)

D. 产超广谱酶大肠埃希菌 耐青霉素的肺炎链球菌

【答案】：A

48、关于各种危险性物品的处理方法不正确的是【单选题】——

A. 凡是高度危险的物品,必须选用灭菌法

B. 凡中度危险性物品,一般情况下达到消毒即可

C. 中度危险性物品的消毒要求并不相同,部分内窥镜必须达到高效消毒

D. 凡低度危险性物品,一般可用低效消毒方法 而对便器、卫生洁具等物品则只作一般的清洁处理即可

【答案】：E

49、下列消毒剂中属高水平消毒剂的有【单选题】——

A. 戊二醛

B. 络合碘

C. 苯扎溴铵

D. 乙醇 碘酊

【答案】：A

50、保管无菌物品哪项是错误的【单选题】——

A. 无菌物品应放在清洁干燥、固定的地方

B. 取出的无菌物品不得放回无菌容器内

C. 无菌包必须注明灭菌日期

D. 无菌物与非无菌物应分别放置 已启用的无菌包,48h 后必

须重新灭菌

【答案】：E

- 51、有关医院内感染预防与控制的概念,错误的是【单选题】——
- A. 部分医院内感染是可以预防的
 - B. 洗手是预防医院内感染的重要措施
 - C. 医院内感染一定是由于消毒隔离缺陷所致
 - D. 内源性医院内感染是医院内感染的重要原因 滥用抗菌药物可致二重感染

【答案】： C

- 52、对传染性非典型肺炎无效的公众预防措施是【单选题】——
- A. 讲究个人卫生
 - B. 不接触传染性非典型患者或临床诊断患者
 - C. 在通风不好或人群密集的场所戴口罩鼻罩
 - D. 勤洗手 注射丙种球蛋白

【答案】： E

- 53、术前皮肤消毒应由【单选题】——
- A. 巡回护士完成
 - B. 未洗手的手术医生完成
 - C. 手术护士完成
 - D. 已洗手的手术医生完成 麻醉医生完成

【答案】： D

- 54、《医务人员艾滋病病毒职业暴露防护工作指导原则(试行)》是卫生部于哪年制定的【单选题】——
- A. 2002 年
 - B. 2003 年
 - C. 2004 年
 - D. 2005 年 2001 年

【答案】： C

- 55、血液净化室的医院感染管理下列哪项不正确【单选题】——
- A. 应对病人常规进行血液净化前肝功能、肝炎病原体等检查
 - B.

工作人员定期体检,加强个人防护

- C. 透析器、管道应专人专用
- D. 传染病病人在隔离血液净化间内进行,专机透析 急诊病人不需固定透析机

【答案】：E

56、关于压力蒸汽灭菌效果监测要求正确的是【单选题】——

- A. 工艺监测每天进行
- B. 化学监测每包进行
- C. 生物监测每周进行
- D. B-D 试验每天灭菌后进行 B-D 试验每锅进行

【答案】：B

57、医院感染的病原特点不对的是【单选题】——

- A. 90%为条件致病微生物,少数为致病微生物
- B. 一种病原引起多部位感染或一个部位有多种细菌感染
- C. 近年来 G-杆菌中非发酵菌和 G+球中的表皮葡萄球菌以及真菌下降趋势
- D. 多为耐药菌或多重耐药菌 免疫功能低下患者的病原谱广,病原随抗生素应用或免疫功能缺损程度而有变迁

【答案】：C

58、肾移植患者应采取哪种隔离措施【单选题】——

- A. 严密隔离
- B. 接触隔离
- C. 呼吸道隔离
- D. 消化道隔离 保护性隔离

【答案】：E

59、张某,大面积烧伤病人,创面出现铜绿假单胞菌感染,创面换药后敷料的正确处理方法为【单选题】——

- A. 扔入污物桶

B. 焚烧

C.

清洗后放日光下曝晒

D. 清洗后再消毒 灭菌后再清洗

【答案】： B

60、关于地面和拖洗工具的消毒,下列哪项是正确的【单选题】——

A. 地面应经常用含氯消毒剂拖洗,既能消毒,又能增白

B. 因为 2%戊二醛是高水平消毒剂,有条件时最好用戊二醛拖地,消毒效果好

C. 地面应湿式清扫,保持清洁,局部有血迹等污染时,应局部用消毒剂处理

D. 拖洗工具使用后先洗净,再消毒,然后晾干 检验科的地面每天均需用消毒剂拖洗

【答案】： C

61、抗菌药物应用中,下列哪项属错误【单选题】——

A. 病毒感染不用抗菌药物

B. 疑为细菌感染,应先送培养标本而后经验性选药

C. 培养结果出来,根据其药敏结果调整药物

D. 当应用抗菌药物 24 小时未见效立即改选其他药物 一般感染抗菌药物用至症状体征消失后 3~4 天

【答案】： D

62、II类区域空气消毒合格的标准是【单选题】——

A. 细菌总数 $\leq 300\text{cfu}/\text{m}^3$,未检出致病菌

B. 细菌总数 $\leq 400\text{cfu}/\text{m}^3$,未检出致病菌

C. 细菌总数 $\leq 200\text{cfu}/\text{m}^3$,未检出致病菌

D. 细菌总数 $\leq 10\text{cfu}/\text{m}^3$,未检出致病菌 细菌总数 $\leq 500\text{cfu}/\text{m}^3$,未检出致病菌

【答案】： C

63、医院感染区别于其他感染的不同点错误的是【单选题】——

A. 医院感染的菌株大多为多重耐药性

B. 易感人群抵抗力低,病死率高

C.

在医院内一旦发生医院感染很容易引发群发性感染

- D. 在医院感染治疗效果好,一般不会出现死亡 医院感染病原体来源广泛

【答案】: D

64、重症监护病房【单选题】——

- A. $\leq 10 \leq 5 \leq 5$
B. $\leq 200 \leq 5 \leq 5$
C. $\leq 500 \leq 10 \leq 10$
D. $=- \leq 15 \leq 15$

【答案】: B

65、关于刷手的注意事项,其中正确的是【单选题】——

- A. 手刷 48 小时高压消毒 1 次
B. 刷手的时间为 4 分钟
C. 手刷放在洗手盆中
D. 肥皂液每日更换 1 次 刷洗的范围限于被污染的部位

【答案】: D

66、MRSA 感染的最佳选药【单选题】——

- A. 去甲万古霉素、万古霉素
B. 头孢唑林
C. 氧氟沙星
D. 磷霉素 阿米卡星

【答案】: A

67、对到传染病室探视的亲友应注意的事项哪些不对【单选题】——

- A. 对于有感染指征的来访者,一律谢绝探视
B. 探视者在进入隔离室前要先报告值班护士
C. 对于有感染指征的患者,应尽量控制和减少探视
D. 医务人员应指导和监督探视者按规定进行隔离 积极向探视者进行卫生知识宣传教育,保护探视者不受感染

【答案】: C

68、在我国医院内感染中,病人最常发生感染的部位是【单选题】——

- A. 泌尿道
- B. 外科切口
- C. 血液
- D. 呼吸道 胃肠道

【答案】：D

69、无菌治疗巾打开后,未用完其继续使用的有效时间是【单选题】——

- A. 4h
- B. 12h
- C. 6h
- D. 2h 24h

【答案】：E

70、根据我国卫生标准回答以下问题:根据《综合医院建筑标准》有关的卫生学标准及预防医院内感染的要求,对医院的改建、扩建和新建提出建设性意见的应是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：C

71、医院感染常规监测中下列哪项是错误的【单选题】——

- A. 医院感染高危科室、高危人群监测
- B. 漏报率监测
- C. 医院感染高危因素监测
- D. 医院感染暴发流行监测 传染病报告卡监测

【答案】：E

72、煮沸消毒灭菌时,错误的操作是【单选题】——

- A.

大小相同的盆应重叠

- B. 玻璃类用纱布包好
- C. 物品完全浸没在水中
- D. 煮沸过程中再加物品,应在第二次水沸后重新计时 有轴节的器械宜打开

【答案】：A

73、医院感染最常发生的疾病是【单选题】——

- A. 肠道传染病
- B. 泌尿道感染
- C. 外伤感染
- D. 表皮传染病 呼吸道传染病

【答案】：E

74、下列概念中哪项是错误的【单选题】——

- A. 全面综合性监测可获得医院感染本底感染率
- B. 目标性监测是将有限的人力、财力用于解决医院感染的关键问题
- C. 医院感染与传染病相同的是培养出细菌即能确诊
- D. 医院感染的现患率高于同期的感染发生率 医院感染漏报率的调查目的是对感染率监测质量的评估

【答案】：C

75、关于医院感染知识培训错误的是【单选题】——

- A. 培训内容包括管理知识和专业知识
- B. 非专职人员每年不少于2小时培训
- C. 培训对象包括管理. 医务. 工勤人员
- D. 实习医师必须培训 进修医师必须培训

【答案】：B

76、普通病房物体表面细菌菌落总数卫生标准应【单选题】——

- A. $\leq 500\text{cfu}/\text{cm}^2$
- B. $\leq 200\text{cfu}/\text{cm}^2$
- C.

$\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$

D. $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$ $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$

【答案】：D

77、调查医院内感染的最佳方法是【单选题】——

A. 从医院微生物室获得病例来源

B. 临床医院填报病例

C. 专职护士到病案室前瞻性发现病例

D. 病室监控护士报告病例 专职护士到病案室从出院病历中
找查病例

【答案】：C

78、I类、II类区域工作人员卫生手及物体表面的合格标准为【单选题】——

A. 细菌总数 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$,未检出致病菌

B. 细菌总数 $\leq 20\text{cfu}/\text{cm}^2$,未检出致病菌

C. 细菌总数 $\leq 25\text{cfu}/\text{cm}^2$,未检出致病菌

D. 细菌总数 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$,未检出致病菌 细菌总数
 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$,未检出致病菌

【答案】：D

79、在医院中幽门螺杆菌的传播以下列哪种方式最多见【单选题】——

A. 空气传播

B. 接触传播

C. 血液传播

D. 唾沫传播 内镜操作传播

【答案】：E

80、下列情况不是医院感染【单选题】——

A. 病人发生的感染是上次住院期间获得的

B. 有明确潜伏期的感染,自入院时计算起。超过其常见潜伏期而发生

的感染

C.

在原有医院感染的基础上又出现其他部位新的感染(除外脓毒症的迁徙病灶)

D. 没有明确潜伏期的感染,发生在入院 48 小时以后者 新生儿经胎盘获得的感染

【答案】: E

81、三级医院【单选题】——

A. 医院感染发生率 \leq 8%

B. 切口感染率 \leq 0.5%

C. 两者均是

D. 两者均不是

【答案】: B

82、传染病区使用的拖把【单选题】——

A. 每次使用后清水冲洗,悬挂晾干备用

B. 先用 1000mg/L 有效氯消毒剂适量倒在污染地面 30min 后,用拖把拖干净

C. 应先消毒,用 500mg/L 有效氯消毒液浸泡 30min,再用水洗干净,然后用 500mg/L 有效氯消毒液浸泡 30min,悬挂晾干备用

D. 拖把应有明显的标记,严格分区使用 拖把用 500mg/L 有效氯消毒液浸泡 30min 后,再洗干净,晾干备用

【答案】: C

83、标准预防针对体内物质的隔离预防不包括【单选题】——

A. 血液

B. 体液

C. 汗液

D. 排泄物 分泌物

【答案】: C

84、目前国内医院感染最常发生的部位是【单选题】——

A. 泌尿道

B. 外科切口

C.

血液

D. 下呼吸道 胃肠道

【答案】：D

85、关于医院感染的概念正确的是【单选题】——

A. 与上次住院有关的感染不是医院感染

B. 医院感染是指在医院内获得的感染

C. 诊疗措施激活的潜在性感染不是医院感染

D. 婴幼儿经胎盘获得的感染是医院感染 出院之后发生的感染一定不是医院感染

【答案】：B

86、用紫外线消毒空气的错误方法是【单选题】——

A. 时间为 30~60 分钟

B. 有效距离在 2m 内

C. 每 10m² 安装 30W 紫外线灯管一支

D. 消毒时间为 20~30 分钟 从灯亮 5~7 分钟后开始计时

【答案】：D

87、医源性感染【单选题】——

A. 病原体来源于病人本身的感染

B. 在诊疗过程中,由于器械消毒不严或制剂不纯引起的感染

C. 病人与医生及其他病人通过直接或间接传播引起的感染

D. 病人入院时已处于另一种传染病的潜伏期,入院后发病,并传给其他病人 病人在家中已发生的感染

【答案】：B

88、肛管煮沸消毒时,操作错误的是【单选题】——

A. 先将肛管洗刷干净

B. 水沸后开始计时

C. 肛管腔内注水,用纱布包好

D. 冷水时放入 在沸水中持续 5~10 分钟

【答案】：D

89、胃镜、肠镜、十二指肠镜采用 2%碱性戊二醛消毒浸泡时间应不少于【单选题】——

- A. 10h
- B. 4h
- C. 60min
- D. 30min 10min

【答案】：E

90、预防免疫功能低下病人发生医院内感染不正确的是【单选题】——

- A. 注射相关疫苗
- B. 全身使用广谱抗生素预防感染
- C. 治疗局部感染病灶
- D. 保护性隔离 保护皮肤黏膜的完整性

【答案】：B

91、每日 I 级手术间开始前,提前开启净化空调系统时间【单选题】——

- A. 10 分钟
- B. 30 分钟
- C. 15 分钟
- D. 20 分钟 40 分钟

【答案】：B

92、普通手术室医护人员手表面细菌菌落总数卫生标准应【单选题】——

- A. $\leq 5\text{cfu/cm}^2$
- B. $\leq 10\text{cfu/cm}^2$
- C. $\leq 15\text{cfu/cm}^2$
- D. $\leq 200\text{cfu/cm}^2$ $\leq 500\text{cfu/cm}^2$

【答案】：A

93、III类区域工作人员卫生手及物体表面的合格标准为【单选题】——

- A. 细菌总数 $\leq 20\text{cfu}/\text{cm}^2$, 未检出致病菌
- B. 细菌总数 $\leq 25\text{cfu}/\text{cm}^2$, 未检出致病菌
- C. 细菌总数 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$, 未检出致病菌
- D. 细菌总数 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$, 未检出致病菌 细菌总数 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$, 未检出致病菌

【答案】： C

94、霍乱病人应采取【单选题】——

- A. 接触隔离
- B. 保护性隔离
- C. 呼吸道隔离
- D. 消化道隔离 严密隔离

【答案】： E

95、母婴室的医院感染管理错误的是【单选题】——

- A. 每名婴儿床位的占地面积不应少于 $0.5-1\text{m}^2$
- B. 每张产妇床位的使用面积不应少于 $5.5-6.5\text{m}^2$
- C. 严格探视制度, 探视者应着清洁服装, 洗手后方可接触婴儿
- D. 婴儿有感染性疾病时, 应及时与其他婴儿隔离, 但患儿母亲不需隔离 产妇在传染病急性期, 应暂停哺乳

【答案】： D

96、对怀疑医院内感染的病例取标本进行病原体检查, 错误的是【单选题】——

- A. 在使用抗菌药物前送标本
- B. 为节约经费, 应该在抗感染治疗效果不佳时取标本做病原体检查
- C. 采集标本后及时送检
- D. 采集标本时防止污染 接到临床标本后及时正确接种

【答案】： B

97、根据我国卫生标准回答以下问题:使用中的消毒剂【单选题】——

- A. 必须无菌
- B. 细菌菌落总数应 $\leq 20\text{cfu/g}$ 或 $\leq 20\text{cfu}/100\text{cm}^2$,致病性微生物不得检出
- C. 细菌菌落总数应 $\leq 200\text{cfu/g}$ 或 $\leq 200\text{cfu}/100\text{cm}^2$,致病性微生物不得检出
- D. 细菌菌落总数应 $\leq 100\text{cfu/mL}$,致病性微生物不得检出 细菌菌落总数应 $\leq 300\text{cfu/mL}$,致病性微生物不得检出

【答案】: D

98、灭菌速度快、灭菌效果好、经济、环境污染小的是【单选题】——

- A. 过氧乙酸浸泡灭菌法
- B. 辐射灭菌法
- C. 戊二醛浸泡灭菌法
- D. 环氧乙烷灭菌法 压力蒸汽灭菌法

【答案】: E

99、关于洗手指征,下述哪项是错误的【单选题】——

- A. 接触病人前后
- B. 进行无菌技术操作前后
- C. 戴口罩和穿、脱隔离衣前后
- D. 接触血液、体液和被污染的物品前后 脱手套后无须洗手

【答案】: E

100、紫外线消毒的有效距离是【单选题】——

- A. 10m
- B. 2m
- C. 1m
- D. 5m 15m

【答案】: B

101、关于医院内感染的概念,错误的是【单选题】——

- A. 医院内感染是指在医院内获得的感染
- B. 与上次住院有关的感染是医院内感染
- C. 出院之后发生的感染可能不是医院内感染
- D. 入院时处于潜伏期的感染一定不是医院内感染
婴幼儿经胎盘获得的感染是医院内感染

【答案】：E

102、下列哪项不是医院感染的特点【单选题】——

- A. 易感人群抵抗力低,病死率高
- B. 医院中流行的菌株大多为多重耐药性
- C. 医院中病原体来源广泛
- D. 在医院感染中人群的病死率很低
在医院内一旦发生感染很容易播散

【答案】：D

103、脊髓灰质炎宜采取【单选题】——

- A. 消化道隔离
- B. 呼吸道隔离
- C. 两者均是
- D. 两者均不是

【答案】：C

104、生活垃圾【单选题】——

- A. 使用过的注射针头
- B. 带血的敷料
- C. 两者均是
- D. 两者均否

【答案】：D

105、避污纸的正确使用方法为【单选题】——

- A. 污染的手取避污纸可掀页撕取
- B.

从页面抓取

- C. 随便撕取
- D. 掀开页面抓取第一页 清洁手取避污纸需他人传递

【答案】：B

106、关于中东呼吸综合征流行病学描述正确的是【单选题】——

- A. 完全具备持续的人传人的能力
- B. 狨猴为自然储存宿主
- C. 以接触传播为主,其次是呼吸道传播
- D. 单峰骆驼可能是人类感染来源 非密切接触即可引起人际间传播

【答案】：D

107、有关医院感染预防与控制的概念错误的是【单选题】——

- A. 洗手是预防医院感染的重要措施
- B. 滥用抗感染药物可致二重感染
- C. 部分医院感染是可以预防的
- D. 内源性医院感染是医院感染的重要原因 医院感染一定是由于消毒隔离缺陷所致

【答案】：E

108、组织实施国家有关政策法规【单选题】——

- A. 卫生部医政司医院感染管理委员会
- B. 省市卫生行政部门医院感染管理委员会
- C. 医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室以下各项工作是哪个部门的职责

【答案】：B

109、关于使用中的灭菌剂的监测正确的是【单选题】——

- A. 生物监测每周一次
- B. 生物监测每天一次
- C.

生物监测不得检出致病微生物

D. 化学监测每月一次 灭菌后的物品不得检出任何微生物

【答案】：E

110、乙型脑炎主要传播媒介是【单选题】——

A. 蚊

B. 虱

C. 螨

D. 鼠 蚤

【答案】：A

111、传染病门诊【单选题】——

A. $\leq 10 \leq 5 \leq 5$

B. $\leq 200 \leq 5 \leq 5$

C. $\leq 500 \leq 10 \leq 10$

D. $=- \leq 15 \leq 15$

【答案】：D

112、普通病房【单选题】——

A. 空气 $\leq 10\text{cfu}/\text{m}^3$, 物体表面 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^3$, 医护人员手 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$

B. 空气 $\leq 200\text{cfu}/\text{m}^3$, 物体表面 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^3$, 医护人员手 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$

C. 空气 $\leq 500\text{cfu}/\text{m}^3$, 物体表面 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^3$, 医护人员手 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$

D. -, 物体表面 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^3$, 医护人员手 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$ 空气 $\leq 1000\text{cfu}/\text{m}^3$, 物体表面 $\leq 8\text{cfu}/\text{cm}^3$, 医护人员手 $\leq 8\text{cfu}/\text{cm}^2$? 下列各医疗区的细菌学指标是

【答案】：C

113、李某,以“急性甲型肝炎”收住院治疗,病人正在治疗期间。他要将自己的病情告知外地的家人,他的信件应该怎样处理后方可寄出【单选题】——

A. 含氯消毒液喷雾

B. 甲醛熏蒸柜熏蒸

C.

紫外线照射

D. 过氧化乙酸擦拭 高压蒸汽灭菌

【答案】：B

114、测定压力蒸汽灭菌效果的指示菌是【单选题】——

A. 白色念珠菌(ATCC10231)

B. 金黄色葡萄球菌(ATCC6538)

C. 大肠杆菌(ATCC8099)

D. 枯草杆菌黑色变种(ATCC9372) 嗜热脂肪杆菌芽胞
(ATCC9753)

【答案】：E

115、在医院感染暴发流行或流行得到证实后,医院应在多长时间内报告上级卫生行政部门【单选题】——

A. 48h

B. 36h

C. 24h

D. 12h 6h

【答案】：C

116、医院污物的处理原则错误的是【单选题】——

A. 防止污染扩散

B. 分类收集

C. 分别处理

D. 少量医疗垃圾可与生活垃圾一同处理 尽可能采用焚烧处理

【答案】：D

117、手术中切开空腔脏器前用纱垫保护的目的是【单选题】——

A. 防止内脏器官暴露过久

B. 防止细菌污染

C. 防止出血

D. 防止损伤 防止术后腹胀

【答案】：B

118、丙型病毒性肝炎宜采取【单选题】——

- A. 消化道隔离
- B. 呼吸道隔离
- C. 两者均是
- D. 两者均不是

【答案】：D

119、穿过皮肤或黏膜进入无菌组织或器官内部的器材应采用的消毒方式【单选题】——

- A. 杀灭结核杆菌的消毒剂或中、低效消毒剂
- B. 杀灭细菌繁殖体的消毒剂
- C. 应用灭菌剂或高效消毒剂
- D. 灭菌剂或物理、化学灭菌方法 应用物理灭菌方法

【答案】：D

120、密闭式潴留导尿系统引起感染的危险因素中,哪一项最常见【单选题】——

- A. 潴留导尿持续1周
- B. 集尿袋位处膀胱水平之上
- C. 抗生素膀胱冲洗
- D. 集尿管扭结或阻塞 密闭系统的接头反复打开

【答案】：E

121、下列细菌是目前医院感染常见的细菌,但除外【单选题】——

- A. 葡萄球菌特别是金黄色葡萄球菌和凝固酶阴性葡萄球菌
- B. 大肠埃希菌
- C. 沙门菌
- D. 铜绿假单胞菌 克雷伯肺炎杆菌

【答案】：C

122、压力蒸汽灭菌时器械包的重量【单选题】——

- A. 8kg
- B.

7kg

C. 5kg

D. 6kg 10kg

【答案】： B

123、层流洁净病房【单选题】——

A. $\leq 10 \leq 5 \leq 5$

B. $\leq 200 \leq 5 \leq 5$

C. $\leq 500 \leq 10 \leq 10$

D. $= - \leq 15 \leq 15$

【答案】： A

124、根据我国卫生标准回答:接触皮肤的医疗用品【单选题】——

A. 必须无菌

B. 细菌菌落总数应 $\leq 20\text{Cfu/g}$ 或 $\leq 20\text{cfu}/100\text{cm}^2$,致病性微生物不得检出

C. 细菌菌落总数应 $\leq 200\text{cfu/g}$ 或 $\leq 200\text{cfu}/100\text{cm}^2$,致病性微生物不得检出

D. 细菌菌落总数应 $\leq 100\text{cfu/mL}$,致病性微生物不得检出
细菌菌落总数应 $\leq 300\text{cfu/mL}$,致病性微生物不得检出

【答案】： C

125、仅直接或间接地和健康无损的皮肤相接触的物品可选择【单选题】——

A. 应用灭菌剂或高效消毒剂

B. 杀灭细菌繁殖体的消毒剂

C. 杀灭结核杆菌的消毒剂或中、低效消毒剂

D. 灭菌剂或物理、化学灭菌方法 应用物理灭菌方法

【答案】： C

126、目前引起输血后肝炎的主要的肝炎病毒为【单选题】——

A. 乙型肝炎病毒

B. 甲型肝炎病毒

C.

戊型肝炎病毒

D. 丙型肝炎病毒 庚型肝炎病毒

【答案】：D

127、除灭菌速度快、灭菌效果好、经济、环境污染小的压力蒸气灭菌法外,目前最常用的低温灭菌方法是【单选题】——

A. 环氧乙烷灭菌法

B. 戊二醛浸泡灭菌法

C. 辐射灭菌法

D. 过氧乙酸浸泡灭菌法 微波灭菌法

【答案】：A

128、有关医院感染预防与控制的概念,错误的是:【单选题】——

A. 外源性感染是可以预防的

B. 洗手是预防医院感染的重要措施

C. 做好消毒隔离就可杜绝医院感染的发生

D. 内源性医院感染是难以预防的 滥用抗菌药物可致二重感染

【答案】：C

129、免疫功能低下病人的医院内感染预防,下列哪项错误【单选题】——

A. 保护皮肤黏膜的完整性

B. 广谱抗生素肠道预防感染

C. 保护性隔离

D. 治疗局部感染病灶 疫苗注射

【答案】：B

130、以下概念正确的是【单选题】——

A. 地面应湿式清扫,保持清洁,局部有血迹等污染时局部用消毒剂处理

B. 地面应经常用含氯消毒剂拖洗,既能消毒,又能增白

- C. 检验科的地面每天均需用消毒剂拖洗
- D. 拖洗工具使用后先洗净,再消毒,然后晾干

因为 2%戊二醛是高水平消毒剂,有条件时最好用戊二醛拖地,消毒效果好

【答案】：A

131、下列监测的控制指标中,哪项是错误的【单选题】——

- A. 凡经消毒的物品不能检出任何微生物
- B. 手术室医务人员手上带菌数应少于 5 个/cm²
- C. 新生儿室、儿科病室的物体表面不得检出沙门菌
- D. 手术室、产房、新生儿室空气中含菌量应少于 200 个/m³ 紫外线消毒灯管在使用中的功率应大于 70 μW/cm²

【答案】：A

132、医务人员在诊疗埃博拉患者时,须做好那种隔离措施【单选题】——

- A. 接触隔离
- B. 床边隔离
- C. 保护性隔离
- D. 空气隔离 消化道隔离

【答案】：A

133、护理人员为术前清洁洗肠准备所需肛管,采取煮沸消毒法,以下那项不正确【单选题】——

- A. 肛管腔内注水,用纱布包好
- B. 在沸水中持续煮沸 10min 以上
- C. 冷水时即放入计时
- D. 水沸后开始计时 先将肛管洗刷干净

【答案】：C

134、传染病院应设置在下列哪个地方【单选题】——

- A. 远离公共场所
- B. 交通便利的地方
- C. 城市中心
- D. 靠近综合性医院 水源充足的地方

【答案】：A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/787146026161006105>