

2023 年执业医师资格证之临床助理医师能力测试试 卷 B 卷附答案

单选题（共 60 题）

1、渗出的组胺主要作用是

- A. 引起发热
- B. 起趋化作用
- C. 使血管通透性升高
- D. 导致疼痛
- E. 加重组织损伤

【答案】 C

2、知识点：卵巢分泌功能

- A. 卵巢因素
- B. 子宫因素
- C. 垂体因素
- D. 下丘脑因素
- E. 宫颈因素

【答案】 A

3、大腿受伤后确诊股骨干骨折最主要依据

- A. 伤处严重淤血
- B. 大腿中部肿胀
- C. 大腿中部静脉怒张
- D. 大腿中部异常活动

E. 伤处疼痛剧烈不敢活动

【答案】 D

4、患者，男，32岁。3天前受凉后出现寒战、高热，随之咳嗽，咳少量脓性痰伴右侧胸痛。查体：T39℃，急性病面容，左侧口角疱疹，心率109次/分，律齐，WBC $11.0 \times 10^9/L$

A. 肺炎链球菌肺炎

B. 病毒性肺炎

C. 金黄色葡萄球菌肺炎

D. 干酪性肺炎

E. 肺炎支原体肺炎

【答案】 A

5、患者，男，56岁，足刺伤10天，头痛、乏力、张口困难及颈项强直，伤口红肿。临床诊断为

A. 气性坏疽

B. 败血症

C. 破伤风

D. 脑血栓

E. 牙周炎

【答案】 C

6、知识点：子宫肌瘤

A. 阴道感染

B. 子宫肌瘤

- C. 子宫内膜癌
- D. 子宫畸形
- E. 卵巢癌

【答案】 B

7、关于女性骨盆的描述，下列哪项正确

- A. 骨盆是由髌骨、骶骨和尾骨组成的
- B. 女性骨盆入口呈长椭圆形，约有半数妇女骨盆为女性骨盆
- C. 扁平骨盆入口前后径短，约有 1/4 妇女的骨盆为扁平骨盆
- D. 真骨盆位于骨盆分界线之上
- E. 妊娠期骨盆的韧带受激素影响而较坚韧

【答案】 C

8、9 岁，学生。1 日前因突起高热、剧烈头痛、恶心伴非喷射性呕吐 1 次入院。查体：神清，全身皮肤散在瘀点、瘀斑，颈项抵抗，心率 120 次/分，两肺无异常，腹软无压痛。化验检查：血白细胞计数 20×10^9

- A. 伤寒
- B. 流行性脑脊髓膜炎
- C. 结核性脑膜炎
- D. 流行性乙型脑炎
- E. 病毒性脑炎

【答案】 B

9、《医院感染管理规范》规定，抽出药液、开启的静脉输入用无菌液体，超过一定时间后不得使用，该时间是

- A. 超过 0.5 小时
- B. 超过 1.5 小时
- C. 超过 2.0 小时
- D. 超过 2.5 小时
- E. 超过 3.0 小时

【答案】 C

10、维生素 D 缺乏性佝偻病早期的临床表现是

- A. 神经、精神症状
- B. 前囟增大及闭合延迟
- C. 腕踝畸形
- D. 方颅
- E. 颅骨软化

【答案】 A

11、特发性血小板减少性紫癜

- A. 贫血和出血程度一致
- B. 贫血和出血程度不一致
- C. 有贫血而无出血
- D. 无贫血而有出血
- E. 无贫血也无出血

【答案】 A

12、关于一般房颤的叙述，下列哪项正确

- A. 心房 f 波频率多在 160~250 次 / 分
- B. 心室率快时可伴有脉搏短绌
- C. 持久房颤易发生静脉栓塞
- D. 心室搏动快而规则
- E. 第二心音常强弱不等

【答案】 B

13、男，30 岁，查血压 160 / 95mmHg，Hb85g / L，蛋白+，颗粒管型 2~3 个 / HP，BUN10mmol / L，Cr220 μ mol / L。对该患者不宜采取（）

- A. 低蛋白饮食
- B. 高蛋白饮食
- C. 低钠饮食
- D. 根据尿量多少适当限水
- E. 低磷饮食

【答案】 B

14、禁忌使用洋地黄的是

- A. 心功能不全
- B. 阵发性室上性心动过速
- C. 心房颤动
- D. 肥厚性梗阻性心肌病
- E. 心房扑动

【答案】 D

15、周围性瘫痪也称为

- A. 周围神经损害性瘫痪
- B. 脊髓前角细胞损害性瘫痪
- C. 皮质运动中枢损害性瘫痪
- D. 下运动神经元损害性瘫痪
- E. 脊髓损害性瘫痪

【答案】 D

16、中度精神发育迟滞的 IQ 值范围为

- A. 55?69
- B. 45?59
- C. 35?49
- D. 25?39
- E. 25

【答案】 C

17、知识点：COPD

- A. 应用利尿剂
- B. 应用呼吸兴奋剂
- C. 控制肺部感染
- D. 应用血管扩张剂
- E. 应用强心剂

【答案】 C

18、卵巢恶性肿瘤中，能分泌雌激素的是

- A. 原发性绒癌
- B. 子宫内膜样癌
- C. 未成熟型畸胎瘤
- D. 颗粒细胞瘤
- E. 浆液性囊腺癌

【答案】 D

19、抗血栓形成、保护动脉内皮的调血脂药

- A. 氟伐他汀
- B. 藻酸双酯钠
- C. 阿伐他汀
- D. 苯扎贝特
- E. 普伐他汀

【答案】 B

20、6岁患儿，于7月25日晚饭后突发高热，2小时后抽搐，面色灰暗，四肢凉，血压下降，心肺未见异常，脑膜刺激征阴性。最可能的诊断为

- A. 中毒性细菌性痢疾
- B. 结核性脑膜炎
- C. 颅内肿瘤
- D. 化脓性脑膜炎
- E. 颅内出血

【答案】 A

21、60岁男性，活动中突感眩晕，头痛，呕吐，步行不稳，20分钟后昏迷，呼吸节律不整，诊断为脑出血，其部位为

- A. 脑颞叶
- B. 小脑
- C. 脑桥
- D. 基底节
- E. 脑室

【答案】 B

22、多数原发性醛固酮增多症的最佳治疗是

- A. 口服螺内酯
- B. 口服钙离子拮抗剂
- C. 手术治疗
- D. 口服氨苯蝶啶
- E. 口服阿米洛奇

【答案】 C

23、男性.57岁，近2周来自觉乏力，夜间多汗，体重减轻；查体：肝肋下2cm，脾肋下7cm。化验：血红蛋白80g/L，白细胞 $140 \times 10^9/L$ ，血小板 $100 \times 10^9/L$ ，骨髓象原粒细胞0.02，Ph染色体阳性，NAP呈阴性反应，正确的治疗为

- A. 大剂量抗生素抗感染
- B. 脾切除
- C. HOAP方案化疗

- D. 羟基脲口服
- E. VAP 方案化疗

【答案】 D

24、病人诉自己的血液凝固了，身体干枯了，变成了僵尸。该症状属于

- A. 思维联想障碍
- B. 思维逻辑障碍
- C. 内脏幻觉
- D. 妄想
- E. 人格解体

【答案】 D

25、知识点：肝硬化食管静脉曲张

- A. 建立静脉通道，补充血容量
- B. 三腔二囊管压迫止血
- C. 药物止血
- D. 内镜治疗
- E. TIPS

【答案】 B

26、久用可诱发胆囊炎和胆石症的药物

- A. 辛伐他汀
- B. 氯贝丁酯
- C. 普罗布考

D. 考来烯胺

E. 烟酸

【答案】 B

27、男，活动耐量逐年下降来诊。查体：心尖冲动减弱，范围弥散，心界向两侧扩大，心尖部可闻及 2/6 级别收缩期吹风样杂音，该患者最可能的诊断是

A. 扩张型心肌病

B. 肺源性心脏病

C. 心包积液

D. 风湿性心脏病

E. 缺血性心肌病

【答案】 A

28、男性，65 岁，胸闷、咳嗽伴四肢关节痛 2 个月，X 线胸片示右肺门阴影增大，为确定诊断应首选下列哪项检查

A. 纤维支气管镜检查

B. 胸部体层摄片

C. 支气管造影

D. 肺穿刺活检

E. 痰结核菌检查

【答案】 A

29、年轻女性，低热伴鼻出血 2 周。查体：贫血貌，脾肋下 4cm，胸骨压痛（+），血红蛋白 70g/L，白细胞 $1400 \times 10^9/L$ ，血小板 $40 \times 10^9/L$ ，骨髓增生明显活跃，原始细胞占 0.62，为进一步诊断，应首选的检查是

- A. 染色体核型分析
- B. 细胞化学染色
- C. 血清铁测定
- D. 血细菌培养
- E. 抗血小板抗体检测

【答案】 B

30、A 骨折专有体征是

- A. 异常活动
- B. 肿胀疼痛
- C. 功能障碍
- D. 皮肤淤斑
- E. 死骨形成

【答案】 A

31、关于脐带的描述，以下哪项错误？（ ）

- A. 脐带长于 70cm 或短于 30cm 属异常
- B. 若脐带附着于胎膜上，为帆状胎盘
- C. 脐动脉的含氧量高于脐静脉
- D. 单脐动脉常合并胎儿或胎盘异常
- E. 脐带先露也称脐带隐性脱垂

【答案】 C

32、以滑膜炎为基本病理改变的风湿病是

- A. 强制性脊柱炎
- B. 类风湿关节炎
- C. 风湿性关节炎
- D. 骨性关节炎
- E. 痛风性关节炎

【答案】 B

33、男性，66岁，吸烟30年，1包/天，慢性咳嗽、咳痰15年，多为白黏痰，每年发作3个月左右，近半年来出现上两三层楼就气短，偶有喘鸣音，近期无明显加重，为明确诊断而就诊。查血 WBC 7.5×10

- A. 肋间隙变窄，双肺透亮度减低，心脏扩大
- B. 肋骨走向变平，双肺透亮度增加，横膈降低，心影狭长
- C. 双肺纹理增多，紊乱，伴双下肺片絮状阴影
- D. 双上肺纤维索条状阴影，伴左上肺厚壁空洞
- E. 气管向左移位，右肺可见大片密度增高影

【答案】 B

34、患者，男，23岁，2小时前呕咖啡样物100ml来急诊，既往无肝病和胃病史，查体：贫血貌，血压90/60mmHg，心率100次/分，腹平软，无压痛，肝脾肋下未触及肿大。肠鸣音活跃，最可能的诊断是

- A. 十二指肠溃疡出血
- B. 食管静脉曲张破裂出血
- C. 胃癌出血
- D. 食管贲门黏膜撕裂
- E. 不明原因

【答案】 A

35、中度营养不良患儿热量和蛋白质供给开始应为

- A. 热量 40Kcal/(kg·d), 蛋白质 2 (kg·d)
- B. 热量 60Kcal/(kg·d), 蛋白质 2 (kg·d)
- C. 热量 80Kcal/(kg·d), 蛋白质 2 (kg·d)
- D. 热量 100Kcal/(kg·d), 蛋白质 2 (kg·d)
- E. 热量 120Kcal/(kg·d), 蛋白质 2 (kg·d)

【答案】 B

36、进行性血胸的诊断依据不包括

- A. 持续脉快, 血压下降
- B. 胸腔引流连续 3 小时总量 300ml
- C. Hb、RBC 反复测定呈持续下降
- D. 胸膜腔穿刺抽不出血, 但 X 线示胸内阴影增大
- E. 经输血补液血压不回升逐渐下降

【答案】 B

37、控制间日疟发作的首选药物是

- A. 吡喹酮
- B. 乙胺嘧啶
- C. 氯喹
- D. 伯氨喹
- E. 奎宁

【答案】 C

38、重度新生儿寒冷损伤综合征患儿复温时间为

A. 12~24 小时

B. 0~1 小时

C. 6~12 小时

D. 24~36 小时

E. 3~6 小时

【答案】 A

39、诊断子宫内膜脱落不全时诊刮时间在：

A. 月经第一天

B. 月经第二天

C. 月经第五天

D. 月经来潮 24 小时内

E. 任何时间诊刮均可

【答案】 C

40、实施清创术的根本目的是

A. 减轻创口疼痛

B. 将污染性伤口变为清洁性伤口

C. 将大伤口变为小伤口

D. 减轻组织损伤

E. 使污染伤口保持无菌

【答案】 B

41、判断心脏骤停迅速简便的方法是

- A. 触摸大动脉搏动
- B. 测量血压
- C. 人工呼吸、心脏按压
- D. 非同步直流电除颤
- E. 静脉或气管内滴入肾上腺素

【答案】 A

42、关于结核性渗出性胸膜炎临床表现的描述，下列哪项是不正确的

- A. 积液上方可闻及支气管呼吸音
- B. 大量积液时可引起呼吸困难
- C. 起病一般较急
- D. 早期不会出现胸痛和干咳
- E. 大量积液时喜侧卧位

【答案】 D

43、有关糖尿病的诊断，正确的是

- A. 空腹血糖升高是重要的诊断指标
- B. 两次 OGTT 仍不能诊断时应做第 3 次
- C. 空腹血糖正常可排除糖尿病
- D. 尿糖阴性可排除糖尿病
- E. 糖耐量减低是糖尿病的一个亚型

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/788136006120006051>