

《眼耳鼻咽喉口腔科护理学》模拟试题

一、单选题(从每小题的备选答案中选择一个正确的答案,并将其编号填在题干的括号内)

1. 角膜的总屈光力为

A.+40D B.+43 DC.+45D D.+38D E.+44D

2. 虹膜最薄处在

A.虹膜根部 B.瞳孔领附近 C.瞳孔区 D.睫状区 E.虹膜

3. 细菌性角膜炎最常见的诱因是

A.外伤 B.维生素缺乏 C.年老衰弱 D.免疫缺陷 E.全身长期使用免疫抑制

4. 典型角膜软化症的主要体征

A.角膜水肿 B.结膜充血 C.前方积脓 D.角膜溃疡 E.Biotot 斑

5. 急性泪囊炎的红肿部位在

A.上睑内眦 B.上睑外眦 C.下睑内眦 D.下睑外眦

6. 虹膜周边切除术治疗青光眼的原理是

A.减少房水分泌 B.降低眼压 C.解除瞳孔阻滞 D.增加房水排除 E.建立一个外引流通道

7. 泪液膜的构成由表浅向深部依次为

A.类脂层、水样层、粘液层 B.粘液层、类脂层、水样层 C.水样层、粘液层、类脂层

D.类脂层、粘液层、水样层 E.水样层、类脂层、粘液层

8.预防虹睫炎引起的继发性青光眼,局部应点

A.1%匹鲁卡品 B.0.5%噻吗心安 C.0.25%依色林 D.0.5%可的松 E.1%阿托品

9.视网膜中央静脉阻塞可有

A.视网膜出血 B.视网膜水肿 C.两者均有 D.两者均无

10.原发性闭角型青光眼禁用

A.缩瞳剂 B.碳酸酐酶抑制剂 C.扩瞳剂 D.镇静剂 E.高渗剂

11. 眼部化学伤的急救措施

A.急送医院 B.现场取水冲洗 C.抗生素防感染 D.止痛 E.激素治疗

12.鼓膜最显著的标志是（ ）

A、锤骨长柄 B、前皱襞 C、光锥 D、锤骨短突 E、后皱襞

13.慢性化脓性中耳炎最常见的致病菌是（ ）

A、肺炎球菌 B、变形杆菌 C、棒状杆菌 D、乙型溶血性链球菌
E、葡萄球菌

14.人体维持平衡主要依靠（ ）

A、视觉 B、本体感觉 C、Corti 氏器 D、前庭 E、小脑

1

15.鼻出血最常发生的部位在（ ）

A、鼻中隔后上区 B、鼻中隔后下区 C、鼻中隔前下区
D、下鼻道后分 E、中鼻道

16.鼻咽癌绝大多数为（ ）

- A、低分化鳞状细胞癌 B、淋巴上皮癌 C、低分化腺癌
D、高分化鳞状细胞癌 E、肉瘤

17.急性额窦炎的头痛具有一定的时间性，其原因是（ ）

- A、发热 B、用药后的反应 C、精神因素
D、神经反射 E、窦口位置与体位引流的关系

18.食管异物多见于（ ）

- A、咽环处 B、主动脉弓压迹处 C、贲门处 D、胸廓入口处
E、支气管分叉处

19.喉部最狭窄处为（ ）

- A、喉前庭 B、声门 C、声门下 D、室带之间 E、喉室之间

20.颌面部间隙感染最常见的原因是（ ）

- A、血源性 B、腺源性 C、外伤性 D、牙源性 E、继发于其它感染

21.颌面部间隙感染的一般局部表现（ ）

- A、局部红、肿、热、痛、功能障碍 B、局部软组织广泛水肿
C、局部产生皮下气肿，有捻发音
D、局部剧烈疼痛，有脓肿形成 E、张口受限，影响语言、咀嚼

22.下列何种间隙感染最易导致呼吸困难（ ）

- A、眶下间隙 B、翼颌间隙 C、咬肌间隙 D、下颌下间隙 E、口底蜂窝组织炎

23.舌癌切除行游离组织瓣整复者，术后 1~2 天皮瓣一般呈（ ）

A、灰白色 B、苍白色 C、紫色 D、暗红色 E、鲜红色

24.唇腭裂修复术目前国际上采用（ ）

A、外科治疗 B、正畸治疗 C、语音治疗 D、综合序列治疗
E、心理治疗

25.唇裂手术患儿在全麻清醒后几小时可进流质（ ）

A、清醒后即可 B、1 小时 C、2 小时 D、3 小时 E、4 小时

26.腭裂术后可行语音治疗的时间（ ）

A、1~2 周 B、3~4 周 C、1~2 月 D、3~4 月 E、1~2 年

27.患儿，男，8 个月，入院护理评估见患儿上唇部分裂开，但未裂至鼻底，该患儿唇裂分度应为（ ）

A、I 度唇裂 B、II 度唇裂 C、III 度唇裂 D、完全性唇裂 E、以上都不是

28.颌面部危险三角区的化脓性感染处理不当可引起的并发症有（ ）

A、头部冷敷 B、温水浴 C、酒精擦浴 D、以上均可 E、以上均不可

29.单侧唇裂整复术最适合的年龄是（ ）

A、3~6 月 B、6~12 月 C、1~2 岁 D、2~4 岁 E、学龄前

30. 指导唇裂患儿父母改变喂养方式，应训练患儿用（ ）喂养

A、奶瓶喂养 B汤匙喂养 C吸管喂养 D鼻饲喂养 E
母乳喂养

31. 唇裂术后使用唇弓的目的是为了（ ）

A、减少局部张力 B预防伤口感染 C便于病人进食 D以
上都对 E以上都不对

32. 龋病的病因（ ）

A.蔗糖 细菌 牙发育不良 细菌、食物、宿主、时间共同
作用的结果

33 龋病的临床特征是（ ）

A.牙齿有颜色的改变 B.牙齿有缺损 C.窝洞表面有食物残留
D.牙体硬组织有色、形、质的改变

34.急性牙髓炎止痛最有效的方法是（ ）

A.药物止痛 牙髓减压 摘除牙髓 拔除患牙

35. 牙的功能不包括（ ）。

A. 发育时限定了舌的活动范围 B. 通过咀嚼可刺激颌骨正常
发育 C通过咀嚼增进牙周组织健康

D. 保持面部形态正常 E保持口腔的自洁作用

36. 根据形态与功能特点，恒牙可分为（ ）

- A. 切牙、尖牙、磨牙 B. 同形牙与异形牙 C. 前牙与后牙
D. 单根牙、双根牙、多根牙 E. 切

牙、尖牙、前磨牙、磨牙

37. 根据形态与功能特点，乳牙可分为（ ）

- A. 乳切牙、乳尖牙、乳前磨牙、乳磨牙 B. 乳切牙、乳尖牙、
乳磨牙 C. 乳切牙、乳尖牙、乳前磨

牙 D. 乳切牙、乳前磨牙、乳磨牙 E. 乳中切牙、乳尖牙、
乳前磨牙

38. 不属牙体组织的结构是（ ）

- A. 牙釉质 B. 牙骨质 C. 牙本质 D. 牙髓 E. 牙髓腔

39. 在颌面骨中唯一能活动的骨为（ ）

- A. 上颌骨 B. 鼻骨 C. 颧骨 D. 腭骨 E. 下颌骨

40. 支配表情肌运动的是（ ）

- A. 面神经 B. 三叉神经 C. 上颌神经 D. 下颌神经 E. 以
上描述都不正确

41. 腮腺属于（ ）

- A. 纯浆液性腺 B. 纯黏液性腺 C. 混合性腺 D. 以浆液性腺
为主的混合性腺

E. 以黏液性腺为主的混合性腺

42. 面部出血时可压迫（ ）

- A. 颌骨动脉 B. 颞浅动脉 C. 颌外动脉 D. 颈内动脉
E. 颈总动脉

43. 视诊时应首先检查的部位 ()

A. 面部 B. 全口牙齿 C. 口腔黏膜 D. 舌苔 E. 主诉部

44. 颌面外科手术备皮范围应在 ()

A. 整个手术区域 B. 大于手术区域 1~2cm C. 大于手术区域 3~4cm D. 大于手术区域 5~10cm

3

E. 大于手术区域 11~20cm

二、多选题 (从每小题的备选答案中选择正确的答案, 并将其编号填在题干的括号内, 多选、少选、错选, 均无分)

1. 瞳孔近反射指

A. 瞳孔缩小 B. 调节 C. 集合 D. 瞳孔散大

2. 急性闭角型青光眼的诱因因为

A. 情绪变化 B. 过度劳累 C. 服用解痉药或阿托品眼药水 D. 暗室工作

3. 扁桃体手术禁忌症包括: ()

A. 急性扁桃体炎发作时 B. 再生障碍性贫血患者 C. 未控制的高血压病人

D. 妇女月经期间 E. 免疫功能低下者

4. 分泌性中耳炎的特点包括: ()

A、听力下降 B、耳痛 C、耳道流脓 D、耳闷 E、耳鸣

5.喉癌下述哪些是正确的 ()

A、喉癌发病率男多于女 B、病理所见以鳞癌为多 C、活检确诊喉癌

D、声嘶为喉癌的早期症状 E、易早期发现者多为声门上型癌

6.气管切开术术后护理的要点有: ()

A、防止套管阻塞或脱出 B、维持下呼吸道通畅 C、抗炎
D、禁声 E、预防感染

7.龋病向纵深发展则可引起 ()

A.牙髓炎 B.牙龈炎 C.根尖周炎 D.牙周炎 E.牙槽脓肿

8.轻型阿弗他溃疡好发于 ()

A.唇 B.舌缘、舌尖 C.颊 D.前庭沟 E.硬腭

三、填空题

1.视网膜脱离是指 与 的分离,治疗的关键是 。

2.屈光不正包括 、 、 三大类。

3.气管切开的并发症有 (任写 5 个) 、 、 、 、 。

4.龋病根据龋损程度分为 、 、 。

5.牙周炎的临床症状表现为 、 、 、 。

6.急性牙髓炎的疼痛特征为 、 、 、 。

7. 从外部观察牙，牙体由 、 及 三部分组成。

8. 面神经的分支有 、 、 、 、 。

9. 人体有三对大唾液腺，即 、 和 。

10. 三叉神经含有两种纤维成分 、 。

四、名词解释题

4

1 . 白 内 障

2 . 阻 塞 性 睡 眠 呼 吸 暂 停 综 合 征

3 . 牙 合 关 系

五 、 简 答 题

- 1 . 睫状充血和结膜充血的区别？
- 2 . 简述鼻出血的护理要点。
- 3 . 舌癌病人术后如何保持呼吸道通畅？
4. 简述舌癌切除行游离组织瓣整复者皮瓣监测的护理要点。
- 5 . 腭裂病人术后护理措施有哪些？
- 6 . 简述龋病的健康指导的内容。
- 7 . 舌部乳头及生理功能是什么？
8. 简述面部危险区的临床意义及与颅内的连通途径。
- 9 . 做一名口腔护士应具备什么素质？

六、论 述 题

(一) 病例 患者女性，**47**岁，自觉右眼视力突然下降**1**周，伴视物变形，闪光感，左上方黑影遮挡，双眼高度近视**32**年，检查发现：双眼无红肿及分泌物，外眼正常，视力 右眼数指 /10cm, 左眼 **0.04** 矫正视力 **0.6**，眼压 右眼 **5.5/14** 左眼 **5.5/5**，眼底检查：右眼视网膜颞上方有一个 **1 / 4 P D** 大的裂孔，左眼底

正 常 。
请 问 :

1. 此时病人最可能的医疗诊断是什么 (2 分) ? 有何依据?
(1 分)
2. 该病人的主要护理诊断/问题有哪些 (至少 3 个) ? (3 分)
- 3 . 如何对病人进行术前护理 ? (6 分)

(二) 一位 65 岁男性患者因进行性呼吸困难 1 月多急诊收入院 , 查 : 患者消瘦 , 急性病容 , 安静就坐后有明显的吸气性呼吸困难伴喉鸣、三凹征。请问:

- 1.你考虑是几度呼吸困难? 目前患者主要存在有哪些护理问题或护理诊断? (请列出至少 3 个主要护理问题或护理诊断)
- 2 . 应 采 取 怎 样 的 护 理 措 施 ?

(二) 患儿, 男性, 3 岁, 行 II 度腭裂整复术, 全麻已醒, 神志清楚, 患儿哭闹, 口腔内伤口以碘仿填塞,
T36.8 °C ,P100 次 / 分, R24 次 / 分,
B p 1 1 0 / 7 4 m m H g , S p o 2 9 8 % 。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/795113312143011104>