

2024年湖北武汉市硚口区人民医院武汉同济汉江湾医院招聘笔试参考题库含答案详解

一、A1型题（每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、稳定型股骨颈骨折是（ ）。

- A. 头下骨折
- B. 经颈骨折
- C. 基底骨折
- D. 内收骨折
- E. 外展骨折

【正确答案】

E

【答案解析】

外展骨折.外展骨折是指Pauwels角小于 30° 的骨折，属于稳定骨折，但如果处理不当或继续扭转，也会移位，变为不稳定骨折。

2、青霉素抗菌作用的机制是（ ）。

- A. 干扰菌细胞壁的合成
- B. 破坏菌细胞核酸的代谢
- C. 破坏菌细胞膜通透性
- D. 干扰菌细胞蛋白质的合成
- E. 干扰细菌细胞器的合成

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

3、关于绒毛膜促性腺激素的叙述，正确的是（ ）。

- A. 是甾体激素
- B. 由子宫蜕膜细胞产生
- C. 其分泌受垂体促性腺激素的影响
- D. 尿中浓度随妊娠月份而增加
- E. 与绝经期促性腺激素合用可诱发排卵

【正确答案】

E

【答案解析】

A项，绒毛膜促性腺激素是糖蛋白激素；B项，由合体滋养细胞合成；C项，不受促性腺激素的影响；D项，妊娠8~10周浓度达高峰，中晚期血清浓度仅为峰值10%；E项，与绝经期促性腺激素合用可诱发排卵。

4、《献血法》规定，献血者两次献血的时间间隔不得少于（ ）。

- A. 一个月
- B. 二个月
- C. 三个月
- D. 四个月
- E. 六个月

【正确答案】

E

【答案解析】

参见《献血法》第九条：血站对献血者每次采集血液量一般为200毫升，最多不得超过400毫升。两次采集间隔期不少于六个月。

5、诊断急性心肌梗死特异性最高的心肌酶是（ ）。

- A. AST
- B. CK-MB与cTnT
- C. CK-MB与LDH
- D. CK-MM
- E. ALT

【正确答案】

B

【答案解析】

B项，正常人的血清中几乎不存在肌钙蛋白（cTnT），当急性心梗时，肌钙蛋白明显升高，为诊断心肌损害具有很高的敏感性和特异性，假阳性率低，是目前诊断心肌损害最有价值的指标之一。肌酸激酶同工酶（CK-MB）增高的程度能较准确地反映梗死的范围，其高峰出现时间是否提前有助于判断溶栓治疗是否成功。AST、ALT、LDH等血清酶不仅存在于心肌，在肝、脑、血细胞、骨骼肌中亦存在，当这些组织受损时均可升高，特异性不高。

6、内毒素的主要成分是（ ）。

- A. 磷壁酸
- B. 脂多糖
- C. 肽聚糖
- D. 脂蛋白
- E. 核蛋白

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

7、关于大叶性肺炎的描述，下述哪一项是错误的？（ ）

- A. 纤维素性炎
- B. 造成整个大叶破坏
- C. 主要是由肺炎链球菌引起
- D. 咳铁锈色痰
- E. 多见于青壮年

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

8、下述关于蛋白质生物合成的描述错误的是（ ）。

- A. 氨基酸必需活化成活性氨基酸
- B. 氨基酸的羧基端被活化
- C. 体内所有的氨基酸都有相应密码子
- D. 活化的氨基酸被搬运到核蛋白体上
- E. tRNA的反密码子与mRNA上的密码子按碱基配对原则结合

【正确答案】

C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/795304034111011121>