

# 二型呼吸衰竭护理查体

---

# 目录


- 引言
- 临床表现
- 护理查体
- 诊断与鉴别诊断
- 治疗与护理
- 预防与预后



01

引言

# 定义与分类



## 定义

二型呼吸衰竭，又称为高碳酸性呼吸衰竭，是指在静息状态下，吸入空气时无法维持正常的血氧水平。



## 分类

根据病程，可分为急性和慢性二型呼吸衰竭；根据发病机制，可分为通气不足和弥散障碍型。



# 病因与病理生理

## 病因

• 常见于慢性阻塞性肺疾病（COPD）、哮喘、肺气肿等呼吸系统疾病，以及其他可能导致肺通气或换气功能严重受损的疾病。

## 病理生理

• 由于通气或换气功能障碍，肺泡通气不足， $\text{CO}_2$ 潴留，导致 $\text{PaCO}_2$ 升高；同时，缺氧刺激颈动脉体、主动脉体等外周化学感受器，使呼吸运动加强，但肺泡通气量仍不足，加重 $\text{CO}_2$ 潴留和缺氧。

02

临床表现

# 症状表现

## 呼吸困难

患者会出现明显的呼吸困难，表现为呼吸急促、气短、胸闷等症状，严重时可能出现呼吸窘迫。

## 消化系统症状

患者可能出现食欲不振、恶心、呕吐等消化系统症状，这是由于缺氧导致胃肠道黏膜充血水肿所致。

## 精神状态改变

患者可能出现意识模糊、嗜睡、昏迷等精神状态改变，这是由于缺氧和二氧化碳潴留导致中枢神经系统受到抑制所致。

## 心率加快

患者心率可能加快，这是由于缺氧和二氧化碳潴留导致心脏负荷加重所致。





# 体征表现

## 紫绀

由于缺氧，患者的口唇、甲床等部位可能出现紫绀现象。



## 桶状胸

患者可能出现桶状胸，这是由于长期慢性缺氧导致肋骨变形所致。

## 肺部啰音

患者肺部可能出现啰音，这是由于肺部炎症、水肿和支气管分泌物增多所致。



## 心率加快和心律不齐

患者可能出现心率加快和心律不齐等心脏体征。



03

护理查体






# 呼吸系统检查

01

经济已稳定进入新一轮上升  
并从合理区间的高位平稳回落



## 呼吸频率



观察患者的呼吸频率是否正常，二型呼吸衰竭患者可能出现呼吸急促或呼吸困难。

02



## 呼吸音



听诊患者的呼吸音，判断是否存在异常，如哮鸣音、干湿啰音等。

03



## 胸廓运动



观察患者的胸廓运动是否对称，有无异常隆起或塌陷。



# 循环系统检查



## 血压

监测患者的血压情况，判断是否存在低血压或高血压。



## 心率

听诊患者的心率，观察心率是否正常，有无心律失常。



## 末梢循环

观察患者的末梢循环情况，如皮肤温度、颜色、湿度等。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：  
<https://d.book118.com/796045210005010111>