

犬伤门诊知识竞赛题库及答案（100 题）

1. 2023 版方案全程免疫狂犬病疫苗后超过 0 再次暴露应当加强接种狂犬疫苗疫苗。

A、1 月

B、2 月

C、3 月（正确答案）

D、4 月

2 . 注射剂型疫苗的使用要求，其中错误的是 0

A、将安班尖端疫苗弹至底部，用 75%乙醇棉球消毒安甄颈部

B、将注射器针头斜面向下插入安祇液面下，吸取疫苗

C、将注射器针头斜面向上插入安甄液面下，吸取疫苗（正确答案）

D、吸取疫苗后，将注射器的针头向上排空注射器的气泡

3 . 如未能在接种狂犬病疫苗的当天使用被动免疫制剂，接种首针狂犬病疫苗 0 天内仍可注射被动免疫制剂。

A、5

B、7（正确答案）

C、10

D、14

4 . 狂犬病疫苗注射采取 0 方式。

A、皮下注射

B、皮内注射

C、肌肉注射（正确答案）

D、口服

5 . 全程接种狂犬病疫苗后 0 再次暴露者一般不需要再次免疫。

A、半年内

B、三个月（正确答案）

C、一年内

D、三年内

6 . 暴露后，狂犬病疫苗的接种禁忌症为（）。

A、妊娠期、哺乳期妇女

B、新生儿、婴儿、老年人

C、同时期需要接种其他疫苗者

D、无禁忌症（正确答案）

7 .当伤口位于头面部、上肢时，如全部伤口进行浸润注射后尚有剩余被动免疫制剂时，可将其注射在（）。

A、暴露部位同侧背部肌肉群，狂犬病疫苗接种于对侧（正确答案）

B、暴露部位同侧背部肌肉群，狂犬病疫苗接种于同侧

C、暴露部位对侧背部肌肉群，狂犬病疫苗接种于对侧

D、暴露部位对侧背部肌肉群，狂犬病疫苗接种于同侧

8 .伤口冲洗时用肥皂水（或者其他弱碱性清洁剂）和一定压力的流动清水交替彻底清洗.冲洗所有咬伤和抓伤处至少 0 分钟。

A、20

B、10

C、5

D、15（正确答案）

9 .完好皮肤接触动物的排泄物属于 0 暴露；裸露的皮肤被轻咬

无出血属于（）暴露。

A、II级 11级

B、I级 In级

C、II级 C级

D、I级 11级（正确答案）

10 . 下列关于特殊部位清创说法错误的是 0

A、面部伤口，蛋白要注射到颞骨

B、眼内伤可以涂抹狂犬病免疫球蛋白

C、外生殖器、肛门部的黏膜暴露不可以使用碘伏消毒清创（正确答案）

D、头部伤狂犬病免疫球蛋白要注射到颅骨表面

11 有一肿瘤患者被犬轻微抓伤（未出血），最好的处置办法是（）。

A、不需处置

B、处理伤口即可

C、立即处理伤口并接种狂犬病疫苗

- D、立即处理伤口并注射狂犬病被动免疫制剂，随后接种狂犬病疫苗（正确答案）
- 12 . 某人脸面部被流浪狗轻微抓伤（无明显出血），最好的处置办法是（ ）。
- A、不需处置
- B、处理伤口即可
- C、立即处理伤口并接种狂犬病疫苗
- D、立即处理伤口并注射狂犬病被动免疫制剂，随后接种狂犬病疫苗（正确答案）

- 13 . 关于犬伤患者暴露伤口处理下列说法错误的是 0
- A、通过冲洗，减少伤口的病毒残留量
- B、狂犬病病毒对脂溶剂（肥皂水、氯仿、丙酮等）、75%酒精、碘制剂以及季胺类化合物较为敏感
- C、冲洗之前检查伤口：是否有神经、肌肉、血管等损伤，并记录、告知患者
- D、用肥皂水（或其他弱碱性清洗剂）和一定压力的流动清水交替清洗咬伤和抓伤的每处伤口至少 10 分钟（正确答案）

14 . 狂犬病病毒侵入神经末梢后，沿周围神经以每小时约（）的速度向中枢神经推进，到达脊髓后即大量繁殖。

A、 1mm

B、 2mm

C、 3mm（正确答案）

D、 4mm

15 . 狂犬病暴露后治疗用肥皂水清洗伤口的原理？（）

A、 狂犬病毒不耐受液体

B、 狂犬病毒对水溶剂敏感

C、 狂犬病毒对脂溶剂敏感（正确答案）

D、 肥皂水可以更好的清洁伤口

16 . 下列属于 11 级暴露的是 0

A、 裸露的皮肤被轻咬（正确答案）

B、 暴露于蝙蝠

C、 破损皮肤被舔

D、完好的皮肤接触狂犬病动物或狂犬病病例的分泌物、排泄物

17 . 下列不属于 In 级暴露的是 0

A、裸露的皮肤被轻咬（正确答案）

B、暴露于蝙蝠

C、免疫功能低下的 II 级暴露者

D、破损的皮肤接触狂犬病动物或狂犬病病例的分泌物、排泄物

18 . 世界狂犬病日是 0

A、9 月 25 日

B、9 月 26 日

C、9 月 27 日

D、9 月 28 日（正确答案）

19 . 狂犬病病毒进入人体后主要沿 0 传播和扩散。

A、循环系统

B、免疫系统

C、消化系统

D、神经系统（正确答案）

20 .被以下哪种动物咬伤不需要注射狂犬疫苗 0

A、狗

B、猫

C、狼

D、鱼（正确答案）

21 .被动免疫制剂总的用量应根据 0 来计算。

A、伤者年龄

B、伤者体重（正确答案）

C、伤者身高

D、伤者受伤程度

22 .接种单位发现疑似预防接种异常反应后要在 0 小时之内向所在区县级疾病预防控制机构报告，区县疾控中心（）小时内向市疾控中心报告。

A、6；4

B、4；6

D、4; 4.

23. 裸露的皮肤被犬轻咬，或者无出血的轻微抓伤、擦伤应判定为
() 暴露。

A、I 级

B、II 级 (正确答案)

C、III 级

D、IV 级

24. 犬伤伤口较大需缝合的，在进行被动免疫制剂浸润注射后不小于 0 小时再行缝合和包扎。

A、0.5

B、1

C、2 (正确答案)

D、3

25. 狂犬疫苗禁止接种的部位是 0

A、上臂三角肌

B、大腿前外侧肌肉

C、臀部肌肉（正确答案）

26 .犬伤患者伤口处理完成后，被动免疫制剂的浸润注射应 0 进针。

A、距伤口缘约 0.5~1cm 处（正确答案）

B、距伤口缘 1cm 以外处

C、直接从伤口内

B、距伤口缘 2cm 以外处

27 .当伤口位于下肢及胸部以下躯干时，如全部伤口进行浸润注射后尚有剩余被动免疫制剂时，可将其注射在 0

A、暴露部位对侧大腿内侧肌群

B、暴露部位对侧大腿外侧肌群

C、暴露部位同侧大腿内侧肌群

D、暴露部位同侧大腿外侧肌群（正确答案）

28 .一般情况下，初次接种狂犬病疫苗后，体内产生的狂犬病病毒中和抗体自 0 天达到保护性水平。

A、5-9

B、10-14（正确答案）

C、 15-19

D、 20-24

29 .狂犬病疫苗对于幼儿、儿童、成年人免疫程序和疫苗剂量是否有区别？（ ）。

A、 相同（正确答案）

B、 不同， 幼儿， 儿童接种剂量减半

C、 不同， 成人首剂加倍

D、 不同， 孕妇接种量减半

30 .犬伤后，用“2-1-1 法”接种抗狂犬病疫苗的方法是在第 0 天接种 2 剂后，还应当 在 0 天各注射一针狂犬病疫苗。

A、 7、 21（正确答案）

B、 3、 14

C、 7、 28

D、 7、 31

31 .当被动免疫制剂的计算剂量不足以浸润全部伤口时，以下做

法正确的是 0

A、增加剂量

B、剩下的伤口不予浸润注射

C、用生理盐水将被动免疫制剂稀释到足够体积再进行浸润注射

(正确答案)

D、用生理盐水代替被动免疫制剂对剩下的伤口进行浸润注射

32 . 狂犬病人免疫球蛋白使用剂量按照每公斤体重 0 个国际单位计算。

A、 10

B、 15

C、 20 (正确答案)

D、 25

33 . 处理犬伤病人首先应该 ()

A、 冲洗伤口 (正确答案)

B、 缝合伤口

C、 注射疫苗

D、注射被动免疫制剂

34 .暴露前免疫程序为在（）天各注射一针狂犬疫苗。

A、0、3、7

B、0、3、14

C、0、14、28

D、0、7、21（或28）（正确答案）

35 .如果被已经接种过动物狂犬病疫苗的犬咬伤，还需要接种狂犬疫苗吗？

A、不需要了

B、由于很难判断该动物是否感染有狂犬病毒，因此仍需及早接种狂犬疫苗（正确答案）

C、等确定该动物是否感染有狂犬病毒，再决定是否接种狂犬疫苗

36 观察致伤犬10天后，如有异常再接种疫苗

37 .若破损皮肤被流浪犬舔舐，则（）。

A、无需进行处置

B、清洗消毒伤口即可

C、立即处理伤口并接种狂犬病疫苗

D、立即处理伤口并注射狂犬病被动免疫制剂，随后接种狂犬病疫苗

(正确答案)

38 .2023 版处置规范全程免疫后半年到 1 年内再次暴露者，则
()。

A、不需要再次免疫

B、于 0 和 3 天各接种 1 剂疫苗 (正确答案)

C、于 0、3、7 天各接种 1 剂疫苗

D、应当全程接种疫苗

39 . 全程免疫后 1-3 年内再次暴露者，则 ()。

A、不需要再次免疫

B、于 0 和 3 天各接种 1 剂疫苗 (正确答案)

C、于 0、3、7 天各接种 1 剂疫苗

D、应当全程接种疫苗

40 . 犬伤后的狂犬病疫苗接种的注射量参照 ()。

A、伤者体重

B、伤者年龄

C、伤者受伤程度

D、接种程序（正确答案）

41 . 犬伤后如不能确定此犬的健康状况，对已暴露数月而一直未接种狂犬病疫苗者（）。

A、按照暴露后接种程序接种疫苗（正确答案）

B、无需处理

C、缩短针次间隔完成接种

D)、按暴露前免疫进行接种

42 . 下列哪个不是暴露前狂犬病疫苗使用的禁忌症？ 0

A、近期需要接种流感疫苗者（正确答案）

B、妊娠妇女

C、对该种狂犬病疫苗过敏者

D、慢性疾病急性发作期

43 . 狂犬病病毒属于 0

A、弹状病毒科（正确答案）

B、副粘病毒科

C、布尼亚病毒科

D、黄病毒科

44 . 以下应当进行暴露前免疫的人群哪项是错误的？ 0

A、家中养宠物者

B、兽医

C、接触狂犬病病人的工作人员

D、以上人群都不是（正确答案）

45 . 接种疫苗使机体产生抗相应疾病的免疫力，属于（）。

A、自然被动免疫

B、人工主动免疫（正确答案）

C、人工被动免疫

D、自然主动免疫

46 . 关于犬伤门诊人员上岗要求正确的是 0

A、新上岗人员取得培训合格证后可以上岗，以后每年必须复训一次
（正确答案）

B、所有上岗人员只需参加一次培训，合格后不需再参加培训

C、新上岗人员取得培训合格证后可以直接上岗，无须再参加复训了

D、所有上岗人员只需二年培训一次

47 .关于狂犬病的潜伏期说法正确的是（）。

A、长短不一，狂犬病的潜伏期一般在三个月以内，多数病例的潜伏期集中在 20~90 天. 超过一年的虽有报道, 但较为罕见（正确答案）

B、较长，可以超过一年

C、随时可能发病，时间不定

D、半年左右

48 .如患者接种疫苗的某一针次延迟注射，其后续针次接种时间应当（）

A、仍按原免疫接种时间注射

B、按延迟后的原免疫程序间隔时间顺延（正确答案）

C、缩短针次间隔完成接种

D、按接种程序重新接种

49 .犬伤患者判定为 HI 级暴露者后，应当（）。

A、先注射疫苗，再注射被动免疫制剂

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/796202113053010105>