

## 急诊科试题及答案

### 一、 单选题

- 1、 急诊科抢救、治疗与护理工作的直接实施者是( C )  
A 急诊医生 B 护士长和护士 C 急诊护士  
D 急诊科室主任 E 以上均不是
- 2、 急救医疗单元的抢救仪器维护时间一般是( A )  
A 每天 B 每月 C 每班 D 每周 E 以上均是
- 3、 急诊护士应具有良好的职业道德中最关键的是( B )  
A 运用护理伦理学  
B 树立“时间就是生命”的观念  
C 责任感 D 同情心 E 慎独精神
- 4、 一位急诊创伤患者同时出现下列病情，你先抢救那一项( A )  
A 窒息 B 昏迷 C 骨折  
D 心律失常 E 伤口出血
- 5、 头痛呕吐昏迷伴偏瘫可见于( B )  
A 休克 B 脑出血 C 药物中毒  
D 癫痫 E 以上均不是
- 6、 随意运动小、对外界事物及声光等刺激物反应，但瞳孔对光反射存在，生命体征尚平稳，此为( C )  
A 嗜睡 B 昏睡 C 浅昏迷  
D 深昏迷 E 以上均不是
- 7、 护士在执业活动中，发现患者病情危急未及时通知医生，泄露患者隐私等情形之一的情节严重者，可以处以暂停( A ) 的活动。  
A 6个月~1年 B 3~6个月 C 1~2年 D 6~9个月

8、急诊观察时间一般不超过多长时间( C )

A 1 天 B 2 天 C 3 天 D 4 天 E 5 天

9、二级医院的抢救成功率应该达到( E )

A≥95% B≥90% C≥85% D≥65% E≥75%

10、对新发现的病例和 HIV 阳性者要尽快向当地卫生防疫机构报告( B )

A 农村 6h 内 B 农村 12h 内 C 城镇 4h 内 D 城镇 8h 内 E 城镇 12h 内

11、血氧饱和度传感器每( B ) 更换测量部位，并注意观察局部皮肤血运。

A 1h B 2h C 3h D 4h E 5h

12、医疗事故的主体下列哪项不是( C )

A 医生 B 护士 C 患者 D 医疗机构

13、判断心搏骤停患者的循环主要触摸颈动脉搏动，1 岁以下的婴儿触摸( D )

A 颈动脉 B 桡动脉 C 股动脉

D 肱动脉 E 腕动脉

14、成人心肺复苏时胸外按压的深度为( D )

A 1~2cm B 2~3cm C 4~5cm D >5cm

15、判断有无呼吸要在( B ) 内完成

A 5s B 10s C 15s D 20s E 25s

16、单向波形电除颤时，不管是首次还是连续除颤电能量选择应是( D )

A 100J B 200J C 120~200J

D 360J E 200~360J

17、心肺复苏时，以下哪项不是有效指征( B )

A 颈动脉或肱动脉搏动恢复 B 瞳孔散大

C 收缩压 $\geq$ 60mmHg      D 自主呼吸

E 有知觉反射、呻吟

18、双人实行胸外按压时，当按压者疲劳时，两人可相互交换，交换时间不超过(A )

A 5s    B 10s    C 2s    D 3s    E 4s

19、心搏停止( C )后，瞳孔散大，同时呼吸可停止，大脑细胞可发生不可逆损害

A 2~3min    B 4~5min    C 4~6min    D 5~6min

20、使用复苏囊辅助呼吸时，吸与呼之比为( B )

A 1:1    B 1:2    C 2:3    D 5:2

21、Bp 与 cvp 同时上升时的处理原则是( B )

A 补充血容量

B 使用血管扩张剂或利尿剂

C 使用强心利尿剂

D 使用强心升压药，少量输血

E 使用强心利尿剂、手术解除心包填塞

22、安放心电监护仪的导联时，RA 应该安放在( A )

A 锁骨下，靠近右肩    B 锁骨下，靠近左肩

C 右下腹      D 左下腹    E 胸壁上

23、二氧化碳分压的正常值是( A )

A 35~45mmHg    B 40~50mmHg    C 5~10ml/kg    D 50~60mmHg    E 35~45mH2O

24、颅内压升高时，呼吸( D )

A 浅而快    B 潮式呼吸    C 浅而慢

D 深而慢    E 点头呼吸

25、高流量给氧，是指氧浓度( C )

A >30%    B 30%~60%    C >60%    D >80%

26、氧气筒内氧气筒不可用尽，压力表上指针将至( A ) 时，即不可再用，防止灰尘入筒内。

A 5kg/cm<sup>2</sup>    B 3kg/cm<sup>2</sup>    C 8kg/cm<sup>2</sup>    D 6kg/cm<sup>2</sup>

27、呼吸机调节呼吸频率成人为( D ) ；新生儿为( A )

A 40~50 次/分                      B 30~40 次/分

C 20~30 次/分                      D 16~20 次/分

28、洗胃液的温度要适宜，最好水温为( D ) ，不能过热或过凉

A 38°C~40°C                      B 35°C~38°C

C 25°C~28°C                      D 36°C~37°C

29、电除颤时，胸骨电极（左手持）应放在患者( B )

A 左腋前线内侧第 5 肋间（心尖区）

B 右锁骨下，胸骨右缘第 2~3 肋间

C 左腋前线内侧第 2~3 肋间

D 右锁骨下，胸骨右缘第 2~3 肋间

30、面罩给氧时，氧流量宜( D )

A 1~2L/分    B 2~4L/分    C 4~6L/分    D 5~8L/分

31、长期使用呼吸机的患者，应( C ) 更换呼吸机管道，按程序消毒

A 12~24h    B 6~12h    C 24~48h    D 48~72h

32、下列那一项不是休克按病因分类类型( D )

A 低血容量性休克    B 感染性休克

C 心源性休克    D 低动力型休克    E 过敏性休克

33、实质性器官如肝、脾破裂出血表现为( C )

A 灼伤痛 B 触摸痛 C 剧烈疼痛

D 切割痛 E 牵拉痛

34、治疗癫痫持续状态的首选药物是(D )

A 苯妥英钠 B 巴比妥类 C 利多卡因

D 地西洋 E 高渗脱水剂

35、深而快的规律性呼吸常见于糖尿病酸中毒，常带有(D)

A 腐臭味 B 大蒜臭味 C 肝臭味

D 烂苹果味 E 铁锈味

36、下消化道出血常见的原因(A )

A 大肠息肉和大肠肿瘤 B 肠道炎症性疾病

C 血管病变 D 肛管病变

37、急性上消化道大出血通常指一次出血量(C )

A >500ml B >800ml C >1000ml D >600ml

38、患者头晕、头痛、恶心、呕吐，视力模糊、颜面潮红，口唇呈樱桃红色，为(B)中毒

A 乙醇 B 一氧化碳 C 有机磷中毒

D 有机磷农药 E 巴比妥类

39、下列何种毒物中毒时不宜吸氧，因其会加速肺纤维化(B )

A 鱼胆中毒 B 百草枯中毒

C 毒蕈中毒 D 一氧化碳中毒

40、现场急救电击伤最首要的措施是(C )

A 建立静脉通路 B 心肺复苏 C 切断电源 D 抗休克治疗 E 处理烧伤创面

41、口服毒物中毒者(B)内均应洗胃

A 4h B 6h C 8h D 5h E 10h

42、热痉挛时，肌痉挛和收缩疼痛的哪部分最具特征( E )

A 腹肌 B 背部肌肉 C 肛门括约肌

D 肱二头肌 E 腓肠肌

43、脑复苏时为确保降温效果，将脑温控制在( A )

A 32°C~33°C B 30°C~32°C

C 25°C~28°C D 28°C~30°C

44、中暑中最严重的类型是( C )

A 先兆中暑 B 轻症中暑 C 热射病

D 热痉挛 E 热衰竭

45、烧伤后创面渗出速度以( A ) 内为最快

A 6~8h B 36~48h C 24h D 48h E 72h

46、急性重症胰腺炎最常见的诱发因素是( B )

A 暴饮暴食 B 胆道梗阻 C 代谢因素

D 创伤 E 急性感染

47、急性重症胰腺炎临床最主要症状表现为( A )

A 腹痛 B 呕吐 C 发热 D 黄疸 E 休克

48、急性心肌梗死最先出现的突出症状为( B )

A 心律失常 B 胸痛 C 发热

D 休克 E 胃肠道症状

49、II型呼吸衰竭的氧疗原则( E )

A 低浓度给氧 B 低浓度间歇给氧

C 高浓度持续给氧 D 较高浓度 (>35%) 给氧

E 低浓度 (<35%) 给氧

50、氨茶碱不良反应下列哪项不是( A )

A 发热      B 恶心      C 心动过速

D 血压下降      E 抽搐

51、高血压危象，首选降压药物为(B )

A 硝酸甘油      B 硝普钠

C 尼群地平      D 卡托普利

52、某男，被汽车撞伤 30 分钟后 入院，神志清，血压 140/90mmHg，诊断骨盆骨折，右股骨骨折，据此可确定他属于 (C )

A 多处伤    B 联合伤    C 多发伤    D 复合伤

53、多发伤员出现下列情况，应首先抢救(A )

A 张力性气胸      B 休克

C 四肢开放性骨折      D 昏迷

54、对于创伤伤员的伤口处理原则，不正确的是(C )

A 伤口内的异物不能随意除去

B 创面中外露的骨折端不能回纳

C 清创要仔细、小心擦去血凝块

D 骨折要临时固定

55、一男性患者，因车祸致腹部损伤，该患者立即出现休克，腹穿抽出不凝血，应首先考虑( A )

A 脾损伤      B 肝损伤      C 肾损伤

D 胰腺损伤    E 胃肠损伤

56、急性下消化道大出血指一次性出血量( B )

A >600ml    B >450ml    C >800ml    D >1000ml

57、消化道大出血患者，24h 内右旋糖酐用量不宜超过( B )

A 500ml    B 1000ml    C 1500ml    D 2000ml

58、导致糖尿病酮症酸中毒最常见的诱发因素是( A )

A 各种感染

B 胰岛素计量不足或中断

C 各种急性应激状态

D 胃肠功能失调或疾患

E 药物使用，如：糖皮质激素、生长激素

59、糖尿病酮症酸中毒的患者，当血糖( C ) 时，提示有肾功能损害。

A >11.1mmol/L      B >13.9mmol/L

C >33.3mmol/L      D >28.9mmol/L

60、糖尿病酮症酸中毒患者，若无心脏禁忌，在入院 1~1.5h 内应输 0.9%NS( B )

A 500ml    B 1000~2000ml    C 2000~3000ml

D 3000ml 以上

61、止血带止血时，止血带的标准压力，上肢为( )，下肢为( B )

A 300~400mmHg, 400~500mmHg

B 250~300mmHg, 400~500mmHg

C 200~300mmHg, 300~400mmHg

D 300~500mmHg, 500~600mmHg

62、使用止血带止血时要定时放松，应每隔( ) 放松一次，放松时可用手压迫出血点上部血管临时止血，每次松开( C )

A 1h, 2~3min      B 2h, 2~3min

C 30-60min, 1-2min      D 3h, 3~4min

63、患者发生严重失血性休克时，说明患者的失血量( C )

A ≤10% (约 400ml)      B ≥20% (约 800ml)



C ≥30% (约 1200ml) D ≥50%

64、成批伤员的检伤分类及标记：病人意识丧失，颈动脉搏动消失，心跳呼吸停止，瞳孔散大应标记(D )

A 红色 B 黄色 C 绿色 D 黑色

65、美曲磷酯及敌百虫中毒者应忌用的洗胃溶液是(B )

A 高锰酸钾 B 碳酸氢钠 C 牛奶 D 生理盐水

66、一氧化碳中毒患者损伤的靶器官是(C )

A 心脏 B 肝脏 C 脑 D 肺 E 肾

67、颅内压增高最早最主要的症状( A )

A 头痛 B 呕吐 C 视神经盘水肿

D 意识及精神障碍

68、脑室引流时应控制脑脊液引流量每日不超过(B )为宜

A 300ml B 500ml C 800ml D 1000ml

69、脑室引流时引流袋最高处距侧脑室的距离约(B )

A 5~10cm B 10~15cm C 15~20cm

D 20~30cm

70、正常瞳孔直径为(A )

A 2.5~4mm B 2~3cm C 4~5cm D 3~4cm

71、程度最浅的一种意识障碍，患者经常处于睡眠状态，唤醒后定向力基本完整，但注意力不集中，记忆力差，如不继续回答，很快又入睡(B )

A 昏睡 B 嗜睡 C 浅昏迷

D 中昏迷 E 深昏迷

72、多器官功能障碍的最常见病因为( C )

A 严重心衰 B 消化道大出血 C 严重感染

D 创伤      E 出血坏死性胰腺炎

73、诱发心力衰竭最常见、最重要的原因是( C )

A 心律失常    B 血容量增加    C 呼吸道感染    D 过劳      E 情绪激动

74、为肝性脑病患者灌肠禁忌使用( D )

A 生理盐水    B 弱酸溶液    C 乳果糖溶液

D 肥皂水      E 以上都不是

75、硝普钠在应用过程中，液体配制多长时间无论是否用完都需更换(B )

A 2~4h    B 6~8h    C 8~10h    D 10~12h    E 24h

76、急性心肺功能不全患者应取(A )

A 端坐位      B 仰卧屈膝位    C 截石位

D 侧卧位      E 去枕平卧位

77、少尿是指患者 24h 尿量( C )

A < 200ml    B <300ml    C <400ml    D <600ml

78、诊断呼吸衰竭最主要的化验指标是( A )

A 动脉  $PaO_2 < 60$ ,  $paco_2 = > 50$ mmHg

B 标准碳酸氢盐增高

C 二氧化碳结合力下降

D 血液 PH 值降低

E 血钾增高，血氯增高

79、胸腔闭式引流时，引流瓶必须置于身体水平位以下，引流瓶液面距离引流管出口位置( C )

A 20~30cm    B 30~40cm    C 40~60cm    D 50~70cm

80、腹部损伤后的主要症状( D )

A 腹胀    B 恶心、呕吐    C 腹膜刺激征

D 腹痛 E 腹腔内出血

81、护患关系初始期的主要任务是(C )

A 收集[资料](#) B 书写护理病历 C 建立信任关系 D 了解患者情况

82、交通事故现场急救有序原则不正确的是(D )

A 先抢后救 B 先重后轻 C 先急后缓

D 先远后近

83、将传染病患者或病原携带者安置在指定地方进行隔离，其中结核菌隔离用( )，呼吸道隔离用(A )

A 灰色，蓝色 B 红色，橙色

C 黄色，棕色 D 蓝色，红色

84、洗胃每次灌洗量为( C )

A 100~200ml B 200~300ml C 300~500ml D 500~800ml

85、洗胃原则下列哪项不正确(B )

A 快进快出 B 先入后出 C 出入量基本相等

D 反复洗胃，直到水清无味

86、淋病、肺结核、艾滋病、疟疾属于哪一类传染病( C )

A 甲类 B 丙类 C 乙类 D II类 E III类

87、交通事故现场急救处理原则(E )

A 人道原则 B 快速原则 C 有序原则

D 自救原则 E 以上均是

88、严重出血，严重头、颈、胸、腹部创伤的危重伤患者现场分检后，标识用(B )

A 黄色 B 红色 C 白色 D 黑色 E 蓝色

89、腐蚀性毒物如酸、碱等沾染皮肤及眼内，应立即用大量清水冲洗至少(D )

A 20min B 30min C 10min D 5min E 1h

90、眼球固定提示( E )

A 脑桥病变 B 大脑半球病变

C 松果体附近病变 D 小脑病变

E 脑干广泛病变

91、腹穿初次放腹水不宜超过( C )

A 800ml B 1000ml C 3000ml D 2000ml

92、腰椎穿刺患者术后需去枕平卧( C )，( )后方可下床

A 12h,24h B 2h,8h C 6h,24h D 8h,12h

93、挤压呼吸囊时，压力不可过大，挤压呼吸囊的( A )为宜

A  $1/3\sim 2/3$  B  $1/3\sim 1/2$  C  $1/2\sim 2/3$  D  $1/4\sim 3/4$

94、口对口人工呼吸的频率应为( B )

A 16~20 次/分 B 10~12 次/分

C 20~25 次/分 D 12~18 次/分

95、在静脉滴注去甲肾上腺素发生外漏时，可将哪种药稀释后作皮下浸润封闭( C )

A 胺碘酮 B 阿拉明 C 酚妥拉明 D 硝普钠

96、主要用于治疗尿崩症、肺出血、上消化道出血以及引产的药是( A )

A 垂体后叶素 B 阿托品 C 胺碘酮 D 呋塞米

97、输卵管妊娠流产或破裂时患者表现为( A )

A 突发腹部撕裂样疼痛

B 突发性进行性呼吸困难

C 皮下瘀斑

D 呼吸中有酮味或烂苹果味

E 突发中上腹部偏左剧痛

98、若舒张压高于( B ) 和 (或) 收缩压高于( )，无论有无症状都应视为高血压危象

A 120~130mmHg;200mmHg

B 140~150mmHg;220mmHg

C 100~120mmHg;180mmHg

D 90~100mmHg;180mmHg

99、高热指体温( B )

A 38.1°C~39°C      B 39.1°C~41°C

C 39.1°C~40°C      D 41°C以上

100、急诊环节发生的医疗纠纷，占全部医疗纠纷的( B )

A 10%      B 40%以上      C 很少      D 80%

E 以上均不是

101、急性溶血时处理错误的是( D )

A 停止输血    B 重做血型鉴定    C 给予碳酸氢钠    D 双肾区冰敷    E 双侧腰部封闭

102、从血库中取出的温度较低的血液应在室温下放置( C ) 分钟后再输入

A 5~10min      B 10~15min      C 15~20min

D 20~30min      E 30~60min

103、血液输完后，空血袋的处理正确的是( C )

A 立即丢弃    B 室温中保存 24h

C 4°C左右冰箱中保存 24h

D 室温中保存 48h

E 4°C左右冰箱中保存 12h

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/797001116165006036>