

护理学基础模拟习题及参考答案

一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1、某医院门诊患者肝功能检查报告：血清转氨酶升高，同时患者主诉肝区隐痛，恶心，呕吐，等症状，护士应立即（ ）

- A、测量患者生命体征
- B、转入隔离门诊诊治
- C、转急诊室处理
- D、进行健康教育
- E、安排提前就诊

正确答案：B

2、股静脉注射操作哪项不妥：

- A、病人取仰卧位、下肢伸直略外展
- B、常规消毒局部皮肤并消毒术者左手示指和拇指
- C、在腹股沟中 1/3 交界处，左手示指触及动脉搏动最明显部位，在其外侧 0、5cm 处垂直刺入
- D、抽动活塞见暗红色回血，可注入药物

正确答案：C

3、患者陈先生，50 岁，因意外事故导致颈椎骨折，右侧面部擦伤，失血约 1200ml，经及时抢救，现已病情稳定，今日已行颅骨牵引治疗。采取此卧位的姿势为（ ）

- A、床头用支托物垫高 15-30cm，床尾垫高 10-20cm
- B、床头用支托物垫高 10-20cm，床尾垫高 15-30cm
- C、床头用支托物垫高 15-30cm，床尾不变
- D、床头不变，床尾用支托物垫高 15-30cm
- E、床头与床尾各用支托物垫高 15-30cm

正确答案：C

4、稀化痰液，帮助排痰的药物是什么：

- A、氨茶碱
- B、a- 糜蛋白酶
- C、庆大霉素
- D、地塞米松

正确答案：B

5、输血致过敏反应的处理，错误的是

- A、轻者可减慢滴速

- B、重者立即停止输血
- C、呼吸困难者给予吸氧
- D、注射抗过敏药物
- E、必要时可行气管切开

正确答案：A

6、患者,23岁,男性,因腹泻入院,诊断为阿米巴痢疾。为该患者灌肠时应采取的卧位是()

- A、膝胸卧位
- B、俯卧位
- C、左侧卧位
- D、右侧卧位
- E、仰卧位

正确答案：D

7、张某,男,36岁,因车祸内脏破裂大出血而欲行急诊手术治疗。去手术室之前,护士遵医嘱迅速为患者建立了一个静脉通道并行输血治疗。因时间紧迫,护士从血库取回血后,为了尽早将血输给患者,便将血袋放在热水中提温,5分钟后便给患者输入。当输入10分钟后,患者感到头部胀痛,并出现恶心呕吐,腰背部剧痛。接下来,当大量血红蛋白进入血浆后,此患者将出现的特征性表现是()

- A、四肢麻木
- B、黄疸和血红蛋白尿
- C、面部潮红
- D、心前区压迫感
- E、血压下降

正确答案：B

8、患者李某,男,25岁,身高170cm,体重75kg,从高处坠落,腰椎骨折收入院,须立即手术。住院处护士首先应

- A、紧急给予卫生处置
- B、护送患者入病房
- C、确定患者的护理问题
- D、协助办理住院手续
- E、通知负责医生

正确答案：B

9、患者男性,35岁。急性肠梗阻住院行手术治疗,术后给予抗感染、补

液支持治疗，日输液量约 1500ml，今晨输液过程中突然出现胸闷，随之呼吸困难、严重发绀，听诊心前区可闻及响亮、持续的“水泡声”。此时患者宜采取的体位是()

- A、左侧头低足高卧位
- B、右侧头高足低卧位
- C、端坐位,双腿下垂
- D、左侧头高足低卧位
- E、右侧头低足高卧位

正确答案：A

10、患者,女性,83岁,因心绞痛入院治疗。入院5天以来未排便。护士为其进行便秘方面的健康教育下列哪项是错误的()

- A、摄入足够的水分
- B、每日定时解便一次
- C、每晚睡前使用开塞露
- D、多食蔬菜、水果和粗粮
- E、适当翻身或下床活动

正确答案：C

11、进行尸体料理哪项不妥：

- A、放低头部
- B、合上眼睑
- C、填塞孔道
- D、擦净尸体

正确答案：A

12、最严重的输血反应是什么：

- A、血管外溶血
- B、发热反应
- C、血管内溶血
- D、过敏反应

正确答案：C

13、患者男,35岁,因“头部外伤”急诊入院。浅昏迷,CT提示颅内血肿,脑挫裂伤,行全血肿清除术。患者术后返回病房,正确的体位是()

- A、侧卧位
- B、去枕仰卧位,头偏向一侧
- C、头高足低位

D、头低足高位

E、中凹卧位

正确答案：B

14、过敏反应发生应立停止输液，皮下或静注以下哪种溶液

A、1:1000 的正肾 1-2ml

B、1:2000 的正肾 0.5-1ml

C、1:2000 的副肾 1-2ml

D、1:10000 的副肾 0.5-1ml

正确答案：D

15、为防止过敏反应、献血者在采血前多长时间禁食：

A、8h

B、4h

C、6h

D、12h

正确答案：B

16、张女士，72 岁，因心肌梗死入院，护士为该患者调控医院物理环境。适宜的病室色调是

A、紫色

B、奶色

C、橙色

D、黑色

E、红色

正确答案：B

17、直接输血抽 60ml 血前应先准备好的注射器中抽枸橼酸钠多少 ml:

A、5ml

B、4ml

C、6ml

D、3ml

正确答案：C

18、判断心肺复苏是否有效的指标，不正确的一项是()

A、有呼吸动作

B、瞳孔缩小

C、面色转红

D、大动脉出现搏动

E、血压恢复正常

正确答案：E

19、患者王某,女,68岁,以呼吸困难、嘴唇发绀、烦躁不安而急诊入院,入院诊断为风湿性心脏病合并心力衰竭。为了缓解症状,患者应采用的体位是()

A、抬高床头 15° - 20°

B、抬高床头 70° - 80° ,膝下支架抬起 15° - 20°

C、抬高床头 20° ,抬高下肢 30°

D、去枕仰卧位,头偏向一侧

E、抬高床头 60° - 70° ,右侧卧位

正确答案：B

20、护理小李在记录体温单,以下记录方法正确的是()

A、底栏可以填写手术后日数

B、 40 - 42°C 栏内蓝钢笔纵行书写入院时间

C、总结24小时出入量后记录于体温单底栏内

D、底栏一律用蓝钢笔书写,注明计量单位

E、眉栏各项用红笔填写

正确答案：C

21、库存红细胞平均每天损害率是多少:

A、1%

B、0.5%

C、2%

D、1.5%

正确答案：A

22、血液病患者最适宜输入

A、库存血

B、白蛋白

C、血浆

D、新鲜血

E、水解蛋白

正确答案：D

23、肌肉注射引起硬结的主要原因是:

A、针头细小、进针深度不够

B、同时注射多种药物

- C、病人肥胖
- D、未做到一慢

正确答案：A

24、患者,女性,21岁,因再生障碍性贫血入院。根据医嘱患者须长时间静脉输入抗胸腺细胞球蛋白治疗,护士为其采用静脉留置针输液治疗。请问留置针输液一般可保留()

- A、168-240h
- B、72-96h
- C、120-168h
- D、48-72h
- E、24-48h

正确答案：B

25、濒死期病员的心理变化最先一般表现为:

- A、否认期
- B、协议期
- C、接受期
- D、愤怒期

正确答案：A

26、有关皮肤过敏试验时,下列哪项是正确的:

- A、注射后可让病人散步 20min 返回观察反应
- B、疑似阴性可用原液重做
- C、皮试部位可取前臂掌侧上段
- D、配皮试液应有固定的溶液

正确答案：D

27、张某,男,36岁,因车祸内脏破裂大出血而欲行急诊手术治疗。去手术室之前,护士遵医嘱迅速为患者建立了一个静脉通道并行输血治疗。因时间紧迫,护士从血库取回血后,为了尽早将血输给患者,便将血袋放在热水中提温,5分钟后便给患者输入。当输入10分钟后,患者感到头部胀痛,并出现恶心呕吐,腰背部剧痛。发生此反应时,护士首选的护理措施是()

- A、静脉注射碳酸氢钠
- B、将剩余血送检,重做血型鉴定和交叉配血试验
- C、停止输血
- D、通知医生

E、吸氧

正确答案：C

28、刘护士,23岁,在肿瘤科病房工作,某日为患者配制化疗药物。为了防止药物外溅,其预防措施不正确的是()

- A、抽取药液时,用针腔较大的针头
- B、稀释瓶装药物时,应插入双针头
- C、将溶媒沿瓶壁缓慢注入瓶底
- D、待药粉被溶媒浸透后再晃动药瓶
- E、抽取瓶装药物时,所抽药液以超过注射器 3/4 为宜

正确答案：E

29、患者男性,关节扭伤 30 分钟来院就诊,经过 X 片检查未发现骨折等现象,医生诊断组织损伤,医生嘱其冷疗。使用冷疗时应注意的是()

- A、受敷部位涂凡士林
- B、冷疗过程中注意观察局部皮肤情况
- C、每 3-5 分钟更换一次敷布
- D、持续冷敷 15-20 分钟
- E、以上都是

正确答案：E

30、为预防压疮可选用哪种溶液局部按摩

- A、75%乙醇
- B、0.5%过氧乙酸
- C、0.1%醋酸
- D、50%乙醇

正确答案：D

31、[单选题]患者仰卧,枕头横立于床尾,床头垫高 15~30cm。此卧位适用于()

- A、急性肺水肿患者
- B、胆汁引流
- C、脑水肿患者
- D、胎膜早破患者
- E、胫骨牵引

正确答案：C

32、使用超声雾化吸入器时,什么时候毋需停机:

- A、药液不足时

- B、水量不足时
- C、水温高于 50℃时
- D、水温超过 60℃时

正确答案：A

33、颈外静脉穿刺的正确部位是

- A、下颌角与锁骨上缘中点连线的上 1/3 处
- B、下颌角与锁骨下缘中点连线的上 1/2 处
- C、下颌角与锁骨上缘中点连线的下 1/3 处
- D、下颌角与锁骨下缘中点连线的上 1/3 处
- E、下颌角与锁骨上缘中点连线的上 1/2 处

正确答案：A

34、白血病患者，在输血后期出现皮肤瘙痒，眼睑、口唇水肿，继而发生呼吸困难，听诊两肺满布哮鸣音。临床为预防此类反应的发生，要求献血员在采血前 4 小时内禁食（ ）

- A、高蛋白和高脂肪食物
- B、高糖和高蛋白食物
- C、高脂肪和高纤维素食物
- D、高糖和高脂肪食物
- E、高蛋白和高纤维素食物

正确答案：A

35、股静脉穿刺部位在股三角区位于：

- A、股神经和股动脉之间
- B、股动脉内侧
- C、股动脉外侧
- D、股神经内侧

正确答案：B

36、某患者在输液 1 个小时的时候，突然发现呼吸困难，咳粉红色泡沫样痰。患者发生了（ ）

- A、发热反应
- B、过敏反应
- C、循环负荷过重
- D、静脉炎
- E、空气栓塞

正确答案：C

37、患者,男,35岁,车祸后昏迷5天。需鼻饲饮食以维持其营养需要。鼻饲时的注意事项中下列哪项不妥()

- A、药片应研碎溶解后再注入
- B、新鲜果汁与奶液应分别注入
- C、每次鼻饲前应用少量温水冲管后再进行喂食
- D、间隔时间应大于4小时
- E、每次鼻饲量不超过200ml

正确答案: D

38、抢救青霉素过敏休克病人时,首选的药物为

- A、异丙肾上腺素
- B、去甲肾上腺素
- C、盐酸去甲肾上腺素
- D、盐酸肾上腺素
- E、盐酸异丙嗪

正确答案: D

39、护士刘某,为一艾滋病患者进行静脉注射,注射完毕后,用双手分离针头和注射器的过程中刺破手指。该护士做法中不正确的是()

- A、向主管部门报告并及时填写锐器伤登记表并进行相应处理
- B、立即进行伤口局部挤压
- C、用肥皂水彻底清洗伤口,并在流动水下反复冲洗
- D、保持镇静
- E、用0.5%碘伏或75%乙醇消毒伤口,并包扎

正确答案: B

40、一截瘫病人长时间仰卧最易产生褥疮的部位是

- A、枕部
- B、骶尾部
- C、肩部
- D、肘部

正确答案: B

41、青霉素引起过敏反应大多数发生于:

- A、身体虚弱时
- B、初次用药
- C、有青霉素接触史
- D、过敏体质人

C

42、库存血的有效保存期:

- A、25-30 天
- B、14-21 天
- C、7-10 天
- D、50-60 天

正确答案: B

43、刘先生,注射青霉素后感到胸闷、气急。护士发现患者面色苍白、冷汗、发绀,血压 60/40mmHg 此时,护士应立即为患者安置()

- A、中凹卧位
- B、头高足低位
- C、头低足高位
- D、半坐卧位
- E、截石位

正确答案: A

44、患者,男,67 岁,因冠心病入院。在静脉输液过程中出现胸闷、呼吸困难、咳粉红色泡沫痰。该患者发生了()

- A、静脉炎
- B、空气栓塞
- C、急性肺水肿
- D、发热反应
- E、过敏反应

正确答案: C

45、雾化吸入的优点不包括哪项:

- A、不良反应轻
- B、奏效快
- C、价钱便宜
- D、药物用量少

正确答案: C

46、患者,男性,25 岁,感觉头晕不适,有发热感,测口温 39.2℃,口服安乃近 0.5g,半小时后,大量出汗,此阶段易出现()

- A、低温
- B、畏寒
- C、虚脱

、皮肤潮红

E、呼吸加快

正确答案：C

47、一般热湿敷的持续时间是

A、20~25min

B、10~15min

C、30~35min

D、25~30min

E、15~20min

正确答案：E

48、肾炎水肿的病人预防压褥疮不宜

A、及时更换潮湿的床单

B、每2h变换1次体位

C、整理床单时不拖拉病人

D、骨突出处垫橡皮圈

正确答案：D

49、颈外静脉穿刺时，病人应采取何种卧位：

A、侧卧位

B、去枕平卧

C、头低足高

D、半坐卧位

正确答案：B

50、使用青霉素正确的方法是：

A、青霉素外用时可不做过敏试验

B、试验结果阴性者，今后再用时可免做过敏试验

C、注射之前应做好急救的准备工作

D、青霉素过敏者再次用药时须重做过敏试验

正确答案：C

51、为口腔铜绿假单胞菌感染的患者进行口腔护理时，可选用的漱口液是
()

A、0.1%醋酸溶液

B、2%~3%硼酸溶液

C、1%~4%碳酸氢钠溶液

D、1%~3%过氧化氢溶液

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/797113135032010005>