

2024 年公共卫生与预防医学题库

第一部分 单选题(300 题)

- 1、WHO 认为医院监测的最终目标是【单选题】——
- A. 为了减少医院感染和由此所造成的损失
 - B. 降低医院感染率,减少获得医院感染的危险因素
 - C. 建立医院的医院感染发病率基线
 - D. 利用调查资料说服医务人员遵守感染控制规范与指南 评
价效果,调整和修改感染控制规范

【答案】: A

- 2、下排气式灭菌器灭菌包体积不应大于【单选题】——
- A. 30cm×30cm×20cm
 - B. 30cm×30cm×40cm
 - C. 30cm×40cm×30cm
 - D. 30cm×30cm×25cm 20cm×30cm×40cm

【答案】: D

- 3、下列抗菌药物中哪一种为窄谱抗菌药【单选题】——
- A. 万古霉素
 - B. 阿米卡星
 - C. 阿奇霉素
 - D. 磷霉素 环丙沙星

【答案】: A

- 4、SARS 传播最重要的途径是【单选题】——
- A. 接触传播
 - B. 飞沫传播
 - C. 气溶胶传播
 - D. 血液-体液传播 空气传播

【答案】: B

5、怀疑医院感染病例取标本进行病原体检查时不正确的是【单选题】——

- A. 采集标本后及时送检
- B. 收到标本后及时检查
- C. 尽可能做到涂片检查与病原体培养相结合
- D. 为节约经费,在抗感染治疗效果不佳时取标本做病原体检查
在使用抗菌药物前送标本

【答案】：D

6、肠道隔离的要求哪项不对【单选题】——

- A. 患者尽可能住隔离室,相同疾病可居一室
- B. 接触感染物时戴手套,若容易污染衣服时穿隔离衣,不需戴口罩
- C. 接触患者及污染物后,护理另一患者前要洗手
- D. 被粪便污染的物品要先清洗再送消毒处理 探视者进入隔离室前应通知值班护士

【答案】：D

7、根据《综合医院建筑标准》有关的卫生学标准及预防医院感染的要求,对医院的改建、扩建和新建,提出建设性意见【单选题】——

- A. 卫生部医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：C

8、下列消毒剂中哪一种不能达到灭菌水平【单选题】——

- A. 甲醛
- B. 戊二醛
- C. 含氯消毒剂
- D. 环氧乙烷 过氧化氢

【答案】：C

9、下列消毒剂中哪一种为高效消毒剂【单选题】——

- A. 聚维铜碘
- B. 碘酊
- C. 乙醇
- D. 含氯消毒剂 酚类消毒剂

【答案】：D

10、III类区域工作人员卫生手及物体表面的合格标准为【单选题】——

- A. 细菌总数 $\leq 20\text{cfu}/\text{cm}^2$, 未检出致病菌
- B. 细菌总数 $\leq 25\text{cfu}/\text{cm}^2$, 未检出致病菌
- C. 细菌总数 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$, 未检出致病菌
- D. 细菌总数 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$, 未检出致病菌 细菌总数 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$, 未检出致病菌

【答案】：C

11、内镜室的医院感染管理,下列哪项错误【单选题】——

- A. 内镜室应设检查区和清洗消毒区
- B. 病人进行检查前必须先做肝功能、HBV、HCV等标记物检查
- C. 需要隔离者留于最后作检查
- D. 每例内镜使用后应用高效消毒剂进行消毒处理,每天工作结束后对内镜进行终末消毒 每天清洗消毒容器

【答案】：C

12、从医疗护理角度讲戴手套的作用不正确的是【单选题】——

- A. 手套可减少患者身上的微生物传播给医务人员的可能性
- B. 手套可以防止医务人员把自身手上的菌群转移给患者的可能性
- C. 手套可以防止医务人员成为传播微生物的媒介
- D. 手套可以防止医务人员将从患者或环境中污染的病原在人群中传播 戴手套后可以不必洗手

【答案】：E

13、预防免疫功能低下病人发生医院内感染,下述哪项是不正确的【单选题】——

- A. 注射相关疫苗
- B. 全身使用广谱抗生素预防感染
- C. 治疗局部感染病灶
- D. 保护性隔离 保护皮肤黏膜的完整性

【答案】： B

14、为阳离子表面活性剂,对阴离子表面活性剂有拮抗作用的是【单选题】——

- A. 乙醇
- B. 甲醛
- C. 苯扎溴铵
- D. 过氧乙酸 纯乳酸

【答案】： C

15、手术室的医院感染管理错误的是【单选题】——

- A. 手术器具及物品能压力蒸汽灭菌的应避免使用化学灭菌剂浸泡灭菌
- B. 洗手刷应一用一灭菌
- C. 隔离手术间应远离手术室入口处
- D. 隔离病人手术术后器械及物品双消毒 手术室必须湿式清洁

【答案】： C

16、一次性使用无菌医疗用品用后的处理正确的是【单选题】——

- A. 进行消毒、毁形、进行无害化处理
- B. 经消毒灭菌后重复使用
- C. 集中管理,统一交废品公司回收利用
- D. 经管理部门统一进行消毒处理后可重复使用 先浸泡,再清洗,然后再进行灭菌处理

【答案】： A

17、下列有关医院感染的管理人员培训要求描述错误的是【单选题】

——

- A. 300 张床位以上的医院设医院感染管理科
- B. 1000 张床位以上的大型医院,医院感染管理专职人员的配备不得少于 10 人
- C. 300 张床位以下的医院,医院感染管理专职人员的配备不少于 1 人
- D. 300 张床位以下的医院应配备医院感染管理专职人员
300-500 张床位的医院,医院感染管理专职人员的配备不得少于 2 人

【答案】： B

18、高效消毒剂【单选题】 ——

- A. 0.5%碘伏
- B. 2%戊二醛
- C. 两者均是
- D. 两者均否

【答案】： B

19、传染病区医务人员使用的隔离衣一般情况下更换时间是【单选题】 ——

- A. 24h
- B. 6h
- C. 48h
- D. 12h 72h

【答案】： A

20、根据我国卫生标准回答以下问题:对本地区的医院内感染管理进行技术指导的应是【单选题】 ——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C.

各级医院的医院感染管理委员会

D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：B

21、卫生部对医院感染有关的检查指标中下列哪项是错误的【单选题】——

A. 医务人员接受医院感染在职教育每年不少于6学时

B. 常规器械消毒合格率应达100%

C. 当证实有医院感染爆发时医院应于48小时内报告当地卫生部门

D. 医院抗生素使用率力争小于50% 一级、二级、三级医院感染率应分别控制在 $\leq 7\%$ 、 $\leq 8\%$ 、 $\leq 10\%$

【答案】：C

22、使用无菌持物钳的方法哪项是错误的【单选题】——

A. 使用时钳端朝下,不得反转向下

B. 到远处夹取物品后立即放回原处

C. 每一容器只能放一把钳子

D. 取、放钳时钳端须闭合 不可夹取油纱布

【答案】：B

23、传染病院应设置在【单选题】——

A. 靠近综合性医院

B. 城市中心

C. 远离公共场所

D. 交通便利的地方 水源充足的地方

【答案】：C

24、黏膜消毒可使用下列哪一种药液【单选题】——

A. 苯扎溴铵(新洁尔灭)

B. 聚维酮碘(碘伏)

C. 乙醇

D. 碘酊 氯己定

【答案】： B

25、引起医院感染的病原微生物主要是【单选题】——

- A. 条件致病菌
- B. 细菌
- C. 弓形体
- D. 衣原体 真菌

【答案】：A

26、一次性使用的注射器使用后正确的做法是【单选题】——

- A. 直接放入耐刺、防渗漏的利器盒
- B. 使用后的一次性针头应重新套上针头套
- C. 使用后用手直接分离针头
- D. 使用后先浸泡再用手直接分离针头 使用后的针头连同注射器丢入医用垃圾桶内处理

【答案】：A

27、下列消毒剂中属高水平消毒剂的有【单选题】——

- A. 戊二醛
- B. 络合碘
- C. 苯扎溴铵
- D. 乙醇 碘酊

【答案】：A

28、儿科病房【单选题】——

- A. $\leq 10 \leq 5 \leq 5$
- B. $\leq 200 \leq 5 \leq 5$
- C. $\leq 500 \leq 10 \leq 10$
- D. $=- \leq 15 \leq 15$

【答案】：C

29、临床科室医院感染管理小组的职责下列哪项错误【单选题】——

- A. 制定本科室医院感染管理规章制度
- B.

监督检查本科室有关医院感染管理的各项工作,对医院感染可疑病例,可能存在感染的环节进行监测,并采取有效防治措施

C. 对医院感染散发病例按要求登记报告,并立即向当地卫生行政机构报告

D. 按要求对疑似或确诊病例留取临床标本,进行细菌学检查和药敏试验
监督检查本科室抗生素使用情况

【答案】： C

30、损伤性废物【单选题】——

A. 使用过的注射针头

B. 带血的敷料

C. 两者均是

D. 两者均否

【答案】： A

31、脊髓灰质炎宜采取【单选题】——

A. 消化道隔离

B. 呼吸道隔离

C. 两者均是

D. 两者均不是

【答案】： C

32、乙型脑炎主要传播媒介是【单选题】——

A. 蚊

B. 虱

C. 螨

D. 鼠 蚤

【答案】： A

33、对怀疑医院内感染的病例取标本进行病原体检查,错误的是【单选题】——

A. 在使用抗菌药物前送标本

- B. 为节约经费,应该在抗感染治疗效果不佳时取标本做病原体检查
- C.

采集标本后及时送检

D. 采集标本时防止污染 接到临床标本后及时正确接种

【答案】： B

34、医疗废物【单选题】——

A. 使用过的注射针头

B. 带血的敷料

C. 两者均是

D. 两者均否

【答案】： C

35、护士上午铺好无菌盘后,因临时有事离开 2 个小时后需使用该无菌盘,其应采取【单选题】——

A. 将原来铺好的重新消毒

B. 另取一个未经消毒的

C. 使用昨天使用过的

D. 使用原来铺好的 使用未使用但经消毒的

【答案】： D

36、对高压蒸汽灭菌效果的监测,最可靠的方法是【单选题】——

A. 化学指示卡法

B. 生物测试法

C. 化学指示管法

D. 化学指示胶带法 留点温度计法

【答案】： B

37、医院感染控制措施中泌尿道感染已证实有效的措施是【单选题】——

A. 全身预防性抗生素的使用

B. 膀胱冲洗或灭菌生理盐水或抗生素冲洗

C. 限制插管时间,插入时的无菌技术,保持密闭引流

D. 引流袋内加入抗菌剂,抗微生物药物包裹的导尿管 每天灭菌

剂清洁会阴

【答案】：C

38、有关抗生素管理下列哪项错误【单选题】——

- A. 把抗菌药物分成一线、二线药物,二线药物应控制使用
- B. 二线药物毒副作用大、价贵、疗效低
- C. 在同类抗生素中应留有替代性药,在必要时再启用
- D. 无药敏结果参考时,可按经验选药原则用药 定期全院菌株的药敏统计结果公布,为临床用药与药剂科进药提供信息

【答案】： B

39、对芽孢无效的化学消毒剂是【单选题】——

- A. 0.5%过氧乙酸溶液
- B. 环氧乙烷
- C. 40%甲醛溶液
- D. 2%戊二醛溶液 70%乙醇溶液

【答案】： E

40、根据我国下列卫生标准回答:进行医院内感染管理的策略研究,为国家提供咨询意见的是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】： A

41、肝炎肠道门诊的管理中下列哪项错误【单选题】——

- A. 诊室、人员、器械、用具固定
- B. 挂号、候诊与普通门诊分开
- C. 肝炎按黄疸和无黄疸进行隔离
- D. 取药、注射、采血、化验与普通病人分开 接触病人后洗手

【答案】： C

42、下列情况不是医院感染【单选题】——

- A.

病人发生的感染是上次住院期间获得的

- B. 有明确潜伏期的感染,自入院时计算起。超过其常见潜伏期而发生的感染
- C. 在原有医院感染的基础上又出现其他部位新的感染(除外脓毒症的迁徙病灶)
- D. 没有明确潜伏期的感染,发生在入院 48 小时以后者 新生儿经胎盘获得的感染

【答案】：E

43、下列哪项不属医院感染【单选题】——

- A. 阑尾穿孔引起的腹膜炎
- B. 入院 72 小时后发生的肺炎
- C. 无症状导管菌尿症
- D. 烧伤 6 小时入院的创面感染 产道分娩吸入阴道分泌物的新生儿肺炎

【答案】：A

44、根据我国卫生标准回答以下问题:根据《综合医院建筑标准》有关的卫生学标准及预防医院内感染的要求,对医院的改建、扩建和新建提出建设性意见的应是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：C

45、对本地区的医院感染管理进行技术指导【单选题】——

- A. 卫生部医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：B

46、医院感染常规监测中下列哪项是错误的【单选题】——

- A. 医院感染高危科室、高危人群监测
- B. 漏报率监测
- C. 医院感染高危因素监测
- D. 医院感染暴发流行监测 传染病报告卡监测

【答案】：E

47、三级医院【单选题】——

- A. 医院感染发生率 $\leq 8\%$
- B. 切口感染率 $\leq 0.5\%$
- C. 两者均是
- D. 两者均不是

【答案】：B

48、有关医院感染预防与控制的概念错误的是【单选题】——

- A. 洗手是预防医院感染的重要措施
- B. 滥用抗感染药物可致二重感染
- C. 部分医院感染是可以预防的
- D. 内源性医院感染是医院感染的重要原因 医院感染一定是由于消毒隔离缺陷所致

【答案】：E

49、医源性感染【单选题】——

- A. 病原体来源于病人本身的感染
- B. 在诊疗过程中,由于器械消毒不严或制剂不纯引起的感染
- C. 病人与医生及其他病人通过直接或间接传播引起的感染
- D. 病人入院时已处于另一种传染病的潜伏期,入院后发病,并传给其他病人 病人在家中已发生的感染

【答案】：B

50、发现医院感染流行趋势时,医院感染科应在多长时间内报告医院主管领导和主管部门【单选题】——

- A.

48h

B. 36h

C. 24h

D. 12h 6h

【答案】：C

51、医院发现一次性使用无菌医疗用品不合格产品或质量可疑产品时，应【单选题】——

A. 立即停止使用，与供应商联系进行退、换货处理

B. 立即停止使用，并报告医院管理部门进行退、换货处理

C. 可继续使用，但应注意密切观察有无不良反应发生

D. 立即停止使用，并及时报告当地药品监督管理部门，不得自行作退、换货处理
立即停止使用，并及时报告医院管理部门，就地销毁不合格产品

【答案】：D

52、根据我国卫生标准回答：对医院发生的医院内感染流行、暴发流行进行调查分析，提出控制措施，并组织实施的应是【单选题】——

A. 国家医院感染管理咨询专家委员会

B. 省医院感染管理专家咨询委员会

C. 各级医院的医院感染管理委员会

D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：D

53、HICPAC 隔离预防指南第一部分最重要，主要是指对所有患者均实施【单选题】——

A. 基础预防

B. 标准预防

C. 接触隔离

D. 空气隔离 飞沫隔离

【答案】：B

54、医院感染区别于其他感染的不同点错误的是【单选题】——
A.

医院感染的菌株大多为多重耐药性

- B. 易感人群抵抗力低,病死率高
- C. 在医院内一旦发生医院感染很容易引发群发性感染
- D. 在医院感染治疗效果好,一般不会出现死亡 医院感染病原体来源广泛

【答案】：D

55、下列带入感染描述正确的是【单选题】——

- A. 病人入院时已处于另一种传染病的潜伏期,入院后发病,并传给其他病人
- B. 病原体来源于病人本身的感染
- C. 病人与医生及其他病人通过直接或间接传播引起的感染
- D. 病人在家中已发生的感染 在诊疗过程中,由于器械消毒不严或制剂不纯引起的感染

【答案】：A

56、灭菌速度快、灭菌效果好、经济、环境污染小的是【单选题】——

- A. 过氧乙酸浸泡灭菌法
- B. 辐射灭菌法
- C. 戊二醛浸泡灭菌法
- D. 环氧乙烷灭菌法 压力蒸汽灭菌法

【答案】：E

57、属污染区的区域是【单选题】——

- A. 更衣室
- B. 库房
- C. 走廊
- D. 浴室 化验室

【答案】：D

58、属于高效消毒剂的是【单选题】——

A. 醋酸氯己定

B.

新洁尔灭

- C. 两者均是
- D. 两者均否

【答案】：D

59、用紫外线消毒空气的错误方法是【单选题】——

- A. 时间为 30~60 分钟
- B. 有效距离在 2m 内
- C. 每 10m² 安装 30W 紫外线灯管一支
- D. 消毒时间为 20~30 分钟 从灯亮 5~7 分钟后开始计时

【答案】：D

60、对洗衣房的医院感染管理,下列哪项错误【单选题】——

- A. 布局上要求洁、污分区,路线由污到洁,不能逆行
- B. 运送车辆应洁、污分开,浸有血液、体液的布类应置于防水袋内封闭运送
- C. 洗衣房应有定期清洁消毒制度
- D. 各类衣服应分类清洗,感染病人与普通病人的衣物应分开清洗对血污布类应区分其感染性,必要时按感染性布类处理

【答案】：E

61、注射室属于【单选题】——

- A. I 类地区
- B. II 类地区
- C. III 类地区
- D. IV 类地区 非分类地区

【答案】：C

62、医院工作中洗手指征不正确的是【单选题】——

- A. 在进入和离开病房前洗手
- B. 处理干净的物品前,处理污染的物品后洗手
- C. 在高危病房中接触同一患者的不同部位前、后不必洗手
- D. 与任何患者长时间和密切接触后洗手

护理特殊易感患者前、后及在接触伤口前、后洗手

【答案】：C

63、二级医院【单选题】——

- A. 医院感染发生率 \leq 8%
- B. 切口感染率 \leq 0.5%
- C. 两者均是
- D. 两者均不是

【答案】：C

64、小儿流感嗜血杆菌感染首选的药物是【单选题】——

- A. 青霉素
- B. 氨苄西林
- C. 磺胺嘧啶
- D. 头孢唑啉 林可霉素

【答案】：B

65、血液净化室的医院感染管理下列哪项不正确【单选题】——

- A. 应对病人常规进行血液净化前肝功能、肝炎病原体等检查
- B. 工作人员定期体检,加强个人防护
- C. 透析器、管道应专人专用
- D. 传染病病人在隔离血液净化间内进行,专机透析 急诊病人不需固定透析机

【答案】：E

66、下列关于自身感染的描述正确的是【单选题】——

- A. 病人与医生及其他病人通过直接或间接传播引起的感染
- B. 病人在家中已发生的感染
- C. 病人入院时已处于另一种传染病的潜伏期,入院后发病,并传给其他病人
- D. 在诊疗过程中,由于器械消毒不严或制剂不纯引起的感染 病原体来源于病人本身的感染

【答案】：E

67、治疗室的管理中下列哪项是错误的【单选题】——

- A. 注射治疗时要铺无菌盘,抽出的药液存放不能超过 2 小时
- B. 治疗室中开启的各种溶酶不能超过 24 小时
- C. 治疗室中开启的无菌溶液需在 4 小时内使用
- D. 碘酒、乙醇瓶应保持密闭,每周更换并灭菌容器 1~2 次
经消毒后的棉球、纱布包,一经打开,保存时间不能超过 48 小时

【答案】： E

68、当被沾有 HBsAg 阳性血的针头刺伤时,立即应作的主要处理是【单选题】——

- A. 乙型肝炎高价免疫血清注射
- B. 给受伤者立即注射丙种球蛋白
- C. 乙型肝炎疫苗注射
- D. 伤口立即涂以碘酒 受伤者立即抽血作乙型肝炎全套抗原抗体检测

【答案】： A

69、医院感染管理中,应重点管控的传染来源是【单选题】——

- A. 动物
- B. 血液制品
- C. 各种病人
- D. 食品 病原携带者

【答案】： C

70、下列哪项是正确的【单选题】——

- A. 无菌器械保存液应该是无菌的,最多允许检出少量微球菌
- B. 使用中消毒剂细菌总数应 ≤ 200 cuf/mL,不得检出致病性微生物
- C. 无菌器械保存液细菌总数应 ≤ 5 cuf/mL,不得检出致病性微生物
- D. 使用中消毒剂细菌总数应 ≤ 10 cuf/mL,允许检出金黄色葡萄球菌
使用中消毒剂细菌总数应 ≤ 100 cuf/mL,不得检出致病性微生物

【答案】： E

71、手术中切开空腔脏器前用纱垫保护的目的是【单选题】——

- A. 防止内脏器官暴露过久
- B. 防止细菌污染
- C. 防止出血
- D. 防止损伤 防止术后腹胀

【答案】： B

72、关于使用中的消毒剂、灭菌剂的监测,下列哪项是错误的【单选题】——

- A. 应进行生物和化学监测
- B. 生物监测:消毒剂每季度 1 次,其细菌含量必须 $<100\text{cfu/mL}$,不得检出致病性微生物
- C. 灭菌剂每月生物监测 1 次,不得检出任何微生物
- D. 含氯消毒剂、过氧乙酸等的浓度应每天监测 对戊二醛浓度的监测应每月不少于 1 次

【答案】： E

73、穿过皮肤或黏膜进入无菌组织或器官内部的器材应采用的消毒方式【单选题】——

- A. 杀灭结核杆菌的消毒剂或中、低效消毒剂
- B. 杀灭细菌繁殖体的消毒剂
- C. 应用灭菌剂或高效消毒剂
- D. 灭菌剂或物理、化学灭菌方法 应用物理灭菌方法

【答案】： D

74、层流洁净病房【单选题】——

- A. $\leq 10 \leq 5 \leq 5$
- B. $\leq 200 \leq 5 \leq 5$
- C. $\leq 500 \leq 10 \leq 10$
- D. $\leq 15 \leq 15$

【答案】： A

75、婴儿室【单选题】——

- A. $\leq 10 \leq 5 \leq 5$
- B. $\leq 200 \leq 5 \leq 5$
- C. $\leq 500 \leq 10 \leq 10$
- D. $= - \leq 15 \leq 15$

【答案】：B

76、避污纸的正确使用方法为【单选题】——

- A. 污染的手取避污纸可掀页撕取
- B. 从页面抓取
- C. 随便撕取
- D. 掀开页面抓取第一页 清洁手取避污纸需他人传递

【答案】：B

77、医院感染控制措施中手术部位感染已证实有效的措施不对的是【单选题】——

- A. 清洁的手术环境
- B. 工作人员装束和手术室的无菌操作
- C. 术前沐浴和患者局部皮肤准备
- D. 合理的预防性抗生素的应用和外科伤口监测 熏蒸消毒,术前剃毛

【答案】：E

78、免疫功能低下病人的医院感染预防,下列哪项错误【单选题】——

- A. 保护皮肤粘膜的完整性
- B. 广谱抗生素肠道预防感染
- C. 保护性隔离
- D. 治疗局部感染病灶 疫苗注射

【答案】：B

79、根据我国卫生标准回答以下问题:进行医院内感染管理的策略研究,为国家提供咨询意见的应是【单选题】——

- A.

国家医院感染管理咨询专家委员会

B. 省医院感染管理专家咨询委员会

C. 各级医院的医院感染管理委员会

D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：A

80、张某,大面积烧伤病人,创面出现铜绿假单胞菌感染,创面换药后敷料的正确处理方法为【单选题】——

A. 扔入污物桶

B. 焚烧

C. 清洗后放日光下曝晒

D. 清洗后再消毒 灭菌后再清洗

【答案】：B

81、自身感染【单选题】——

A. 病人入院时已处于另一种传染病的潜伏期,入院后发病,并传给其他病人

B. 病原体来源于病人本身的感染

C. 在诊疗过程中,由于器械消毒不严或制剂不纯引起的感染

D. 病人与医生及其他病人通过直接或间接传播引起的感染 病人在家中已发生的感染

【答案】：B

82、灭菌速度快、灭菌效果好、对经济、环境污染小的是【单选题】——

A. 环氧乙烷灭菌法

B. 戊二醛浸泡灭菌法

C. 辐射灭菌法

D. 过氧乙酸浸泡灭菌法 压力蒸气灭菌法

【答案】：E

83、浸泡无菌持物钳的容器应是【单选题】——

A. 大口容器,盛用消毒液

B.

大口容器,底部垫纱布

- C. 大口容器,盛用消毒液,底部垫无菌纱布
- D. 盛用消毒液,底部垫无菌纱布 大口容器,盛用消毒液,底部垫纱布

【答案】：A

84、医院内下呼吸道感染的常见诱因是【单选题】——

- A. 留置导尿管
- B. 气管切开
- C. 两者均是
- D. 两者均否

【答案】：B

85、消毒的含义是【单选题】——

- A. 杀灭物品上的所有微生物
- B. 杀灭物品上的芽孢
- C. 消灭包括细菌芽孢在内的各种病原微生物
- D. 消除物品上的一切污秽 消灭除细菌芽孢外的各种病原微生物

【答案】：E

86、潜伏病毒的激活感染是【单选题】——

- A. 麻疹恢复期
- B. 隐性乙型脑炎病毒感染
- C. 乙型肝炎病毒携带者
- D. 单纯疱疹反复发作 慢性活动性肝炎

【答案】：D

87、医院感染最常发生的疾病是【单选题】——

- A. 肠道传染病
- B. 泌尿道感染
- C. 外伤感染

D. 表皮传染病 呼吸道传染病

【答案】：E

88、关于消毒因子对人体的危害,错误的是【单选题】——

- A. 微波对人体无害
- B. 液体消毒剂可以造成人体过敏
- C. 紫外线直接照射可伤害人体皮肤和角膜
- D. 环氧乙烷泄漏不仅对人体直接有毒,还可以发生爆炸吸入戊二醛气体对人体有害

【答案】：A

89、关于锐器伤后的预防措施,错误的是【单选题】——

- A. 如不慎发生锐器伤,应立即采取相应的保护措施,清创、对创面进行严格消毒处理
- B. 对发生锐器伤者进行血源性疾病的检查和随访
- C. 被 HBV 阳性病人血液、体液污染锐器刺伤,应在 1 周内注射乙型肝炎高效价免疫球蛋白
- D. 被 HBV 阳性病人血液、体液污染的锐器刺伤,应及时进行血液乙肝标志物检查 被 HBV 阳性病人血液、体液、污染锐器刺伤,血液乙肝标志物阴性者按规定接种乙肝疫苗

【答案】：C

90、重症监护病房【单选题】——

- A. $\leq 10 \leq 5 \leq 5$
- B. $\leq 200 \leq 5 \leq 5$
- C. $\leq 500 \leq 10 \leq 10$
- D. $=- \leq 15 \leq 15$

【答案】：B

91、判断某传染病患者是否为医院感染引起的主要依据是【单选题】

——

- A. 临床症状期
- B. 检查结果
- C.

病程

D. 潜伏期 传染期

【答案】：D

92、对一次性卫生用品、消毒药械的购置查检许可证,对其抽检进行细菌学检查【单选题】——

A. 卫生部医政司医院感染管理委员会

B. 省市卫生行政部门医院感染管理委员会

C. 医院的医院感染管理委员会

D. 医院感染管理科 临床科室以下各项工作是哪个部门的职责

【答案】：D

93、MRSA 感染的最佳选药【单选题】——

A. 去甲万古霉素、万古霉素

B. 头孢唑林

C. 氧氟沙星

D. 磷霉素 阿米卡星

【答案】：A

94、医院内感染常规监测中下列哪项是错误的【单选题】——

A. 医院内感染高危科室高危人群监测

B. 漏报率监测

C. 医院内感染高危因素监测

D. 医院内感染暴发流行监测 传染病报告卡监测

【答案】：E

95、须现配现用的消毒剂是【单选题】——

A. 过氧乙酸

B. 乙醇

C. 苯扎溴铵

D. 纯乳酸 甲醛

【答案】：A

96、下述监测不合格的有【单选题】——

- A. 层流洁净手术室空气细菌数 $\leq 10\text{cfu}/\text{m}^3$
- B. 重症监护室医护人员手 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$
- C. 供应室无菌区物体表面细菌数 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$
- D. 一次性注射器和输液器细菌培养阴性, 噬菌体试验阳性 传染病病房物体表面 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$

【答案】： D

97、AFB 隔离指的是【单选题】——

- A. 空气隔离
- B. 接触隔离
- C. 结核菌(病)隔离
- D. 严密隔离 血液-体液隔离

【答案】： C

98、高度危险性物品是指【单选题】——

- A. 受到一定量病菌污染才造成危害的物品
- B. 虽有微生物污染, 但一般情况下无害的物品
- C. 进入无菌组织或与破损的组织、皮肤粘膜密切接触的物品
- D. 仅和皮肤粘膜相接触, 而不进入无菌的组织内的物品 直接地和健康无损的皮肤粘膜密切接触的物品

【答案】： C

99、紫外线辐射强度为多少时更换紫外线灯管【单选题】——

- A. $\approx 70 \mu\text{W}/\text{cm}^2$
- B. $= 70 \mu\text{W}/\text{cm}^2$
- C. $< 70 \mu\text{W}/\text{cm}^2$
- D. $\geq 70 \mu\text{W}/\text{cm}^2$

【答案】： C

100、每块手术巾的一边应折叠【单选题】——

- A. 1/10
- B.

1/5

C. 1/4

D. 1/3 1/2

【答案】：C

101、紫外线消毒的有效距离是【单选题】——

A. 10m

B. 2m

C. 1m

D. 5m 15m

【答案】：B

102、若需提高煮沸温度,可在水中加入【单选题】——

A. 碳酸氢钠

B. 高锰酸钾

C. 乙醇

D. 亚硝酸钠 氯化钠

【答案】：A

103、手术区皮肤消毒的正确方法是【单选题】——

A. 消毒范围超过手术切口 15cm

B. 会阴部用碘酊消毒

C. 消毒范围与备皮范围一致

D. 用 2.5~3%的碘酊消毒 3 遍 用 95%乙醇脱碘

【答案】：A

104、传染病区使用拖把的描述哪项是正确的【单选题】——

A. 应先消毒,用 500mg/L 有效氯消毒液浸泡 30min,再用水洗干净,然后用 500mg/L 有效氯消毒液浸泡 30min,悬挂晾干备用

B. 每次使用后清水冲洗,悬挂晾干备用

C. 先用 1000mg/L 有效氯消毒剂适量倒在污染地面 30min 后,用拖把拖干净

D.

拖把用 500mg/L 有效氯消毒液浸泡 30min 后,再洗干净,晾干备用
拖把应有明显的标记,严格分区使用

【答案】： A

105、肾移植患者应采取哪种隔离措施【单选题】——

- A. 严密隔离
- B. 接触隔离
- C. 呼吸道隔离
- D. 消化道隔离 保护性隔离

【答案】： E

106、下列不属于内源性感染情况的是【单选题】——

- A. 寄居部位的改变
- B. 宿主的局部或全身免疫功能下降
- C. 菌群失调和二重感染
- D. 通过空气或水源的感染 潜在感染活化:如疱疹病毒、结核等

【答案】： D

107、灭菌速度快、灭菌效果好、经济、环境污染小的灭菌方法是【单选题】——

- A. 环氧乙烷灭菌法
- B. 戊二醛浸泡灭菌法
- C. 辐射灭菌法
- D. 过氧乙酸浸泡灭菌法 压力蒸汽灭菌法

【答案】： E

108、根据我国卫生标准回答:根据《综合医院建筑标准》有关的卫生学标准及预防医院内感染的要求,对医院的改建、扩建和新建提出建设性意见的应是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C.

各级医院的医院感染管理委员会

- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：C

109、关于医院内感染知识培训,错误的叙述是【单选题】——

- A. 培训内容包括管理知识和专业知识
B. 培训对象包括管理、医务、工勤人员
C. 非专职人员每年不少于2小时培训
D. 进修医师必须培训 实习医师必须培训

【答案】：C

110、下列概念中不正确的是:【单选题】——

- A. 医院感染散发是指医院感染在某医院或某地区住院患者中历年的一般发病率水平
B. 医院感染的流行趋势是指医院感染持续流行
C. 医院感染发病率是指一定时间内住院患者中发生医院感染新发病例的频率
D. 医院感染流行是指某医院.某科室医院感染发病率显著超过历年散发发病率水平 医院感染暴发是指在某医院、某科室的住院患者中,短时间内、突然发生许多医院感染病例的现象

【答案】：B

111、目前医院内感染的研究对象主要是【单选题】——

- A. 住院患者
B. 工作人员
C. 陪护人员
D. 探视人员 门诊患者

【答案】：A

112、调查医院内感染的最佳方法是【单选题】——

- A. 从医院微生物室获得病例来源
B. 临床医院填报病例

- C. 专职护士到病案室前瞻性发现病例
- D. 病室监控护士报告病例

专职护士到病案室从出院病历中查找病例

【答案】：C

113、《医务人员艾滋病病毒职业暴露防护工作指导原则(试行)》是卫生部于哪年制定的【单选题】——

- A. 2002 年
- B. 2003 年
- C. 2004 年
- D. 2005 年 2001 年

【答案】：C

114、每日 I 级手术间开始前,提前开启净化空调系统时间【单选题】——

- A. 10 分钟
- B. 30 分钟
- C. 15 分钟
- D. 20 分钟 40 分钟

【答案】：B

115、穿脱隔离衣时要避免污染【单选题】——

- A. 袖子后面
- B. 胸前、背后
- C. 腰带以下部分
- D. 衣领 腰带以上部分

【答案】：D

116、对到传染病室探视的亲友应注意的事项哪些不对【单选题】——

- A. 对于有感染指征的来访者,一律谢绝探视
- B. 探视者在进入隔离室前要先报告值班护士
- C. 对于有感染指征的患者,应尽量控制和减少探视
- D. 医务人员应指导和监督探视者按规定进行隔离 积极向探视者进行卫生知识宣传教育,保护探视者不受感染

【答案】：C

117、穿过皮肤或黏膜进入无菌的组织或器官内部的器材【单选题】——

- A. 灭菌剂或物理、化学灭菌方法
- B. 应用灭菌剂或高效消毒剂
- C. 杀灭结核杆菌的消毒剂或中、低效消毒剂
- D. 应用物理灭菌方法 杀灭细菌繁殖体的消毒剂

【答案】：A

118、无菌盘铺好后有效期不超过【单选题】——

- A. 8h
- B. 2h
- C. 16h
- D. 12h 4h

【答案】：E

119、铺好的无菌盘,在无污染情况下的有效时间是【单选题】——

- A. 6h
- B. 24h
- C. 4h
- D. 12h 2h

【答案】：C

120、I、II级手术室空气采样的时间【单选题】——

- A. 手术开始前30分钟
- B. 彻底清扫后30分钟
- C. 手术结束后30分钟
- D. 采样前提前开启空气消毒机30分钟后 手术开始前1小时

【答案】：D

121、无菌盘铺好后有效时间不超过【单选题】——

- A. 4h
- B. 6h
- C.

8h

D. 5h 7h

【答案】：A

122、医务人员发生艾滋病职业暴露后预防性用药最好在几小时内实施

【单选题】——

A. 24h

B. 12h

C. 8h

D. 4h 2h

【答案】：D

123、下列消毒剂中属中效消毒剂的是【单选题】——

A. 戊二醛

B. 过氧乙酸

C. 氯己定

D. 臭氧 碘伏

【答案】：E

124、下列哪种情况属于医院感染【单选题】——

A. 烧伤创面培养出金黄色葡萄球菌

B. 经产道感染的乙型肝炎

C. 红霉素静脉滴注后发生静脉炎；拔出的导管在血平皿上滚动培养，细菌菌落数8个

D. 羊肠线吸收不佳的炎症反应 入院后5天发生的甲型肝炎

【答案】：B

125、高效消毒剂是【单选题】——

A. 醋酸氯己定

B. 新洁尔灭

C. 两者均是

D. 两者均否

【答案】：D

126、下列哪项不是医院感染的特点【单选题】——

- A. 易感人群抵抗力低,病死率高
- B. 医院中流行的菌株大多为多重耐药性
- C. 医院中病原体来源广泛
- D. 在医院感染中人群的病死率很低 在医院内一旦发生感染很容易播散

【答案】：D

127、下述不属于灭菌剂是【单选题】——

- A. 20%戊二醛
- B. 过氧乙酸
- C. 环氧乙烷
- D. 甲醛 含氯消毒剂

【答案】：E

128、外科刷手时间每次【单选题】——

- A. 3分钟以上
- B. 1分钟以上
- C. 2分钟以上
- D. 5分钟以上 4分钟以上

【答案】：A

129、根据我国下列卫生标准回答:对医院发生的医院内感染流行、暴发流行进行调查分析,提出控制措施,并组织实施的是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：D

130、免疫功能低下病人的医院内感染预防,下列哪项错误【单选题】——

- A.

保护皮肤黏膜的完整性

- B. 广谱抗生素肠道预防感染
- C. 保护性隔离
- D. 治疗局部感染病灶 疫苗注射

【答案】： B

131、用紫外线灯做空气消毒时有效距离为【单选题】——

- A. <3.5m
- B. <4m
- C. <2m
- D. <3m <2.5m

【答案】： C

132、关于医院感染的概念错误的是：【单选题】——

- A. 入院时处于潜伏期的感染不是医院感染
- B. 医院感染是指在医院内获得的感染
- C. 慢性感染急性发作是医院感染
- D. 与上次住院有关的感染是医院感染 婴幼儿经胎盘获得的感染不是医院感染

【答案】： C

133、根据我国卫生标准回答以下问题：对医院发生的医院内感染流行、暴发流行进行调查分析，提出控制措施，并组织实施的应是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】： D

134、下述哪项不属于微生物【单选题】——

- A. 病毒
- B. 支原体

C.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/806215154232010130>