

统计学-浙江工商大学-中国大学MOOC慕课答案

第1章 统计学的基本概念 单元作业

第1 章 统计学的基本概念单元测试

1、单选题：统计学的研究对象是（）

选项：

- A、各种现象的内在规律
- B、各种现象的数量方面
- C、统计活动过程
- D、总体与样本的关系

参考：【**各种现象的数量方面**】

2、单选题：某班3名男生的身高分别为172cm、176 cm和178 cm，这3个数是（）

选项：

- A、标志
- B、变量
- C、变量值
- D、指标

参考：【**变量值**】

3、单选题：以一、二、三等来表示产品质量的优劣，那么产品等级是（）

选项：

- A、质量指标
- B、品质标志
- C、数量标志
- D、数量指标

参考：【**品质标志**】

4、单选题：下列哪个变量不能采用定比尺度计量（）

选项：

- A、企业职工人数
- B、企业产品产量
- C、企业销售额
- D、企业利润额

参考：【**企业利润额**】

5、单选题：下列哪个指标不属于质量指标？

选项：

- A、企业职工平均工资
- B、企业利润率
- C、企业产品合格率
- D、企业增加值

参考：【**企业增加值**】

6、单选题：要了解某市30所中学的学生眼睛视力状况，则个体是（）

选项：

- A、每所中学
- B、全部中学
- C、每名学生
- D、每名学生的眼睛视力

参考：【**每名学生**】

7、判断题：统计学是一门关于统计数据的搜集、整理和分析的方法论科学。

选项：

- A、正确
- B、错误

参考：【**正确**】

8、判断题：统计学起源于德国的国势学派。

选项：

- A、正确
- B、错误

参考：【**错误**】

9、判断题：描述统计与推断统计的区别在于前者简单，后者复杂。

选项：

- A、正确
- B、错误

参考：【**错误**】

10、判断题：数量指标根据数量标志计算而来，质量指标根据品质标志计算而来。

选项：

- A、正确
- B、错误

参考：【**错误**】

11、判断题：任何统计数据都可以归类于绝对数、相对数或平均数中的一种。

选项：

- A、正确
- B、错误

参考：【**正确**】

12、判断题：统计学可以被理解为关于样本的科学。

选项：

- A、正确
- B、错误

参考：【**正确**】

13、判断题：从广义上说，可变标志、指标都是变量。

选项：

- A、正确

B、错误

参考：【正确】

14、判断题：无论数量指标或质量指标，其数值大小都与总体容量（或样本容量）有关。

选项：

A、正确

B、错误

参考：【错误】

15、判断题：任何总体，其所包含的个体必须至少具备一个可变标志和一个不变标志。

选项：

A、正确

B、错误

参考：【正确】

16、判断题：电话号码是数量标志。

选项：

A、正确

B、错误

参考：【错误】

第2章 数据的收集整理和显示 单元作业

第2章 数据的收集、整理和呈现 单元测验

1、单选题：最常用的统计调查方式是（ ）

选项：

A、普查

B、重点调查

C、抽样调查

D、科学推算

参考：【抽样调查】

2、单选题：调查小学男生的身高，则身高是（ ）

选项：

A、观测标志

B、观测单位

C、调查对象

D、变量值

参考：【观测标志】

3、单选题：抽样调查中不可避免的误差是（ ）

选项：

A、系统性误差

B、偶然性误差

C、观测性误差

D、登记性误差

参考：【偶然性误差】

4、单选题：在组距式数列中，对组限值的处理原则是（）

选项：

- A、上组限不在内、下组限在内
- B、下组限不在内、上组限在内
- C、上下组限均不在内
- D、上下组限均在内

参考：【上组限不在内、下组限在内】

5、单选题：最常见的变量分布类型是（）

选项：

- A、正J型分布
- B、U型分布
- C、钟型分布
- D、反J型分布

参考：【钟型分布】

6、判断题：观测单位就是统计数据的提供单位。

选项：

- A、正确
- B、错误

参考：【错误】

7、判断题：普查是全面调查，抽样调查是非全面调查，所以普查比抽样调查准确。

选项：

- A、正确
- B、错误

参考：【错误】

8、判断题：无论是概率抽样还是非概率抽样，误差都是可以计算的。

选项：

- A、正确
- B、错误

参考：【错误】

9、判断题：偶然性误差只存在于抽样调查，观测性误差则可能存在于任何统计调查。

选项：

- A、正确
- B、错误

参考：【正确】

10、判断题：为了尽可能多地收集统计数据信息，所以问卷应尽可能地长。

选项：

- A、正确
- B、错误

参考：【错误】

11、判断题：统计分组应使组间差异尽量小。

选项：

A、正确

B、错误

参考：【错误】

12、判断题：凡是离散型变量都适合编制单向式数列。

选项：

A、正确

B、错误

参考：【错误】

13、判断题：各组的频数或频率都是可以直接比较的。

选项：

A、正确

B、错误

参考：【错误】

第3章 变量分布特征的描述 作业

第3章 变量分布特征的描述 单元测验

1、单选题：由相对数计算平均数时，如果已知该相对数的子项数值，则应该采用（）

选项：

A、算术平均数

B、调和平均数

C、几何平均数

D、位置平均数

参考：【调和平均数】

2、单选题：如果计算加权算术平均数的各组频数都减少为原来的 $4/5$ ，则算术平均数（）

选项：

A、减少 $4/5$

B、减少为原来的 $4/5$

C、不变

D、不能确定如何变化

参考：【不变】

3、单选题：如果计算算术平均数的所有变量值都增加100，则方差（）

选项：

A、增加100

B、增加10000

C、不变

D、不能确定如何变化

参考：【不变】

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/807046046014006035>