

妇产科护理技术试题（含参考答案）

一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1、孕妇，32 岁，停经 34 周。近一周下肢水肿，头昏，视物模糊，血压 150/100mmHg，尿蛋白(+)，听胎心音正常。使用硫酸镁治疗时要注意观察

- A、尿量每日>600ml，每小时>15ml
- B、使用前应测体温脉搏和呼吸
- C、膝腱反射正常或增强
- D、血压降至 130/90mmHg
- E、呼吸每分钟不少于 16 次

正确答案：E

2、产妇，26 岁，产后 3 天诉乳房痛，对其乳房进行评估，正确的指导是

- A、若为正常乳头，一侧乳房吸空一半即换另一侧乳房
- B、若患乳腺炎，先喂健侧乳房，再喂患侧乳房
- C、若为皲裂乳头，先喂破损乳头，再喂正常乳头
- D、若为乳房胀痛，先喂胀痛轻的乳房，后喂较严重的乳房
- E、若一侧为平坦乳头，应先喂凸出乳头，后喂平坦乳头

正确答案：B

3、患者，女性，45 岁，经量增多，经期延长 2 年，头晕、乏力 2 个月。妇科查体：子宫呈不规则增大，如孕 3 个月大小，表面结节状突起，质硬。为患者制定护理计划，护理诊断应除外

- A、潜在并发症--贫血
- B、活动无耐力
- C、焦虑
- D、营养失调，低于机体需求量
- E、自尊紊乱

正确答案：E

4、初产妇李某，30 岁，孕 39 周，于胎儿分娩后突然出现烦躁不安、恶心、呕吐，继而出现呛咳、呼吸困难，R24 次/分，HR126 次/分，BF80/50mmHg。此时，产妇很可能发生

- A、哮喘发作
- B、心力衰竭
- C、羊水栓塞
- D、失血性休克

E、急性胃肠炎

正确答案：C

5、对骨盆的描述，正确的是

A、骨盆分界线以下为真骨盆，是胎儿娩出的通道

B、骨盆入口平面呈纵椭圆形，有 2 条径线

C、中骨盆平面呈横椭圆形，有 4 条径线

D、骨盆分界线以上为假骨盆，是胎儿娩出的通道

E、骨盆由骶骨、尾骨和髌骨各 2 块组成

正确答案：A

6、最常见的子宫肌瘤类型为

A、阔韧带肌瘤

B、黏膜下肌瘤

C、宫颈肌瘤

D、肌壁间肌瘤

E、浆膜下肌瘤

正确答案：D

7、下列关于胎位的描述，属于横产式的是

A、持续性枕后位

B、左肩前位

C、持续性枕横位

D、左骶前位

E、左枕前位

正确答案：B

8、以下措施不能预防产褥期泌尿系统感染的是

A、待产时尽量导尿排空膀胱

B、产后鼓励产妇多饮水

C、产后至少每 4 小时排空膀胱一次

D、及时更换会阴垫

E、大、小便后及时清理外阴

正确答案：A

9、某孕妇，孕 35 周，诊断为急性羊水过多，压迫症状明显，胎儿正常。

行腹腔穿刺放羊水时，一次放羊水量不超过

A、1500ml

B、1200ml

- C、800ml
- D、1800ml
- E、1000ml

正确答案：A

10、某初产妇，孕 37 周，宫口开全半小时频频用力，未见胎头拨露。检查：宫底部为臀，腹部前方可触及胎儿小部分，未触及胎头。可以初步诊断为

- A、原发性宫缩无力
- B、持续性枕横位
- C、骨盆入口轻度狭窄
- D、持续性枕后位
- E、骨盆入口头盆不称

正确答案：D

11、护士在指导育龄妇女选用适宜的避孕方式时，应说明在下列避孕方法中，失败率较高的是

- A、安全期避孕
- B、避孕针
- C、按期口服短效避孕药
- D、放置宫内节育器
- E、使用避孕套

正确答案：A

12、患者，女，25 岁，孕 25 周，主诉阴道分泌物增多伴外阴瘙痒 1 周。妇科检查：阴道黏膜充血，阴道内大量块状分泌物，化验滴虫(-)，清洁度 I，真菌(+)，下列说法哪项是错误的

- A、孕妇禁用口服唑类药物
- B、阴道冲洗后局部用药
- C、多见于糖尿病患者
- D、多见于孕妇及近期应用抗生素者
- E、先用酸性液体冲洗阴道

正确答案：E

13、关于先兆流产的处理，以下哪项不正确

- A、禁止性生活
- B、观察胚胎发育
- C、减少刺激，适当给予镇静剂

- D、卧床休息
- E、黄体酮保胎

正确答案：C

14、慢性宫颈炎的典型临床表现是

- A、外阴疼痛
- B、外阴灼热感
- C、白带增多
- D、外阴湿疹
- E、外阴瘙痒

正确答案：C

15、产妇，26岁，孕37周，自然分娩一活女婴。产妇接受护士建议，母乳喂养。产后6小时之内开始母乳喂养，因自觉乳房不胀，婴儿没能吸吮到足够的乳汁。护士对产妇进行有关母乳喂养的指导，不恰当的是

- A、要勤吸吮，按需哺乳，以增加奶量
- B、不必喝比所需要量多的水
- C、夜间要保证休息勿吸吮母乳
- D、喂奶前饮一杯营养、温热汤水
- E、吸奶前先以乳头触宝宝上唇

正确答案：C

16、阴道分泌物呈大量泡沫状，灰黄色，质稀薄伴腥臭味，最可能为

- A、外阴炎
- B、老年性阴道炎
- C、念珠菌性阴道炎
- D、滴虫性阴道炎
- E、宫颈糜烂

正确答案：D

17、妊娠合并心脏病孕妇分娩过程中，正确的护理措施是

- A、第一产程观察生命体征，每4小时1次，评估心功能状态
- B、产后3天内严密监护
- C、第二产程一般不予手术助产
- D、第三产程后应在产房观察2小时
- E、胎儿娩出后立即给产妇注射麦角新碱

正确答案：B

18、患者，女，55岁，绝经3年，妇科检查子宫正常大小，右附件可及

5cm×4cm 实性肿块，B 超示子宫内膜增厚，护理评估初步考虑是

- A、内胚窦瘤
- B、无性细胞瘤
- C、未成熟畸胎瘤
- D、颗粒细胞瘤
- E、卵巢浆液性囊腺癌

正确答案：D

19、产后 2 个月的哺乳期妇女，首选的避孕方法是

- A、安全期避孕
- B、长效避孕针
- C、避孕套
- D、口服短效避孕药
- E、宫内节育器

正确答案：C

20、沙女士，29 岁，已婚，月经规律。现停经 50 天后出现阴道少量流血 3 天，伴轻微下腹痛。妇科检查发现该孕妇宫颈口关闭，子宫增大，约孕 50 天大小，妊娠试验阳性。该孕妇最可能的诊断是

- A、难免流产
- B、完全流产
- C、习惯性流产
- D、不全流产
- E、先兆流产

正确答案：E

21、滞产指总产程超过

- A、14 小时
- B、30 小时
- C、36 小时
- D、24 小时
- E、20 小时

正确答案：D

22、初产妇，孕 40 周，宫口开 5cm，S+1 已破膜，持续腹痛，烦躁，脐下触到一个狭窄部，有压痛，不正确的处理

- A、使用硫酸镁
- B、使用缩宫素

- C、予哌替啶 100mg 肌注
- D、予氧气吸入
- E、按摩产妇背部

正确答案：B

23、王女士，现孕 30 周，长时间仰卧后，出现血压下降、头晕、心悸等症状，分析导致这些症状的主要原因是

- A、回心血量减少
- B、脉率增快
- C、脉压增大
- D、回心血量增加
- E、脉压减少

正确答案：A

24、张女士，32 岁，结婚 5 年，夫妻性生活正常，未孕。现停经 40 天，因突然右下腹剧烈疼痛伴有阴道点滴出血半天，急诊入院。查体：血压 100/50mmHg，白细胞 $8 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞 0.7。盆腔检查：阴道内有少许暗红色血，宫颈抬举痛明显，后穹窿饱满，子宫触诊不满意。为该患者提供的护理应除外

- A、患者立即取半卧位
- B、严密观察血压、脉搏、呼吸
- C、立即灌肠行术前准备
- D、立即输液，做好输血准备
- E、观察体温变化

正确答案：C

25、下列有关胎膜早破的说法，哪项不正确

- A、对妊娠和分娩均不利
- B、使产褥感染率增加
- C、可导致早产率增加
- D、是少见的分娩期并发症
- E、指临产前胎膜自然破裂

正确答案：D

26、关于产程曲线异常，以下哪项是错误的

- A、第二产程经产妇超过 2 小时尚未分娩为第二产程延长
- B、活跃期宫口不再扩张达 2 小时以上为活跃期停滞
- C、活跃期最大时限 8 小时，超过 8 小时为延长

D、总产程超过 24 小时为滞产

E、第二产程达 1 小时胎头下降无进展为第二产程停滞

正确答案：A

27、林某，G1P0，临产 7 小时，头先露，宫口已开全，胎头下降程度为 +4。此时决定其自然分娩的主要因素是

A、腹肌收缩力及膈肌收缩力

B、子宫收缩力及自主呼吸配合

C、盆底收缩力及自主呼吸配合

D、子宫收缩力及膈肌收缩力

E、腹肌收缩力及自主呼吸配合

正确答案：B

28、刘某，25 岁，为妊娠合并心脏病患者，判断其心力衰竭的确切指征是

A、咳泡沫状痰，肺底部有持续性湿啰音

B、活动时心率每分钟超过 110 次

C、足踝部出现凹陷性水肿

D、心尖部闻及 II 级收缩期杂音

E、二尖瓣区闻及舒张期杂音

正确答案：A

29、产妇，徐某，G1P0，孕 38 周，胎方位：臀先露，估计胎儿体重 2500g 医生与产妇及家属谈话，同意试产。临产后 6 小时，宫口扩张 3cm。以后 9 小时内，宫口扩张 6cm，胎先露+1，胎心好，宫缩 20 秒/8 分钟，宫缩节律性正常，对称性较弱。依据产妇徐某的产程表现，产力类型属于

A、协调性宫缩过强

B、协调性宫缩乏力

C、不协调性宫缩过强

D、不协调性宫缩乏力

E、子宫收缩正常

正确答案：D

30、某妇女曾流产 2 次，早产 1 次，足月产 2 次，现存 3 个子女，她的生育史可简写为

A、2-3-2-1

B、2-2-1-3

C、1-2-2-3

D、2-1-2-3

E、1-2-3-2

正确答案：D

31、胎体纵轴与母体纵轴的关系称为

A、产轴

B、胎产式

C、胎先露

D、胎体势

E、胎位

正确答案：B

32、患者，女，30岁，妊娠35周，受到撞击后腹部剧烈疼痛1小时。查体：体温36℃，脉搏110次/分，血压140/100mmHg，阴道无流血，宫口未开，未破膜，子宫足月妊娠大小，板状硬，有压痛，胎心率90次/分，胎位不清。以下哪项护理措施是不正确的

A、阴道检查了解胎先露情况

B、左侧卧位，吸氧

C、做好剖宫产及抢救新生儿的准备

D、分娩后立即给予宫缩剂

E、输新鲜血

正确答案：A

33、患者，女，确诊为子宫内膜癌，行子宫广泛切除术，术后导尿管保留的时间为

A、5~7天

B、7~14天

C、24~48小时

D、3天

E、12~24小时

正确答案：B

34、患者，女性，65岁，行阴道子宫全切术加阴道前后壁修补术。术后护士采取的护理措施正确的是

A、术后3天行盆浴

B、术后平卧位1天，次日起半卧位

C、留置尿管3~5天

D、术后阴道灌洗每日 2 次

E、术后半流质饮食 3 天

正确答案：C

35、胎盘滞留是指胎儿娩出后而胎盘未娩出超过

A、15 分钟

B、25 分钟

C、10 分钟

D、5 分钟

E、30 分钟

正确答案：E

36、初产妇，30 岁，足月妊娠，为预防产后出血，胎儿娩出后胎盘剥离前，正确的处理方法是

A、徒手剥离子宫胎盘

B、热敷下腹部

C、不可过早牵拉脐带

D、按摩子宫

E、手掌尺侧轻压子宫下段

正确答案：C

37、孕妇，29 岁，孕 38 周，因自诉阵发性腹部疼痛入院。首选的护理措施是

A、做好精神心理护理和剖宫产术前准备

B、嘱绝对禁食观察是否合并内外科疾病

C、以腹部触诊法严密观察宫缩并勤听胎心

D、立即行凝血功能检查和准备宫腔镜检查

E、告知腹部 B 超检查的必要性以取得配合

正确答案：C

38、妊娠合并心脏病孕妇，最易发生心力衰竭的时间是

A、妊娠 38 周以上

B、妊娠 20~24 周

C、妊娠 28~30 周

D、妊娠 36~38 周

E、妊娠 32~34 周

正确答案：E

39、孕妇张某，28 岁，G2P0，孕 37 周，凌晨 4:00 突感有较多液体自阴

道流出急诊住院，产科检查无宫缩，胎先露高浮，胎心 146 次/分。责任护士落实的护理措施不包括

- A、做好会阴部护理
- B、监测孕妇的体温
- C、观察羊水的性状
- D、监测胎心、胎动的变化
- E、常规行肛诊

正确答案：E

40、滴虫性阴道炎的传染方式，下列说法哪项是错误的

- A、性交传播
- B、宫内传播
- C、游泳池传播
- D、公共浴池传播
- E、共用毛巾、浴巾传播

正确答案：B

41、妊娠高血压疾病的孕妇，需预防的产科并发症是

- A、羊水过多
- B、过期妊娠
- C、异位妊娠
- D、胎盘早剥
- E、前置胎盘

正确答案：D

42、某产妇，30 岁，产后 3 天发生乳房胀痛，请问下列哪些护理措施是不合适的

- A、限制汤类饮食，不排空乳房
- B、哺乳前热敷乳房
- C、哺乳前按摩乳房
- D、两次哺乳间冷敷乳房
- E、指导产妇配戴合适的乳罩

正确答案：A

43、孕妇，孕 37 周，以重度子痫前期入院，治疗药物首选

- A、降压药
- B、利尿药
- C、解痉药

D、正性肌力药

E、抗生素

正确答案：C

44、患者，女，35岁，孕28周，诊断为妊娠合并心脏病，不是预防该孕妇发生心衰的措施是

A、积极治疗贫血

B、定期内科医生随访

C、指导孕妇加强营养

D、防治上呼吸道感染

E、注意休息避免过劳

正确答案：C

45、需要夫妇双方同时治疗的炎症是

A、慢性宫颈炎

B、外阴炎

C、念珠菌阴道炎

D、滴虫性阴道炎

E、盆腔炎

正确答案：D

46、患者，女，58岁，停经8年后阴道流血。妇科检查：宫颈表现光滑，子宫丰满、软，双侧附件阴性。应主要怀疑的疾病是

A、宫颈癌

B、子宫肌瘤

C、卵巢癌

D、子宫内膜癌

E、老年性阴道炎

正确答案：D

47、某孕妇，孕24周，B超诊断为双胎妊娠，下列护理措施中不正确的是

A、增加产前检查次数

B、注意监测宫高、腹围和体重

C、注意多休息

D、右侧卧位

E、加强营养

正确答案：D

48、某孕妇被诊断为妊娠期高血压疾病，目前正在使用大剂量硫酸镁治疗，观察其最早出现的中毒反应是

- A、呼吸减慢
- B、膝跳反射减弱
- C、尿量增多
- D、膝跳反射亢进
- E、呼吸加快

正确答案：B

49、某产妇，27岁，疑为头盆不称，则试产时间为

- A、8~10小时
- B、2~4小时
- C、1~2小时
- D、4~6小时
- E、6~8小时

正确答案：B

50、关于妊娠合并心脏病孕产妇的护理，下列正确的是

- A、休息时宜右侧卧位
- B、定期评估心功能
- C、妊娠36周开始限制食盐的摄入
- D、心功能III级的产妇可母乳喂养
- E、第二产程鼓励产妇屏气用力

正确答案：B

51、某女士，34岁，孕11周，出现阵发性下腹痛，阴道排出一块肉样组织，继而阴道大量出血。目前贫血貌，体温37.2℃。妇科检查：宫口已开，有组织堵塞宫口，子宫较孕周略小，其最可能的临床诊断是

- A、稽留流产
- B、不全流产
- C、感染性流产
- D、先兆流产
- E、难免流产

正确答案：B

52、李女士，30岁，孕39周，临产10小时，骨盆正常，胎心145次/分，LOP，宫缩20秒/7~8分钟，宫口开3cm，S-1，羊水清，目前处理正确的是

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/807155130132006036>