

口腔医学主治医师：口腔内科学

1、单选 患者右下后牙因龋洞一次完成治疗，几天后复诊自述不敢咬合。查：左下6银汞合金充填物好，无高点及悬突，探银汞充填物边缘完好，叩（-），左下6全冠修复。该牙处理为（）

- A. 观察（江南博哥）
- B. 调
- C. 去旧充填体，重新银汞充填
- D. 去旧充填体，氧化锌丁香油糊剂安抚，症状消失后复合树脂充填
- E. 脱敏治疗

正确答案：D

2、单选 龋病最为好发的部位为（）

- A. 牙颈部
- B. 颊面
- C. 咬合面
- D. 舌面
- E. 邻面

正确答案：C

3、单选 患者，女性，50岁，两颊黏膜黑色素沉着就诊，并伴有体重减轻、衰弱无力和血压下降，诊断可能是（）

- A. Albright 综合征
- B. 慢性肾上腺皮质功能减退症
- C. 普杰病
- D. 库欣综合征
- E. 甲状旁腺功能减退症

正确答案：B

4、单选 患者，女性，39岁，1年来下唇反复糜烂，并伴有多处皮肤的不规则红斑，户外劳动后上述症状加重。查体示：下唇唇红盘状糜烂面，上覆血痂，周围放射状白纹，皮肤界限清楚；头皮、耳旁、颈、前胸、双侧手背均见大小不等的不规则红斑伴萎缩，表面有黏着性鳞屑覆盖。辅助检查的最主要的目的是（）

- A. 排查病损癌变
- B. 鉴别诊断扁平苔藓、红斑狼疮和多形性红斑
- C. 排查 SLE
- D. 判断疾病有无传染性
- E. 筛选遗传病

正确答案：C

5、单选 营养不良性口角炎最常见的病因是缺乏（）

- A. 维生素 C
- B. 维生素 B1

- C. 核黄素
- D. 维生素 E
- E. 微量元素铁

正确答案：C

6、单选 龋病保守治疗的主要目的是（）

- A. 保护牙髓
- B. 用药物使龋坏的牙体组织再矿化
- C. 使病变终止
- D. 使可复性牙髓炎的牙髓恢复正常
- E. 延缓龋病的发展

正确答案：C

7、单选 关于感染性口角炎说法错误的是（）

- A. 由细菌、病毒、真菌等病原微生物引起
- B. 真菌性口角炎常有真菌性唇炎同时发生
- C. 对急性期疱疹性口角炎的治疗必须口服糖皮质激素类药物
- D. 可表现为口角区充血、红肿疼痛明显
- E. 最常见的是由于白色念珠菌、金黄色葡萄球菌和链球菌感染引起

正确答案：C

8、单选 深部真菌病的致病菌不包括（）

- A. 念珠菌
- B. 新型隐球菌
- C. 结核分枝杆菌
- D. 曲霉菌
- E. 酵母菌

正确答案：C

9、单选 患儿，男，8个月，母乳喂养，舌系带溃烂1个月，进食困难。口腔检查：下前牙萌出，舌系带处见1.0cm×0.8cm大小的溃疡，表面有灰白色假膜，触诊较硬。拟诊断为（）

- A. Riga-Fede病
- B. Bednar溃疡
- C. 腺周口疮
- D. 褥疮性溃疡
- E. 自伤性溃疡

正确答案：A

10、单选 患者，男性，50岁。近来感觉口腔黏膜粗糙，涩感，偶然发现舌右侧黏膜有1cm<sup>2</sup>大小白色斑块状改变，白斑表面有小颗粒，稍微隆起高出黏膜面。检查见局部为非均质性白色斑块，触诊白色斑块基底稍微发硬，黏膜尚无破溃。口腔白斑出现哪些情况需要及时手术治疗（）

- A. 白斑面积缩小
- B. 白斑面积增大

- C. 白斑色泽变浅
- D. 白斑色泽变暗
- E. 白斑出现增生

正确答案：E

11、单选 游走性舌炎病损区突出的病理变化的是（）

- A. 丝状乳头萎缩
- B. 菌状乳头增生
- C. 轮廓乳头增生
- D. 叶状乳头增生

E. 以上均是 正确答案：A

12、单选 患者，男性，50岁，因“不明原因的口腔起疱、溃烂3个月，全身皮肤出现水疱半月余”就诊。查：口腔黏膜、口唇及口周皮肤可见残留的疱壁，并可见到广泛红湿的糜烂面，局部形成脓血痂；发际、颈部、胸部、腹部、双腋下、双大腿内侧见大小不一、形状不规则的水疱，肛周可见散在小丘疱疹，皮肤糜烂，有脓性分泌物，尼氏征阳性。该病最可能的诊断是（）

- A. 药物变态反应性口炎
- B. 多形性红斑
- C. 寻常型天疱疮
- D. 大疱性类天疱疮

E. 类天疱疮样扁平苔藓 正确答案：C

13、单选 HIV相关牙周病最可能的原因是（）

- A. HIV病毒的直接影响
- B. 菌群改变及免疫抑制
- C. 免疫功能变化使骨破坏加剧
- D. 细菌和口腔念珠菌联合感染
- E. 以上都不对

正确答案：B

14、单选 患者，女性，36岁，因口腔黏膜反复起水疱1年多就诊，起疱与进食无关，水疱可破溃形成溃疡。检查：下唇内侧黏膜有直径5mm的水疱，探针无法伸入水疱周围的黏膜下方，涂片未见Tzanck细胞。该患者的诊断可能是（）

- A. 疱型扁平苔藓
- B. 天疱疮
- C. 黏液囊肿
- D. 单纯疱疹

E. 类天疱疮 正确答案：E

15、单选 下列哪项因素与白斑发生无关（）

- A. 吸烟

- B. 机械刺激
- C. 白色念珠菌感染
- D. 身心因素
- E. 微量元素

正确答案：D

16、单选 下列疾病中哪一种属于非感染性疾病（）

- A. 手足口病
- B. 天疱疮
- C. 艾滋病
- D. 单纯疱疹
- E. 结核性溃疡 正确答案：B

17、单选 患者，女性，46岁，左下后牙2个月来遇冷、热过敏，食物嵌入牙内引起隐隐不适，近2天出现自发阵发痛，遇冷、热疼痛更加剧。检查发现左下6面深龋，冷诊(+++)，穿髓孔小，探痛(+++)，叩痛(±)，就诊时医生在局麻下开髓拔髓，未扩管，封CP药捻，当晚出现剧烈疼痛，牙松动III度，叩痛(++)。该牙经处理后出现上述剧烈疼痛，最可能的原因是（）

- A. 根尖周的细菌感染
- B. 药物对根尖周的化学性刺激
- C. 磨牙时的振动对根尖周的创伤
- D. 器械超出根尖孔所致
- E. 封洞太严密 正确答案：B

18、单选?幼儿不良习惯造成错<sup>𪗗</sup>时，应在几岁以后采用矫治器治疗（）

- A. 2岁
- B. 4岁
- C. 6岁
- D. 8岁
- E. 12岁

正确答案：C

19、单选 带状疱疹的病原菌是（）

- A. 柯萨奇病毒
- B. 单纯疱疹病毒
- C. 腺病毒
- D. 水痘-带状疱疹病毒
- E. 肠道病毒 正确答案：D

20、单选?不属于创伤<sup>𪗗</sup>临床表现的为（）

- A. 牙龈退缩
- B. 龈缘常有边缘突起
- C. 龈裂

D. 牙颈部楔状缺损

E. 牙龈松软

**正确答案：E**

21、单选 患者，男性，30岁，左颊部溃疡1周。口腔检查：左颊黏膜3处直径0.5cm左右溃疡，边界清楚，患者自感工作紧张，睡眠不好。曾患尿道炎、结膜炎，近日突感膝关节肿胀、疼痛，与该病无关的因素是（）

A. 遗传因素

B. 艾滋病

C. 精神因素

D. 感染因素

E. 免疫因素

**正确答案：C**

22、单选 患者，女性，45岁，6个月来双颊反复糜烂。查体示双颊多灶性广泛糜烂面，上覆假膜，周围见网状白纹，扪之质软；舌背中份黏膜见稍高出周围白色斑块，该区域舌乳头萎缩，周围黏膜少许白纹；皮肤（一）。自述体质偏弱。2周后复诊，双颊糜烂面基本愈合。此时治疗策略的重点在于（）

A. 消除白纹

B. 调节全身免疫状况

C. 抗炎，防止继发感染

D. 观察，定期复诊

E. 防止传染

**正确答案：B**

23、单选 调查某“时点”的患龋率时，该时点的长度一般不应超过（）

A. 1小时

B. 1月

C. 1周

D. 1天

E. 1年 **正确答案：B**

24、单选 梅毒黏膜斑发生在（）

A. 先天梅毒

B. 后天梅毒

C. 一期梅毒

D. 二期梅毒

E. 三期梅毒 **正确答案：D**

25、单选 血友病是缺乏（）

A. 维生素C

B. 维生素B12、叶酸

C. 烟酰胺

- D. 维生素 A
- E. 凝血因子
- F. 硫酸亚铁

**正确答案：E**

26、单选 关于艾滋病的诊断要素中，最有意义的是（）

- A. 高危人群
- B. 临床表现
- C. 抗 HIV 抗体
- D. CD4+ / CD8+T 淋巴细胞比值
- E. 机会性感染

**正确答案：C**

27、单选 患者，男性，60 岁，因上腭发白 6 个月就诊。查体示硬腭黏膜广泛呈灰白色，后份有多个红色点状物，扪诊质软；余口腔黏膜未见异常；皮肤（一）。印象诊断（）

- A. 口腔黏膜下纤维化
- B. 白斑
- C. 白色水肿
- D. 毛囊角化病
- E. 尼古丁性口炎

**正确答案：E**

28、单选 畸形中央尖折断引起牙髓或根尖周病变时，为保存患牙并促使牙根发育，可采用（）

- A. 牙髓塑化治疗
- B. 干髓术
- C. 牙髓切断术
- D. 根尖诱导成形术
- E. 盖髓术

**正确答案：D**

29、单选 烟酸缺乏症的临床表现中不包括（）

- A. 舌乳头萎缩
- B. 皮炎
- C. 腹泻
- D. 痴呆
- E. 阴囊炎

**正确答案：E**

30、单选 对于牙本质过敏首选的治疗方法有（）

- A. 药物脱敏
- B. 牙髓治疗
- C. 牙周洁治

- D. 垫底充填
- E. 树脂充填

**正确答案：A**

31、单选 男性，31岁。发现左侧阴囊软性肿块2年，平时无不适，卧位不消失。结婚4年未育。查体：左侧阴囊明显松弛下垂，似蚯蚓团块状物清晰可见，触之柔软，透光试验（-）。检查精液常规提示弱精症。最可能的诊断是（）。

- A. 睾丸鞘膜积液
- B. 交通性鞘膜积液
- C. 腹股沟斜疝
- D. 精索鞘膜积液
- E. 左侧精索静脉曲张

**正确答案：E**

32、单选 患者，男性，40岁，牙龈自发性出血就诊，可能的诊断中不包括（）

- A. 白血病
- B. 特发性血小板减少性紫癜
- C. 血友病
- D. 再生障碍性贫血
- E. 维生素C缺乏 **正确答案：E**

33、单选 瘢痕性类天疱疮的口腔损害常表现为（）

- A. 剥脱性龈炎样损害
- B. 松弛性水疱
- C. 过角化
- D. 色素脱失
- E. 肉芽肿性病变 **正确答案：A**

34、单选 口腔念珠菌病病损区涂片直接镜检可见（）

- A. 菌丝和孢子
- B. 梭状杆菌和螺旋体
- C. 包涵体
- D. 大量细菌及白细胞
- E. 分枝杆菌

**正确答案：A**

35、单选 患者40岁，左下第一磨牙深龋治疗时不慎穿髓，穿髓孔>1mm，该牙处理方法应选择（）

- A. 直接盖髓+永久充填
- B. 直接盖髓+安抚充填
- C. 失活术

- D. 活髓切断术
- E. 牙髓治疗

正确答案：E

36、单选 最早在牙面定居的细菌是（）

- A. 变异链球菌
- B. 血链球菌
- C. 轻链球菌
- D. 乳杆菌
- E. 放线菌

正确答案：B

37、单选 根管治疗中初尖锉是指（）

- A. 既能深入根管达到解剖根尖孔又稍有摩擦感的锉
- B. 能够到达生理根尖孔的锉
- C. 比主尖锉小三号的锉
- D. 能够到达解剖性根尖孔的锉
- E. 深入根管达到牙本质牙骨质界，又稍有摩擦感的第一支锉

正确答案：E

38、单选 下列关于扁平苔藓的临床特点的叙述哪一项是错误的（）

- A. 扁平苔藓可累及皮肤、口腔黏膜、指（趾）甲以及外生殖器
- B. 口腔黏膜损害多为单侧性，而皮肤病损大多左右对称
- C. OLP 累及牙龈可表现为剥脱性龈病损
- D. 斑块型 OLP 好发于舌背，有时与白斑难于鉴别
- E. 扁平苔藓病程慢性迁延，但大多数病例预后良好

正确答案：B

39、单选 斑块型扁平苔藓多发生于（）

- A. 颊黏膜
- B. 唇黏膜
- C. 口底黏膜
- D. 舌腹部黏膜
- E. 舌背黏膜

正确答案：E

40、单选 诊断畸形中央尖，下列哪一项错误（）

- A. 多见于下颌第二前磨牙
- B. 常为对称性发生
- C. 该尖位于面颊、舌尖处
- D. 呈圆锥形突起
- E. 牙尖折断后，易致牙髓坏死

正确答案：C

41、单选 无龋者为（）

- A. 出生 4 个月婴儿
- B. 出生 8 个月婴儿
- C. 6 岁儿童
- D. 16 岁少年
- E. 30 岁中年男性 **正确答案：A**

42、单选 以萎缩性舌炎为主要临床表现的舌乳头炎是（）

- A. 叶状乳头炎
- B. 菌状乳头炎
- C. 轮廓乳头炎
- D. 丝状乳头炎
- E. 菌状乳头炎和丝状乳头炎

**正确答案：D**

43、单选 患者，男性，48 岁，确诊为口腔黏膜下纤维性变 5 年，患者确诊后边治疗边咀嚼槟榔、吸烟，因右颊黏膜溃疡、疼痛 2 个月来医院就诊。 体检重点应是（）

- A. 口腔黏膜下纤维条索范围
- B. 张口度
- C. 溃疡形状、质地、边界浸润情况
- D. 舌活动情况
- E. 咬合关系

**正确答案：C**

44、单选 患者因后牙有洞要求治疗。查：右上 6 面龋，去腐后达牙本质中层，该牙的最佳处理为（）

- A. 聚羧酸锌水门汀垫底，银汞合金充填
- B. 磷酸锌水门汀垫底，银汞合金充填
- C. 玻璃离子水门汀充填
- D. 玻璃离子水门汀垫底，银汞合金充填
- E. 氧化锌丁香油糊剂垫底，银汞合金充填

**正确答案：A**

45、单选 下列除哪一项外均属于遗传病（）

- A. 遗传性良性上皮内角化病
- B. 先天性角化不全病（Zinssers 综合征）
- C. Lyell 综合征
- D. 白色海绵状斑痣
- E. 毛囊角化病

**正确答案：C**

46、单选 水痘-带状疱疹病毒是带状疱疹的致病病原体，当机体免疫力低下时，可以诱发带状疱疹。该病毒一般长期潜伏在（）

- A. 脊髓神经后根神经节
- B. 脊髓神经前根神经节
- C. 膝状神经节前根
- D. 膝状神经节后根
- E. 膝状神经节中根

正确答案：A

47、单选 可考虑手术治疗的疾病是（）

- A. 带状疱疹
- B. 疱疹性口炎
- C. 念珠菌性白斑
- D. 球菌性口炎
- E. 灼口综合征

正确答案：C

48、单选 备洞时，下列哪些措施容易造成对牙髓的损害（）

- A. 用锋利的器械
- B. 连续操作
- C. 用水冷却
- D. 不向髓腔方向施压
- E. 间断操作

正确答案：B

49、单选 口干症状常见于（）

- A. 白斑
- B. 复发性口腔溃疡
- C. 口腔念珠菌病
- D. 球菌性口炎
- E. 扁平苔藓

正确答案：C

50、单选 患者，女性，35岁，自觉口腔内黏膜发涩不适，有时口腔黏膜脱皮。检查发现两侧颊黏膜呈灰白色，有皱褶，触之柔软。患者62岁的母亲和6岁女儿口腔内也有类似病损。下列哪项处置方案是错误的（）

- A. 应用抗生素
- B. 可口服维A酸
- C. 与白斑鉴别
- D. 与扁平苔藓鉴别
- E. 无症状时不需处理

正确答案：A

51、单选 坏死性龈口炎的主要致病菌不包括（）

- A. 奋森螺旋体
- B. 梭形杆菌

C. 产气荚膜杆菌

D. 结核分枝杆菌

E. 化脓菌 **正确答案: D**

52、单选 下列关于火把花根（昆明山海棠）的说法错误的是（）

A. 最常见的副作用是胃肠道反应

B. 可用于糜烂型 OLP、盘状红斑狼疮、复发性口腔溃疡、天疱疮等的治疗

C. 少数育龄期女性可能引起月经紊乱，停用后不可恢复

D. 具有抗炎和抑制免疫的作用，短期用无类似糖皮质激素的副作用

E. 与雷公藤同属卫矛科 **正确答案: C**

53、单选 PC 活髓切断术时 FC 小棉球应放置的时间为（）

A. 1 分钟

B. 2 分钟

C. 3 分钟

D. 5 分钟

E. 8 分钟

**正确答案: A**

54、单选 唇部肿胀，有颗粒状结节的疾病是（）

A. 多形渗出性红斑

B. 浆细胞性唇炎

C. 盘状红斑狼疮

D. 扁平苔藓

E. 肉芽肿性唇炎

**正确答案: E**

55、单选 梅毒血清治愈是指抗梅毒治疗后（）

A. 2 年内梅毒血清反应由阳性转变为阴性，脑脊液检查阳性

B. 1 年内梅毒血清反应由阳性转变为阴性，脑脊液检查阴性

C. 2 年内梅毒血清反应由阳性转变为阴性，脑脊液检查阴性

D. 2 年以上梅毒血清反应由阳性转变为阴性，脑脊液检查阴性

E. 2 年内梅毒血清反应阳性，脑脊液检查阴性 **正确答案: C**

56、单选?患者，男性，13 岁，上前牙先天性畸形，要求矫治。检查：上中切牙切缘中央可见半月形缺陷，切缘比牙颈部狭窄，切牙之间有较大空隙。第一恒磨牙的牙尖皱缩，牙尖向中央偏斜，釉质发育不全，呈多个不规则的小结节和坑窝凹陷，散在于近𪔂面处。应诊断为（）

A. 一期梅毒

B. 二期梅毒

C. 获得性梅毒

D. 三期梅毒

E. 胎传梅毒

**正确答案：E**

57、单选 患者，女性，4个月，5周来口腔黏膜出现白色凝乳状的斑点及斑块，可擦掉；患儿啼哭，哺乳困难。应怀疑为（）

- A. 鹅口疮
- B. 复发性口腔溃疡
- C. 疱疹性龈口炎
- D. 球菌性口炎
- E. 克罗恩病 **正确答案：A**

58、单选 关于前牙人工牙排列的说法中，错误的是（）

- A. 如果多数前牙缺失，排牙时应该注意：两中切牙的近中触点应与面部中线一致，尤其是两个上中切牙的近中接触点，更应居中
- B. 如果缺隙大，可选择人工牙稍大于对侧天然牙排列，且将其近远中稍磨窄，切角稍磨钝，使其看起来显得略窄
- C. 如果缺隙过窄，人工牙不能够按照正常位置和数目排列，可将人工牙减径或者减数排列
- D. 如果缺隙大，多为原天然牙有牙间隙存在，排牙以后不应让牙齿间仍然保留小的间隙
- E. 如果缺隙过窄，人工牙不能够按照正常位置和数目排列，可将人工牙做不同程度的扭转、倾斜或与邻牙重叠

**正确答案：D**

59、单选 复发性阿弗他溃疡属于（）

- A. 口腔黏膜感染性疾病
- B. 口腔黏膜变态反应性疾病
- C. 口腔黏膜大疱类疾病
- D. 口腔黏膜斑纹类疾病
- E. 以上均不正确 **正确答案：E**

60、单选 以下哪项不符合淋病奈瑟菌性口炎的临床表现（）

- A. 可发生于上腭、颊、舌等口腔黏膜
- B. 黏膜充血发红
- C. 可有糜烂或浅表溃疡
- D. 被覆白色凝乳状斑点或斑片
- E. 假膜易擦去，呈现出血性创面 **正确答案：D**

61、单选 患者，男性，56岁，右侧舌缘中部黏膜溃疡3周。口腔检查：双下颌5、6残根，边缘锐利，右侧舌缘中部见0.6cm×0.8cm大小的溃疡，形态不规则，表面渗出较少，周围组织水肿明显，触诊稍硬。曾在外院治疗疼痛减轻，但溃疡未愈。该患者可能诊断为（）

- A. 腺周口疮
- B. 癌性溃疡

- C. 结核性溃疡
- D. 创伤性溃疡
- E. 化脓性肉芽肿

**正确答案：** D

62、单选 对盘状红斑狼疮鉴别诊断有重要意义的检查是 ( )

- A. 血常规
- B. 肝肾功能
- C. 血沉
- D. 放射检查
- E. 免疫荧光检查

**正确答案：** E

63、单选 舌扁桃体肥大的临床表现正确的是 ( )

- A. 早期舌体逐渐肿大，呈广泛而有对称性
- B. 舌根侧缘有结节状对称隆起，暗红色或淡红色
- C. 舌背有丘疹、结节、紫癜、出血等多种损害
- D. 损害在轮廓乳头前方，舌背正中后 1 / 3
- E. 好发于有系统疾病背景的中老年妇女

**正确答案：** B

64、单选 根尖囊肿诊断可靠的证据是 ( )

- A. 抽出黄色液体
- B. 抽出深灰色液体
- C. X 线检查有边界清晰的圆形透明区
- D. X 线检查透明区直径不超过 1cm
- E. 镜检观察到胆固醇结晶 **正确答案：** E

65、单选 与口角糜烂无关的因素 ( )

- A. B 族维生素缺乏，导致营养不良
- B. 细菌感染
- C. 先天遗传
- D. 真菌感染
- E. 老年无牙患者，颌间距缩短

**正确答案：** C

66、单选 根管治疗中最严重的并发症是 ( )

- A. 疼痛
- B. 侧穿根管壁
- C. 器械落入消化道
- D. 器械落入呼吸道
- E. 器械折断根管内 **正确答案：** D

67、单选 牙髓失活法最严重的并发症是 ( )

- A. 封药后疼痛
- B. 化学性骨坏死
- C. 急性牙髓炎
- D. 急性根尖炎

E. 均不正确 **正确答案：B**

68、单选 患者，男性，55岁，从事焊接工作35年，牙龈缘发黑就诊，检查发现右颊黏膜亦有棕黑色色素沉着斑，患者长期神经衰弱，伴有肌肉和关节酸痛，诊断可能是（）

- A. 铅中毒
- B. 汞中毒
- C. 铋中毒
- D. 磷中毒

E. 砷中毒 **正确答案：A**

69、单选 溃疡深大，边缘隆起，像“弹坑”，表面有灰黄色假膜，基底软（）

- A. 结核性溃疡
- B. 创伤性溃疡
- C. 癌性溃疡
- D. 腺周口疮
- E. 梅毒下疳

**正确答案：D**

70、单选 口腔扁平苔藓上皮基底膜区沉积的免疫球蛋白主要是（）

- A. IgA
- B. IgE
- C. IgM
- D. IgD

E. IgG **正确答案：C**

71、单选 对釉质发育不全的处理中哪一项是不必要的（）

- A. 修复缺损部分
- B. 牙面美观修复
- C. 口服钙片
- D. 全冠修复

E. 询问病史 **正确答案：C**

72、单选 患者，男性，36岁，口腔多处溃疡一周，疼痛影响进食。口腔检查：双颊、舌及口底可见粟米样溃疡十余个，散在分布，周围黏膜充血明显。患者以往多次类似发作史。诊断为（）

- A. 疱疹性咽峡炎
- B. 疱疹性龈口炎

- C. 白塞病
- D. 带状疱疹
- E. 疱疹样口炎

正确答案：E

73、单选 使用下列哪项根管冲洗液时必须使用橡皮障（）

- A. 过氧化氢液
- B. EDTA
- C. 次氯酸钠
- D. 氯己定
- E. 氯胺 T 钠

正确答案：C

74、单选 婴幼儿鹅口疮局部治疗通常选用（）

- A. 2%四环素溶液
- B. 3%硼酸溶液
- C. 1.5%过氧化氢溶液
- D. 2%碳酸氢钠溶液
- E. 0.05%甲紫水溶液

正确答案：D

75、单选 以下描述哪一项更符合天疱疮的临床表现（）

- A. 黏膜表面出现白色网状条纹
- B. 黏膜发红萎缩
- C. 黏膜表面呈白色斑块状
- D. 黏膜下质地较硬的肿块
- E. 黏膜表面出现不易愈合的糜烂

正确答案：E

76、单选 下列除哪一项外均好累及眼和口腔（）

- A. 遗传性良性上皮内角化病
- B. Steven-Johnson 综合征
- C. 瘢痕性类天疱疮
- D. 白塞病
- E. 大疱性类天疱疮

正确答案：E

77、单选 急性溃疡性坏死性龈炎的主要致病菌为（）

- A. 溶血性链球菌
- B. 白色念珠菌
- C. 变形链球菌
- D. 金黄色葡萄球菌
- E. 梭形菌及螺旋体

正确答案：E

78、单选 患者，女性，65岁。上下颌全口义齿，近2周下颌舌侧黏膜疼痛，戴义齿时明显，口腔检查：下颌舌侧与口底黏膜移行皱襞处椭圆形溃疡，表面有少许假膜，周围组织增生，边缘外翻。拟诊断为（）

- A. Riga-Fede 病
- B. Bednar 口疮
- C. 创伤性溃疡
- D. 黏膜血疱
- E. 癌性溃疡 **正确答案：C**

79、单选 患者，女性，20岁，4个月前右下后牙遇冷、热敏感，有时咀嚼不适，3天前突然发生自发性、阵发性疼痛，遇冷、热及夜间加剧，分不清患牙所在部位。对此疾病无帮助的检查方法是（）

- A. 探诊
- B. 叩诊
- C. X线片检查
- D. 扪诊
- E. 冷、热诊

**正确答案：D**

80、单选?女性患者40岁，10余年来左侧后牙反复发生疼痛。冷热刺激痛，夜间自发痛，在当地医院曾两次诊断为左侧~~5+4~~支三叉神经痛。住院、服药，因患者不同意而没作手术。患者面容痛苦，口腔卫生极差。现在仍服用“卡马西平”。检查口腔见左侧上下后牙多个牙有邻面深龋洞，均未治疗，要求医师诊治。应询问患者最重要的项目是（）

- A. 服药的效果
- B. 扳机点的存在
- C. 食物嵌塞情况
- D. 夜间疼痛情况
- E. 疼痛的性质

**正确答案：B**

81、单选 淋病治愈的标准是（）

- A. 治疗结束后2周内，在无性接触情况下症状体征全部消失；治疗结束后4~7天内，淋病奈瑟菌复查阴性
- B. 治疗结束后2周内，在无性接触情况下症状体征全部消失；治疗结束后2周内，淋病奈瑟菌复查阴性
- C. 治疗结束后4周内，在无性接触情况下症状体征全部消失；治疗结束后4~7天内，淋病奈瑟菌复查阴性
- D. 治疗结束后4周内，在无性接触情况下症状体征全部消失；治疗结束后2周内，淋病奈瑟菌复查阴性
- E. 治疗结束后2月内，在无性接触情况下症状体征全部消失；治疗结束后2个

月内，淋病奈瑟菌复查阴性

**正确答案：A**

82、单选 天疱疮疑似病例进行口腔组织活检时，活检部位应选择在（）

- A. 病损边缘，上皮完整处
- B. 溃疡中心
- C. 上皮组织缺失处
- D. 腮腺导管口
- E. 糜烂中心 **正确答案：A**

83、单选 扁平苔藓（）

- A. 癌前病变
- B. 癌前状态
- C. 既非癌前病变，也非癌前状态

**正确答案：B**

84、单选 不具有传染性的疾病是（）

- A. 瘢痕性类天疱疮
- B. 梅毒
- C. 艾滋病
- D. 单纯疱疹
- E. 手足口病 **正确答案：A**

85、单选 患者因上前牙有洞要求治疗，无自发痛。查上颌两切牙近中邻面龋，探敏，冷测一过性疼痛，去除刺激可缓解，热测同对照牙。诊断为深龋，该牙当日的最佳处理为（）

- A. 氧化锌丁香油糊剂安抚
- B. 氢氧化钙光敏树脂充填
- C. 光敏树脂充填
- D. 玻璃离子水门汀充填
- E. 牙髓治疗

**正确答案：B**

86、单选 下列哪组体液在 HIV 传播上起主要作用（）

- A. 血液、精液和宫颈液
- B. 血液、精液和汗液
- C. 血液、宫颈液和脑脊液
- D. 血液、精液和唾液
- E. 血液、泪液和乳汁

**正确答案：A**

87、单选 银汞合金中合金粉由哪几种金属材料组成（）

- A. 银、锡、铁、铅
- B. 银、锡、铜、锌
- C. 银、锡、铜、铅

- D. 银、锡、铜、铁
- E. 银、铁、铜、锌

**正确答案：**B

88、单选 天疱疮患者出现口腔念珠菌感染时，应选择何种药物配合治疗（）

- A. 抗生素
- B. 胸腺肽
- C. 硫唑嘌呤
- D. 维生素
- E. 氟康唑

**正确答案：**E

89、单选 手足口病的皮肤病损主要表现为（）

- A. 靶形红斑
- B. 结节性红斑
- C. 出现红斑及大水疱
- D. 紫红色扁平丘疹
- E. 玫瑰红色斑丘疹，上有小水疱

**正确答案：**E

90、单选 女性，36岁，因口腔黏膜起疱、并反复复发一年就诊，起疱与进食无关，疱损可破溃形成溃疡。临床检查可见：下唇内侧黏膜有直径5mm水疱，探针无法探入疱损周围黏膜下，涂片未见Tzanck细胞。患者不曾用过任何免疫治疗。本病组织病理学的特点应是（）

- A. 基底细胞液化变性
- B. 上皮下疱形成
- C. 有致密淋巴细胞浸润带
- D. 上皮内疱形成
- E. 出现胶样小体

**正确答案：**B

91、单选 多形红斑的典型皮肤损害为（）

- A. 溃疡散在分布呈“满天星”样
- B. 溃疡与刺激因素相吻合，有契合现象
- C. 针刺反应阳性
- D. 结节性红斑
- E. 靶形红斑

**正确答案：**E

92、单选 疱疹型阿弗他溃疡的特征是（）

- A. 一般1~5个溃疡，直径2~4mm，多发生于唇颊黏膜
- B. 多为单个大溃疡，直径超过1cm，多发于颊、软腭等处黏膜
- C. 数目多，直径大小变化很大，可见明显的局部刺激因素
- D. 溃疡单发，病程长，呈潜掘状

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/808136053031006055>