

口腔医学主治医师：口腔内科学必看考点五

1、单选 装盒时，人工牙的面与上层型盒顶部之间的间隙至少应该有（）

- A. 2~4mm
- B. 4~6mm
- C. 6~8mm
- D. 8~10mm

E. 10mm 以上 **正确答案：E**

2、单选 （江南博哥）先天缺牙最少见于（）

- A. 下颌第二前磨牙
- B. 上颌侧切牙
- C. 上颌第三磨牙
- D. 下颌第三磨牙
- E. 中切牙

**正确答案：E**

3、单选 关于带状疱疹，最主要最具诊断意义的临床表现是（）

- A. 发病多见于春秋季节
- B. 发病前可有发烧，全身不适，食欲减退等前驱症状
- C. 一般不留斑痕，可留一时性的色素沉着斑
- D. 疱疹沿神经单侧分布，不越过中线
- E. 病毒可侵犯面神经，造成面瘫、耳聋等症状 **正确答案：D**

4、单选 支托不具有以下哪种作用（）

- A. 支持、传递力
- B. 作间接固位体
- C. 固位作用
- D. 防止食物嵌塞

E. 恢复咬合接触 **正确答案：C**

5、单选 以下描述哪一项不符合良性黏膜类天疱疮的特点（）

- A. 老年女性多见
- B. 属自身免疫性疾病
- C. 棘层松解
- D. 病损好发于口腔、眼结合膜等体窍黏膜
- E. 基底膜区出现线状沉积的 IgG 抗体

**正确答案：C**

6、单选 患者，3 天来下后牙遇冷水痛，吐出后痛持续 10 秒，平时无明显不适。该患者最可能的牙病是（）

- A. 慢性牙髓炎
- B. 楔状缺损
- C. 可复性牙髓炎

- D. 急性牙髓炎
- E. 邻面中龋

**正确答案：C**

7、单选 患者，男性，32岁，反复发作口腔溃疡1年，近半年阴茎发生溃疡2次，检查：颊、下唇、舌背黏膜各见一约绿豆大小的溃疡，圆形，表面有黄色假膜，周围红晕，手背静脉注射处可见小脓疱。该患者在体检时，除外哪项体征，其余可能出现（）

- A. 口腔溃疡
- B. 皮肤结节性红斑
- C. 针刺反应阳性
- D. 皮肤蝶形红斑
- E. 虹膜睫状体炎

**正确答案：D**

8、单选 下列哪个牙的患龋频率最高（）

- A. 上颌第一前磨牙
- B. 上颌第一磨牙
- C. 上颌第二磨牙
- D. 下颌第一磨牙
- E. 下颌第二磨牙

**正确答案：D**

9、单选 患者，男性，42岁，数月来右下后牙常进食后疼痛，偶自发痛及冷、热刺激痛，自服抗生素可缓解，1天前进食后复发。检查：见口腔卫生差，龈上、下结石多，牙龈轻度充血水肿，右下6、7、8牙体完整，右下7叩（+），右下8颊向错位，伸长无对颌，右下8与右下7之间有较多食物残渣，龈乳头中度充血水肿，压痛，未探及牙周袋，右下6、7、8X线片未见异常。最关键的解决办法是（）

- A. 拔除右下8
- B. 拔除右下8，根管治疗右下7
- C. 全口龈上、下洁治
- D. 右下7、8牙周冲洗上药
- E. 以上都不对

**正确答案：A**

10、单选 二期梅毒的主要口腔黏膜表现是（）

- A. 红斑
- B. 硬下疳
- C. 靶形红斑
- D. 树胶肿
- E. 黏膜斑

**正确答案：E**

11、单选 男性患者，38岁，10年来左侧后牙反复发生疼痛。冷热水引起剧痛，发作时夜间痛醒，在当时工院曾两次诊断为左侧Ⅱ、Ⅲ支三叉神经痛。住院、服药，因患者不同意而未作手术治疗。患者面容痛苦，口腔卫生极差。现在仍服用“卡马西平”。检查口腔见左侧上下后牙多个有邻面深龋，均未治疗，要求医师诊治。应询问患者最重要的项目是（）

- A. 服药的效果
- B. 扳机点的存在
- C. 食物嵌塞情况
- D. 夜间痛情况
- E. 疼痛的性质

**正确答案：B**

12、单选 患者，女性，10岁，舌背反复出现红色斑片1年，病损形态时常变换，一般无疼痛。检查：舌背及舌缘有一红色区域，丝状乳头萎缩，周边为黄白色的围线，界限分明。以下可能是该病的病因，除了（）

- A. 舔舌习惯
- B. 消化不良
- C. 肠寄生虫
- D. 病灶感染
- E. 遗传因素

**正确答案：A**

13、单选 行乳牙牙髓治疗最有利的时期是（）

- A. 牙髓暴露、牙根吸收时期
- B. 牙脱落期
- C. 牙根稳定期
- D. 以上均不是
- E. 以上均是

**正确答案：C**

14、单选 患者，男性，26岁，单侧口角细小横纹皴裂，并出现多个成簇的疱，糜烂、结痂10天，伴红肿、疼痛明显，局部皮肤黏膜变厚。诊断考虑为（）

- A. 念珠菌性口角炎
- B. 疱疹性口角炎
- C. 球菌性口角炎
- D. 创伤性口角炎
- E. 毒物性口角炎
- F. 营养不良性口角炎
- G. 接触性口角炎

**正确答案：B**

15、单选？

患者，男性，25岁，口角糜烂6个月就诊。检查：双侧口角湿白、糜烂、皸裂、结痂，唇部干燥脱屑。经维生素B2治疗后症状缓解。

该病还能出现下列哪项损害（）

- A. 牙龈出血
- B. 阴囊炎
- C. 腹泻
- D. 痴呆
- E. 呕吐

**正确答案：**B

16、单选 皮肤黏膜淋巴结综合征的临床表现不包括（）

- A. 发热
- B. 淋巴结肿大
- C. 杨梅舌
- D. 皮疹
- E. 黏膜黑色素斑

**正确答案：**E

17、单选 人工牙排列要有平衡的主要原因（）

- A. 使接触面积广
- B. 使咀嚼效率高
- C. 使义齿稳定
- D. 使义齿看起来美观
- E. 纠正偏侧咀嚼习惯 **正确答案：**C

18、单选 釉质发育不完全与平滑面浅龋的鉴别，下列哪项错误（）

- A. 前者有牙体形态缺陷，但探诊质硬
- B. 前者牙面釉质缺损的部位较恒定
- C. 后者有釉质色泽及硬度改变
- D. 前者釉质有光泽
- E. 前者多累及同一时期发育的一组牙 **正确答案：**B

19、单选 引起根尖周病的原因主要是感染，感染源主要是（）

- A. 牙周膜炎
- B. 牙周袋内容物
- C. 牙髓腔内容物
- D. 血源性
- E. 腺源性 **正确答案：**C

20、单选 急性骨膜下脓肿的首诊处理是（）

- A. 开髓开放
- B. 开髓封失活剂
- C. 开髓拔髓开放

D. 麻醉拔髓+根管封药

E. 开髓开放+切开引流 **正确答案：E**

21、单选 患者，男性，56岁，右侧舌缘中部黏膜溃疡3周。口腔检查：双下颌5、6残根，边缘锐利，右侧舌缘中部见0.6cm×0.8cm大小的溃疡，形态不规则，表面渗出较少，周围组织水肿明显，触诊稍硬。曾在外院治疗疼痛减轻，但溃疡未愈。该病例首选治疗措施为（）

- A. 局部止痛
- B. 拔除下颌5、6残根
- C. 观察，不处理
- D. 活检
- E. 口服抗生素 **正确答案：B**

22、单选 沟纹舌以沟纹或裂纹为特征，它的裂纹最深可及（）

- A. 黏膜层
- B. 固有层
- C. 穿通舌体
- D. 基层层
- E. 黏膜下层或肌层

**正确答案：E**

23、单选 患者，女性，20岁。因左侧后牙遇甜食物不适就诊。检查：左下6龋洞，中等深，探软、稍敏感，冷刺激进洞后稍敏感，冷热试验与对照牙相同。该患牙诊断可能为（）

- A. 浅龋
- B. 中龋
- C. 深龋
- D. 牙髓充血
- E. 慢性牙髓炎

**正确答案：B**

24、单选 患者，男性，32岁，反复发作口腔溃疡1年，近半年阴茎发生溃疡2次，检查：颊、下唇、舌背黏膜各见一约绿豆大小的溃疡，圆形，表面有黄色假膜，周围红晕，手背静脉注射处可见小脓疱。该病属于（）

- A. 自身免疫病
- B. 细菌感染
- C. 病毒感染
- D. 传染性疾病
- E. 变态反应性疾病

**正确答案：A**

25、单选 患者，男性，20岁，牙龈自发性出血伴牙龈肿胀6个月就诊。检查发现牙龈结节状增生，累及龈缘及附着龈，牙龈及口腔黏膜苍白；乏力、低烧。该患者的口腔治疗措施是（）

- A. 口服抗生素
- B. 龈下刮治
- C. 超声洁治
- D. 口腔治疗以保守治疗为主
- E. 牙龈切除术 **正确答案: D**

26、单选?患者，男性，13岁，上前牙先天性畸形，要求矫治。检查：上中切牙切缘中央可见半月形缺陷，切缘比牙颈部狭窄，切牙之间有较大空隙。第一恒磨牙的牙尖皱缩，牙尖向中央偏斜，釉质发育不全，呈多个不规则的小结节和坑窝凹陷，散在于近𪙗面处。应诊断为（）

- A. 一期梅毒
- B. 二期梅毒
- C. 获得性梅毒
- D. 三期梅毒
- E. 胎传梅毒

**正确答案: E**

27、单选 以下哪种是盘状红斑狼疮的诱发因素（）

- A. 饮食过量
- B. 饮茶过量
- C. 高脂肪食物
- D. 念珠菌感染
- E. 药物（如胍屈嗪） **正确答案: E**

28、单选 下列哪项不是白色水肿的特点（）

- A. 白色水肿质地柔软
- B. 白色水肿有皱褶
- C. 白色水肿表面光滑
- D. 白色水肿无上皮角化层
- E. 白色水肿棘层细胞肿胀

**正确答案: D**

29、单选 猩红热的口腔黏膜表现（）

- A. 黏膜斑或科普利克斑（Koplik spots）
- B. 点状、片状灰白色假膜，不易拭去
- C. 白色或红色杨梅舌
- D. 白色网纹状改变
- E. 口腔黏膜充血，成簇分布的小水疱

**正确答案: C**

30、单选 上皮细胞间失去了连接，属于自身免疫病的疾病是（）

- A. 类天疱疮
- B. 多形红斑

- C. 红斑狼疮
- D. 天疱疮
- E. 白塞病

**正确答案：D**

31、单选 患者，女性，32岁。主诉：左上后牙牙龈肿大1年余，无明显疼痛。检查：左上3、4间颊侧龈乳头处见一椭圆形增生物，质地较韧，探易出血，未探及龈下牙石。X线片示：左上3、4间骨密度减低。最可能的诊断为（）

- A. 龈缘炎
- B. 牙龈瘤
- C. 牙龈增生
- D. 龈乳头炎
- E. 青春期龈炎

**正确答案：B**

32、单选 患儿，男性，2个月，进食时啼哭，进食困难一周。口腔检查：腭部中央接近软硬腭交接处一个直径1.0cm的溃疡，表面有淡黄色假膜，边缘隆起不明显，亦无明显充血，触诊基底稍硬，患儿疼痛，母亲因产一对双胞胎乳汁不足，采用母乳加奶粉混合喂养患儿，该溃疡最可能是（）

- A. 结核性溃疡
- B. 梅毒
- C. Bednar 溃疡
- D. Riga-Fede 溃疡
- E. 腺周口疮

**正确答案：C**

33、单选 男性患者，56岁，2周前发现右下后牙龈有小包，平时无明显不适，右下第一前磨牙咬合面龋深及髓腔，牙髓无活力，叩痛（-），X线片见：右下第一前磨牙根尖透射区不规则，边界模糊。治疗设计应为（）

- A. 充填治疗
- B. 盖髓治疗
- C. 根管治疗
- D. 塑化治疗
- E. 根尖手术

**正确答案：C**

34、单选 白色念珠菌在不利的环境中形成（）

- A. 芽生孢子
- B. 假菌丝
- C. 厚壁孢子
- D. 菌落
- E. 其他形式

正确答案：C

35、单选 不影响龋病发生的因素（）

- A. 牙的解剖外形
- B. 牙在牙弓中的位置
- C. 口腔卫生
- D. 含氟牙膏的使用
- E. 牙的数目

正确答案：E

36、单选 氯喹一般不适用于下列哪种疾病治疗（）

- A. 口腔白斑（OLK）
- B. 口腔扁平苔藓（OLP）
- C. DLE
- D. 结节病
- E. 光化性唇炎

正确答案：A

37、单选 腺周口疮的损害特点是（）

- A. 溃疡数量多而深
- B. 溃疡为圆形散在分布
- C. 单个溃疡，基底硬结
- D. 单个溃疡深而大
- E. 口腔溃疡常伴生殖器损害

正确答案：D

38、单选 患者，男性，26岁，舌部溃疡1个月。患者近2月来，低热、乏力、盗汗。体检：舌部右侧溃疡，较深，约1cm×0.5cm，边缘不齐，表面假膜，基底有细小的颗粒状结节，触痛明显。为尽早做出诊断，首选的检查方法为（）

- A. 血培养
- B. 胸透或胸片
- C. 标本动物接种
- D. 结核菌素试验
- E. 活检

正确答案：E

39、单选 患儿，女，8岁半，右上颌1外伤冠折，1切角缺损，即刻来院就诊。口腔检查：穿髓孔大，探痛（+++），叩痛（±）。若治疗成功，家长要求修复缺损的牙冠应（）

- A. 桩冠修复
- B. 局麻备牙，全冠修复
- C. 打固位钉，复合树脂充填
- D. 切角嵌体

E. 解释病情，待患儿成年后再做修复 **正确答案：C**

40、单选 带状疱疹最常见于（）

- A. 面部
- B. 唇颊部
- C. 舌腭部
- D. 胸腹或腰部
- E. 四肢

**正确答案：D**

41、单选 下面哪些疾病愈合后可能形成瘢痕（）

- A. 轻型阿弗他溃疡
- B. 重型阿弗他溃疡
- C. 疱疹样阿弗他溃疡
- D. 牙龈炎
- E. 沟纹舌

**正确答案：B**

42、单选 烟酸缺乏症的临床表现中不包括（）

- A. 舌乳头萎缩
- B. 皮炎
- C. 腹泻
- D. 痴呆
- E. 阴囊炎

**正确答案：E**

43、单选 口腔结核在口腔中的损害以溃疡为多见，其发病特点错误的是（）

- A. 患者多无肺结核病史
- B. 病损常覆盖黄白色假膜
- C. 溃疡基底不平，可形成肉芽
- D. 溃疡边缘似蚕蚀样微突起，有倒凹
- E. 溃疡边缘隆起，似火山口样 **正确答案：E**

44、单选 形成四环素牙的原因是（）

- A. 服用四环素类药物过量
- B. 用四环素类药物漱口
- C. 根管冲洗时使用了金霉素液
- D. 牙发育矿化期间，服用了四环素类药物
- E. 妊娠期间服用四环素类药物对牙无影响 **正确答案：D**

45、单选?患者，男性，48岁，2周前发现左侧舌缘偏腹侧有1.5cm<sup>2</sup>鲜红色区域，病损区域内有散在的白色斑点，吃热、咸食时有疼痛感觉，触诊病损区，质地尚软，临床考虑为间杂型红斑。由社区医院转入口腔专科医院进行诊治。局部检查重点应是（）

- A. X 线检查
- B. 免疫荧光检查
- C. 涂片检查
- D. 局部切取活检
- E. 唾液流量检查

**正确答案：** D

46、单选 白色水肿（）

- A. 癌前病变
- B. 癌前状态
- C. 既非癌前病变，也非癌前状态

**正确答案：** C

47、单选 患者，男性，出生 5 天，啼哭拒食，口腔颊黏膜出现微凸的柔软白色针头大小斑点，擦去后可露出红色糜烂出血面。该患儿局部治疗通常选用（）

- A. 2%四环素溶液
- B. 3%硼酸溶液
- C. 1.5%过氧化氢溶液
- D. 2%碳酸氢钠溶液
- E. 0.05%甲紫水溶液

**正确答案：** D

48、单选 下列除哪一项外一旦确诊后应行外科手术根治（）

- A. 颊黏膜内侧三角形口角区颗粒状白斑
- B. 牙槽嵴疣状白斑
- C. 舌腹红斑（赤斑）
- D. 下唇 DLE 继发鳞状细胞癌
- E. 牙龈斑块状白斑

**正确答案：** E

49、单选 急性多发性龈脓肿与牙周脓肿的不同之处在于（）

- A. 皆发生于牙周炎患者
- B. 脓肿一般接近根尖
- C. 全口多个牙泛发
- D. 治愈后牙龈不能完全恢复正常
- E. 可探及深牙周袋

**正确答案：** C

50、单选 牙冠外伤牙本质暴露时的修复应在（）

- A. 即刻
- B. 2 周后
- C. 4 周后

D. 6~8 周后

E. 3 个月后 **正确答案: D**

51、单选 外伤所致的前牙根尖 1 / 3 处折断、不松动病例，选择的处理应为 ( )

- A. 定期观察
- B. 牙髓治疗
- C. 固定并定期观察
- D. 调𪙇
- E. 拔除

**正确答案: A**

52、单选 巨幼红细胞性贫血 ( )

- A. 小细胞低色素性贫血
- B. 凝血因子缺乏
- C. 外周血白细胞减少
- D. 全血细胞减少
- E. 白细胞大量增生
- F. 维生素 B12、叶酸缺乏

**正确答案: F**

53、单选 斑块型扁平苔藓多发生于 ( )

- A. 颊黏膜
- B. 唇黏膜
- C. 口底黏膜
- D. 舌腹部黏膜
- E. 舌背黏膜

**正确答案: E**

54、单选 病损分布于口腔后部，为丛集小水疱，牙龈不受侵犯，全身反应轻，应诊断为 ( )

- A. 口炎型口疮
- B. 疱疹性龈口炎
- C. 带状疱疹
- D. 疱疹性咽峡炎
- E. 手足口病 **正确答案: D**

55、单选 患者，男性，2 岁，口腔黏膜突发簇集的针头大小透明疱疹及溃疡，伴啼哭声，流涎，发热，拟诊断为 ( )

- A. 口腔白色念珠菌病
- B. 疱疹性口炎
- C. 急性溃疡坏死性龈炎
- D. 复发性口疮

E. 单纯性疱疹

**正确答案：B**

56、单选 患者，男性，42岁，数月来右下后牙常进食后疼痛，偶自发痛及冷、热刺激痛，自服抗生素可缓解，1天前进食后复发。检查：见口腔卫生差，龈上、下结石多，牙龈轻度充血水肿，右下6、7、8牙体完整，右下7叩(+)，右下8颊向错位，伸长无对颌，右下8与右下7之间有较多食物残渣，龈乳头中度充血水肿，压痛，未探及牙周袋，右下6、7、8X线片未见异常。最可能的诊断是( )

- A. 右下7牙髓炎
- B. 右下8牙髓炎
- C. 右下7、8龈乳头炎
- D. 右下7、8单纯性龈炎
- E. 右下7牙周-牙髓联合病变

**正确答案：C**

57、单选 口腔念珠菌病最主要的病原菌是( )

- A. 高里念珠菌
- B. 假热带念珠菌
- C. 白色念珠菌
- D. 热带念珠菌
- E. 类星形念珠菌 **正确答案：C**

58、单选 口腔医护人员意外职业性暴露于患者的血液，应采取的措施是( )

- A. 立即用肥皂水和清水冲洗皮肤或清水冲洗黏膜
- B. 若污染源被临床证实为HIV阴性，应观察并检测6个月血清HIV抗体至阴性为止
- C. 若污染源为HIV阳性，除局部清洗外，应立即给予AZT、3TC和IDV联合治疗4周，并定期检测血清HIV抗体，达6个月
- D. 立即采集患者的血样进行HIV检测
- E. 以上都对

**正确答案：E**

59、单选 下列除哪一项外均有可能诱发或加重DLE患者的病情( )

- A. 长期服用胍屈嗪类药物治疗高血压
- B. 喜食芹菜、无花果、苜蓿、菠菜、黄泥螺等
- C. 育龄期妇女口服含雌激素的避孕药
- D. 外出时戴遮阳帽并涂抹遮光剂
- E. 寒冷刺激、精神紧张等 **正确答案：D**

60、单选?幼儿不良习惯造成错~~畸~~时，应在几岁以后采用矫治器治疗( )

- A. 2岁
- B. 4岁

- C. 6 岁
- D. 8 岁
- E. 12 岁

**正确答案：C**

61、单选 患者，女，22 岁，左上前牙冷热刺激痛 1 年，出现自发痛及夜间痛 1 周。检查：左上中切牙近中龋洞，探及大量腐质，热测引起剧烈疼痛，刺激去除后仍持续十几秒，叩（一），牙龈正常。最适当的处理为（）

- A. 局麻下开髓封“三聚甲醛”
- B. 拔除患牙
- C. 去净腐质，安抚治疗
- D. 局麻下行根管预备
- E. 局麻下行活髓切断术 **正确答案：D**

62、单选 关于甲硝唑，哪一项不正确（）

- A. 不能与降压药一起使用
- B. 酗酒者慎用
- C. 妊娠者慎用
- D. 长期服用者需查血
- E. 患感冒者慎用 **正确答案：E**

63、单选 天疱疮疑似病例进行口腔组织活检时，活检部位应选择在（）

- A. 病损边缘，上皮完整处
- B. 溃疡中心
- C. 上皮组织缺失处
- D. 腮腺导管口
- E. 糜烂中心 **正确答案：A**

64、单选 下列哪项符合牙髓切断术适应证（）

- A. 根尖孔尚未发育完全，因机械性或外伤性露髓的年轻恒牙
- B. 根尖已发育完全，机械性或外伤性露髓，穿髓孔直径不超过 0.5mm 的恒牙
- C. 龋源性、外伤性或机械性露髓，根尖未发育完成的年轻恒牙
- D. 龋源性露髓的乳牙
- E. 根尖已发育完全，机械性或外伤性露髓，穿髓孔直径不超过 1.0mm 的恒牙 **正确答案：C**

65、单选 引起氟牙症的水源中含氟浓度是（）

- A. 超过 2ppm
- B. 低于 1ppm，超过 0.5ppm
- C. 超过 1ppm，小于 2.0ppm
- D. 超过 0.2ppm，小于 0.5ppm
- E. 超过 0.1ppm，小于 0.5ppm **正确答案：A**

66、单选 关于 HIV 相关性口腔念珠菌病，以下哪一种说法是错误的（）

- A. 为 AIDS 的早期口腔表征之一
- B. 是 AIDS 患者最常见的机会真菌感染
- C. 分离念珠菌株生物型鉴定主要为白色念珠菌
- D. 较其他口腔念珠菌病患者，同一患者口腔内分离出多个生物型念珠菌株几率增加
- E. 往往抗真菌治疗无效

**正确答案：E**

67、单选 患者，男性，18 岁，牙龈疼痛 1 周、检查：口臭明显，软垢多，牙龈充血肿胀，探易出血，下前牙部分龈乳头低平。与该病发生关系最密切的微生物是（）

- A. 螺旋体
- B. 变形链球菌
- C. 单纯疱疹病毒
- D. 带状疱疹病毒
- E. 葡萄球菌

**正确答案：A**

68、单选 患者，女性，20 岁，4 个月前右下后牙遇冷、热敏感，有时咀嚼不适，3 天前突然发生自发性、阵发性疼痛，遇冷、热及夜间加剧，分不清患牙所在部位。最应与什么疼痛鉴别（）

- A. 急性上颌窦炎
- B. 三叉神经痛
- C. 牙周炎
- D. 根尖周炎
- E. 急性中耳炎

**正确答案：B**

69、单选 牙颈部脱敏最好用（）

- A. 碘化银法
- B. 氨硝酸银法
- C. 氟化钠法
- D. 碘酚法
- E. 离子导入法

**正确答案：C**

70、单选 男性，65 岁，高热 3 天，昏迷 1 天。尿酮体（-），血糖 38mmol / L，血钠 155mmol / L，血浆渗透压 340mmol / L，尿素氮 13.5mmol / L。最可能的诊断为（）。

- A. 酮症酸中毒昏迷
- B. 高渗性非酮症昏迷
- C. 乳酸酸中毒

- D. 脑梗死
- E. 低血糖昏迷

**正确答案：** B

71、单选 一男性患者，42岁，3天来右下后牙阵发性自发痛，冷热刺激引起痛或加剧痛，昨夜痛不能入睡，而来就诊。该患者半年来右下后牙有龋洞，咬物痛，两个月前曾有过类似发作，服去痛片后缓解，未做其他治疗。临床检查最可能发现的是（）

- A. 右下后牙深及牙髓的龋洞
- B. 热刺激引起疼痛，冷刺激使疼痛缓解
- C. 叩痛（+++）
- D. 电活力测定无反应
- E. X线片示根尖周透影区

**正确答案：** A

72、单选 怀疑念珠菌性白斑患者，活检后宜选取的特殊染色是（）

- A. S100 特染
- B. 革兰染色
- C. 负染色
- D. PAS 染色
- E. HE 染色

**正确答案：** D

73、单选 患者，男性，50岁。近来感觉口腔黏膜粗糙，涩感，偶然发现舌右侧黏膜有1cm<sup>2</sup>大小白色斑块状改变，白斑表面有小颗粒，稍微隆起高出黏膜面。检查见局部为非均质性白色斑块，触诊白色斑块基底稍微发硬，黏膜尚无破溃。根据临床表现考虑何种疾病（）

- A. 白塞病
- B. 白斑
- C. 扁平苔藓
- D. 游走性舌炎
- E. 沟纹舌

**正确答案：** B

74、单选 梅毒传染源不包括（）

- A. 感染梅毒螺旋体的患者
- B. 带有梅毒螺旋体的毛巾
- C. 带有梅毒螺旋体的内衣
- D. 感染梅毒螺旋体的血液
- E. 感染梅毒螺旋体的猫

**正确答案：** E

75、单选 以下哪项不是氯化喹啉的副作用（）

- A. 恶心、呕吐

- B. 白细胞数降低
- C. 视力损害
- D. 血压降低
- E. 肝功能损害 **正确答案: D**

76、单选 复发性单纯疱疹性口炎与复发有关的诱因不包括 ( )

- A. 局部机械损伤
- B. 过度疲劳
- C. 妇女月经期
- D. 微量元素缺乏
- E. 感冒等发热性疾病

**正确答案: D**

77、单选 患者，女性，36岁，因咽痛服磺胺片后，舌背起疱，破溃后疼痛难忍，进食受限。以往曾有类似病史，检查：舌背黏膜表面可见0.8cm×1.2cm，界限清楚的糜烂面，表面有黄色假膜，渗出较多。下列实验室检查对确诊最有帮助的是 ( )

- A. 血常规及分类
- B. 血沉
- C. 出、凝血时间
- D. 嗜酸细胞直接计数
- E. 血清钙

**正确答案: D**

78、单选 口腔扁平苔藓最常见的发病部位是 ( )

- A. 颊黏膜
- B. 舌黏膜
- C. 唇黏膜
- D. 腭黏膜
- E. 口底黏膜

**正确答案: A**

79、单选 扁平苔藓皮肤病损表现为 ( )

- A. 皮肤结节性红斑
- B. 暗红色多角形丘疹
- C. 皮肤溃疡
- D. 皮肤糜烂
- E. 皮肤靶形红斑 **正确答案: B**

80、单选 口腔结核病损最常见的形式为 ( )

- A. 结核初疮
- B. 结核性溃疡
- C. 寻常狼疮

- D. 结核性骨髓炎
- E. 结核性根尖周炎 **正确答案: B**

81、单选 梅毒硬下疳可于什么时候自行愈合 ( )

- A. 感染后 1~2 周
- B. 感染后 3~8 周
- C. 感染后 9~12 周
- D. 感染后 1~2 年
- E. 感染后 2 年以上 **正确答案: B**

82、单选 牙髓电活力试验患牙读数比对照牙明显不同, 可判断患牙 ( )

- A. 有无隐裂
- B. 牙髓是否坏死
- C. 有无咬合创伤
- D. 是否为急性牙髓炎
- E. 有无牙髓充血 **正确答案: B**

83、单选 患儿, 女性, 2 岁。以高烧 3 天、口腔溃疡 2 天, 啼哭、流涎、拒食来诊。体检发现患儿全口牙龈红肿, 上腭及舌背黏膜可见汇集成簇的针头大小透明水疱, 部分已破溃为浅表溃疡, 周围黏膜充血水肿广泛。本病例感染的病原体可能为 ( )

- A. 金黄色葡萄球菌
- B. 柯萨奇病毒 A
- C. 单纯疱疹病毒
- D. 肺炎链球菌
- E. 白色念珠菌

**正确答案: C**

84、单选 平滑面菌斑中, 丝状微生物排列呈栅栏状出现于菌斑的哪一层结构中 ( )

- A. 菌斑-牙界面
- B. 稠密微生物层
- C. 表膜下层
- D. 菌斑体部
- E. 菌斑表层 **正确答案: D**

85、单选?患者, 女性, 40 岁, 半年来觉下前牙龈增生, 影响美观, 偶刷牙出血。检查: 见下前牙唇侧牙龈轻度增生, 质地有弹性, 色近正常, 探及少量龈上及龈下结石。

若患者长期服用硝苯地平, 则最根本的治疗是 ( )

- A. 龈上、下洁治辅以手术修整牙龈外形
- B. 拔除累及牙
- C. 手术切除和修整牙龈外形

D. 停药或换其他药

E. 彻底消除菌斑 **正确答案: D**

86、单选?患者，女性，50岁，突发高热、畏寒，右颊部出现坏死性溃疡，伴右颌下淋巴结肿大，外周血中性粒细胞绝对数为  $0.4 \times 10^9/L$ ，最可能的诊断是（）

A. 再生障碍性贫血

B. 粒细胞缺乏症

C. 白血病

D. 粒细胞减少症

E. 特发性血小板减少性紫癜

**正确答案: B**

87、单选 患者，男性，65岁，蓄电池厂退休职工，因牙龈发黑就诊。检查：口腔卫生较差，前牙牙龈缘呈蓝黑色，左颊、下唇黏膜亦有棕黑色色素沉着斑。患者长期神经衰弱，并有头痛、头晕等症状。下列哪项可用于治疗该病（）

A. EDTA-CaNa<sub>2</sub>

B. NaCl

C. 5%二巯磺钠

D. FeSO<sub>4</sub>

E. Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>

**正确答案: A**

88、单选 容易发生在有夜涎、体弱患者的口腔念珠菌病类型是（）

A. 急性假膜型念珠菌病

B. 急性萎缩型念珠菌病

C. 慢性肥厚型念珠菌病

D. 慢性萎缩型念珠菌病

E. 念珠菌性口角炎

F. 慢性黏膜皮肤念珠菌病

**正确答案: E**

89、单选 牙纵折后最明显的症状是（）

A. 牙伸长感

B. 咀嚼痛

C. 牙叩痛

D. 冷刺激痛

E. 热刺激痛 **正确答案: B**

90、单选 乳牙经常在出生后多长时间萌出（）

A. 3个月

B. 1岁

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/816234115041010113>