

一、单项选择题：

1. 我国现存的第一部外科专著是： c

a. 《内经》

b. 《五十二病方》

c. 《刘涓子鬼遗方》

d. 《肘后备急方》

e. 《诸病源候论》

2. 下列哪种措施不属于灭菌法： b

a. 高压蒸气法

b. 甲醛蒸气蒸法 1h

c. 煮沸 1h

d. 火烧法

e. 紫外线

3. 下述药物中镇痛作用最强的是： b

a. 哌替啶

b. 芬太尼

c. 镇痛新

d. 氟哌啶

e. 度冷丁

4. 临床上评价营养不良的体现中，哪项不确切： **b**

a. 贫血

b. 体重轻

c. 水肿

d. 低蛋白血症

e. 以上都不对的

5. 失血性休克病人补充血容量应首选： **b**

a. 生理盐水

b. 平衡盐溶液

c. 全血

d. 血浆

e. 代血浆

6. 手术病人一般在术前 12h 开始禁食、4h 开始禁食的理由是： **b**

a. 让胃肠道合适的休息

b. 防治麻醉或手术过程中发生呕吐

c. 减少胃肠道手术时的污染

d. 防治术后腹胀

e. 减少术后排便

7. 丹毒是： a

a. 急性管状淋巴管炎

b. 急性网状淋巴管炎

c. 急性多发性毛囊炎

d. 急性蜂窝织炎

e. 以上都不是

8. 养血润燥法常用方剂为： c

a. 消风散

b. 麻桂各半汤

c. 当归饮子

d. 黄连解毒汤

e. 参苓白术散

9. 皮质激素治疗有效的是： a

a. 天疱疮

b. 类天疱疮

c. 疱疹样皮炎

d. 大疱性多形红斑

e. 以上均不是

10. 患淋病的孕妇经产道分娩后，新生儿易患： a

a. 淋菌性结膜炎

b. 淋菌性脑膜炎

c. 淋菌性心内膜炎

d. 淋菌性关节炎

e. 淋菌性直肠炎

11. 在流行地区集体防止单纯性甲状腺肿的最佳措施是： d

a. 派驻喜剧演员

b. 口服甲状腺素

c. 口服激素

d. 进食碘盐

e. 集体移民

12. 女性，22岁，乳房肿块，边缘清晰，活动度大，生长缓慢，最常见的是：c

a. 乳腺炎

b. 乳腺囊性增生病

- c. 乳腺纤维腺瘤
- d. 乳管内乳头状瘤
- e. 乳腺结核

13. 诊断肋骨骨折，下述哪项最可靠： d

- a. 局部疼痛
- b. 局部肿胀
- c. 直接压痛
- d. 间接压痛
- e. 深呼吸疼痛加重

14. 腹膜炎最重要的体征是： c

- a. 腹式呼吸受限
- b. 腹胀
- c. 压痛、反跳痛、肌紧张
- d. 腹壁可见肠蠕动波
- e. 肠鸣音减弱

15. 如下哪项对急性阑尾炎的诊断无意义： d

- a. 结肠充气试验阳性
- b. 腰大肌试验阳性
- c. 右下腹部腹膜刺激征阳性
- d. murphy 征阳性
- e. 闭孔内肌试验阳性

16. 腹外疝最重要的发病原因： d

- a. 慢性咳嗽
- b. 长期便秘
- c. 排尿困难
- d. 腹壁有微弱点或腹壁缺损
- e. 常常从事腹内压增高的工作

17. 胃十二指肠溃疡穿孔者的治疗可根据病情采用： d

- a. 中西医结合非手术治疗
- b. 穿孔修补术
- c. 胃次全切除术
- d. 上述措施均可
- e. 上述措施均不可采用

18. 急性胰腺炎时，血清淀粉酶升高的规律为： b

- a. 发病后 12 小时升高，24 小时达高峰
- b. 发病后 6 小时开始升高，24 小时达高峰
- c. 发病后 25 小时开始升高，48 小时达高峰
- d. 发病后 48 小时开始升高，72 小时达高峰
- e. 取决于发病后的腹痛程度

19. 溃疡病致瘢痕性幽门梗阻的突出体现是： a

- a. 呕吐
- b. 腹胀
- c. 消瘦
- d. 贫血
- e. 脱水

20. 作为原发性肝癌的首发症状，如下较少见的是： a

- a. 黄疸
- b. 消瘦、乏力
- c. 肝区疼痛
- d. 上腹肿块
- e. 腹胀、纳差

21. 有关输尿管的描述错误的是： a

- a. 输尿管所有被腹膜包裹
- b. 长约 25—30cm
- c. 管径 0.5—1cm
- d. 有三个生理狭窄
- e. 输尿管每分钟蠕动约 3—4 次

22. 急性附睾炎的临床特点是： e

- a. 附睾迅速肿大
- b. 疼痛
- c. 向同侧腹股沟放射
- d. 常合并有恶寒发热，头痛，全身关节疼痛等全身症状
- e. 以上均是

23. 有关慢性前列腺炎的临床体现论述对的是： d

- a. 尿频、尿急、尿痛
- b. 镜下血尿
- c. 睾丸肿痛
- d. 会阴小腹胀痛，尿道灼热，流白，病程冗长，反复不愈
- e. 恶寒、发热

24. 前列腺增生症排尿困难的程度重要取决于： b

- a. 前列腺体积的大小
- b. 增生形状和部位
- c. 与否合并感染
- d. 与否合并结石
- e. 病变发展速度

25. 泌尿系结石最常见的肿瘤是： b

- a. 肾癌
- b. 膀胱肿瘤
- c. 睾丸肿瘤
- d. 输尿管肿瘤
- e. 前列腺癌

26. 间歇性跛行可发生于： d

- a. raynaud 病
- b. takayasu 病
- c. raynaud 病
- d. buerger 病
- e. 大隐静脉曲张

27. 脱疽局部缺血期临床为： e

肢体红肿

- b. 初起时四肢末节溃烂
- c. 肢端紫暗
- d. 初起时肢端疼痛灼热
- e. 间歇性跛行

28. 内痔初发的重要症状是： c

- a. 肛门疼痛
- b. 肛门坠胀
- c. 便秘
- d. 无痛性出血
- e. 便时肛内有肿物脱出

29. 肛管直肠周围脓肿常继发于： c

- a. 肛裂
- b. 肛痿
- c. 肛窦炎
- d. 内痔注射
- e. 直肠息肉

30. 用新九分法计算成人烧伤面积，下列哪项是错误的： b

发、颈、面部各为 3%

b. 双上臂为 6%

c. 躯干为 27%

d. 双臀为 5%

e. 双前臂为 6%

二、多选题

1. 在临床麻醉中，消除疼痛的措施：**ace**

a. 全身麻醉

b. 基础麻醉

c. 手术后镇痛

d. 控制性降压

e. 椎管内麻醉或局部麻醉

2. 大量迅速输血，也许引起的并发症：**abc**

心力衰竭

b. 出血倾向

c. 酸中毒

d. 空气栓塞

e. 碱中毒

3. 代谢性酸中毒的重要原因是： ade

a. 碱性物质丢失过多

b. 胃液丧失过多

c. 缺钾

d. 酸性物质过多

e. 肾功能不全

4. 如下需要行肠外营养的有： abde

a. 急性出血坏死性胰腺炎

b. 急性重症胆管炎

c. 甲状腺瘤术后

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/817145064130006160>