

1、骨折未愈合，骨折固定解除前称为

- A. 外伤炎症期
- B. 骨痂形成期
- C. 骨痂成熟期
- D. 骨折愈合期
- E. 骨折恢复期

【答案】 D

2、 $\times 100\%$ 表示的为

- A. 发病率
- B. 患病率
- C. 罹患率
- D. 病死率
- E. 死亡率

【答案】 C

3、某偏瘫患者，目前患肢不能对抗重力，在减重状态下可做关节全范围活动，其肌力为

- A. 1级
- B. 2级
- C. 3级
- D. 4级
- E. 5级

【答案】 B

4、甲型肝炎病毒感染一般不会引起下列哪种临床类型的肝炎

- A. 急性黄疸型肝炎
- B. 急性无黄疸型肝炎
- C. 慢性肝炎
- D. 急性重型肝炎
- E. 淤胆型肝炎

【答案】 C

5、“60%青少年学会如何拒绝吸第一支烟”

- A. 知识目标
- B. 态度目标
- C. 技巧目标
- D. 行为目标
- E. 信念目标

【答案】 C

6、新生儿死亡率的计算公式正确的是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【答案】 B

7、阿米替林用于哪类精神疾病的治疗

- A. 老年性痴呆

- B. 精神分裂症
- C. 帕金森病
- D. 抑郁症
- E. 躁狂症

【答案】 D

8、卫生服务管理信息系统的管理不包括

- A. 组织管理
- B. 技术管理
- C. 人才管理
- D. 薪金管理
- E. 设备管理

【答案】 D

9、小刘因车祸而受伤，其脊髓损伤平面为 T5，损伤级别为 B，代表意义是

- A. 颈髓 5 为最后一个正常脊髓平面，颈髓 5 以下存在感觉功能，无运动功能
- B. 胸髓 5 为最后一个正常脊髓平面，胸髓 5 以下存在感觉功能，无运动功能
- C. 胸髓 5 为最后一个正常脊髓平面，胸髓 5 以下存在运动功能，无感觉功能
- D. 腰髓 5 为最后一个正常脊髓平面，腰髓 5 以下存在感觉功能，无运动功能
- E. 腰髓 5 为最后一个正常脊髓平面，腰髓 5 以下存在运动功能，无感觉功能

【答案】 B

10、当前，我国正处于老龄化进程的阶段是

- A. 成年型
- B. 过渡阶段
- C. 发展阶段

D. 高峰阶段

E. 老年型

【答案】 C

11、患者李某，女性，69岁，患高血压病8年，近3个月来间断胸骨后或心前区疼痛，持续3~5分钟，经入院检查确诊为冠心病心绞痛。医生医嘱用硝酸甘油，护士在为患者讲解用药知识中，下列不正确的一项为

A. 应坐位或卧位服药，以免发生体位性低血压

B. 该药应舌下含服，不可吞服或嚼服

C. 该药可扩张外周血管，减轻心脏负担

D. 一旦出现不良反应，需立即停药不可再服用

E. 该药的不良反应有头面部皮肤潮红、搏动性头疼等

【答案】 D

12、阿米替林用于哪类精神疾病的治疗

A. 老年性痴呆

B. 精神分裂症

C. 帕金森病

D. 抑郁症

E. 躁狂症

【答案】 D

13、下列哪种状况的患者最适宜借助CPM机进行康复训练

A. 开放性骨折

B. 闭合性骨折

C. 涉及关节面的骨折

D. 不涉及关节面的骨折

E. 四肢骨折恢复期

【答案】 C

14、为使调查结果更具代表性，社区评估时间卷调查的最好方法是

A. 正式的随机抽样方法

B. 方便抽样方法

C. 不必考虑信度

D. 不必考虑效度

E. 目的抽样方法

【答案】 A

15、我国对临终患者的界定为预计能存活

A. 1~2 个月

B. 2~3 个月

C. 6 个月内

D. 6~12 个月

E. 1 年内

【答案】 B

16、在控制结核病流行的各项原则中，管理传染源的最好措施是

A. 接种卡介苗

B. 做好结核患者的登记管理

C. 加强消毒隔离卫生制度，劝止随地吐痰

D. 有效化学药物治疗已患病者，特别是开放性患者

E. 加强社区宣传，避免家庭接触传播

【答案】 D

17、下列哪项不是丙型肝炎的传播途径

- A. 输血及血制品途径
- B. 母婴垂直传播
- C. 粪一口传播
- D. 生活上的密切接触
- E. 性接触传播

【答案】 C

18、表示双胞胎的符号是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【答案】 C

19、关于知一信一行模式，描述正确的是

- A. 信念与行为产生具有因果关系
- B. 知识与行为产生具有因果关系
- C. 知识、信念是行为产生的必要条件
- D. 有积极的信念，就能主动形成健康行为
- E. 有了正确的知识和信念，行为必然会改变

【答案】 C

20、关于居家护理，描述正确的是

- A. 居家护理是指在由家庭成员提供的护理

- B. 居家护理的直接对象是各年龄层的患者
- C. 居家护理的间接对象主要是患者的家属
- D. 居家护理主要适于家中无家属照顾的患者
- E. 居家护理的内容主要是技术性护理措施

【答案】 B

21、于某，男，78岁，早晨起床时突然晕倒在地，家属打电话到社区中心，当社区护士赶到家里时，发现患者意识丧失，有自主呼吸，脉搏细弱，患者对呼叫无反应，对针刺出现防御反应，角膜反射弱，瞳孔对光反射迟钝，患者属于

- A. 休克早期
- B. 休克代偿期
- C. 轻度昏迷
- D. 中度昏迷
- E. 深度昏迷

【答案】 D

22、关于知-信-行模式，描述正确的是

- A. 信念与行为产生具有因果关系
- B. 知识与行为产生具有因果关系
- C. 知识、信念是行为产生的必要条件
- D. 有积极的信念，就能主动形成健康行为
- E. 有了正确的知识和信念，行为必然会改变

【答案】 C

23、下列对社区卫生服务的描述中，正确的是

- A. 服务的对象是社区中的患病人群

- B. 服务的地点是社区医院
- C. 提供服务的时间应适应居民的需求
- D. 当居民的健康问题得到解决后，社区卫生服务即可停止
- E. 服务的内容是针对患者进行健康教育

【答案】 C

24、刘先生 60 岁，脑出血后 2 个月转入康复病房，Barthel 指数评分为 30 分，下列描述正确的是

- A. 日常生活能力为良
- B. 日常生活能力为中
- C. 日常生活能力为差
- D. 生活完全需要帮助
- E. 康复训练效果最好

【答案】 C

25、存在与 19 世纪中期以前，由家庭主妇对患病的家人进行照顾，此期为

- A. 家庭护理阶段
- B. 地段护理阶段
- C. 公共卫生护理阶段
- D. 社区护理阶段
- E. 以患者为中心的阶段

【答案】 A

26、临终护理的原则不包括

- A. 适当治疗
- B. 照护为主
- C. 延长生命

D. 注重心理

E. 关心家属

【答案】 C

27、按智商测定分级，轻度精神发育迟滞的范围为

A. 70~84

B. 55~69

C. 40~54

D. 25~39

E. 0~25

【答案】 B

28、王某，女，32岁，做实验过程中不慎着火，身体被烧伤，烧伤总面积达31%，其中三度面积13%，出现烦躁、血压下降等休克症状。估计患者属于

A. 轻度烧伤

B. 中度烧伤

C. 重度烧伤

D. 特重烧伤

E. 极重烧伤

【答案】 C

29、下列适宜老年人的居家环境是

A. 居室光线宜暗

B. 夏季室内温度在20~22℃

C. 冬季室内温度在20~22℃

D. 室内湿度在70%左右

E. 室内湿度在 30%

【答案】 C

30、精神分裂症的特征性思维障碍是

A. 破裂性思维

B. 原发性妄想

C. 思维贫乏

D. 思维鸣响

E. 病理性赘述

【答案】 A

31、临终护理的原则不包括

A. 适当治疗

B. 照护为主

C. 延长生命

D. 注重心理

E. 关心家属

【答案】 C

32、在控制结核病流行的各项原则中，管理传染源的最好措施是

A. 接种卡介苗

B. 做好结核患者的登记管理

C. 加强消毒隔离卫生制度，劝止随地吐痰

D. 有效化学药物治疗已患病者，特别是开放性患者

E. 加强社区宣传，避免家庭接触传播

【答案】 D

33、下列哪项不是丙型肝炎的传播途径

- A. 输血及血制品途径
- B. 母婴垂直传播
- C. 粪一口传播
- D. 生活上的密切接触
- E. 性接触传播

【答案】 C

34、某年某地某病患者 N 例，有 n 例患者接受了正规治疗，观察期内治愈患者 n

- A. 病死率= $\frac{n}{N}$
- B. 死亡率= $\frac{n}{N}$
- C. 1 年生存率= $\frac{n}{N}$
- D. 治愈率= $\frac{n}{n}$
- E. 有效率= $\frac{n}{n}$

【答案】 D

35、下列情况中，可疑为病理性黄疸的是

- A. 黄疸出现的时间为生后第 2 天
- B. 黄疸持续时间为 12 天
- C. 血清胆红素为 10mg/dl
- D. 血清结合胆红素为 2.0mg/dl
- E. 胆红素每天增加 2mg/dl

【答案】 D

36、下列对社区卫生服务的描述中，正确的是

- A. 服务的对象是社区中的患病人群

- B. 服务的地点是社区医院
- C. 提供服务的时间应适应居民的需求
- D. 当居民的健康问题得到解决后，社区卫生服务即可停止
- E. 服务的内容是针对患者进行健康教育

【答案】 C

37、某偏瘫患者，目前患肢不能对抗重力，在减重状态下可做关节全范围活动，其肌力为

- A. 2级
- B. 5级
- C. 4级
- D. 3级
- E. 1级

【答案】 A

38、脊髓损伤的社区预防工作中的首要措施是

- A. 建立病伤残者健康档案
- B. 宣教安全防护，提高辖区居民安全意识
- C. 向患者及家属宣教早期、长期康复的意义
- D. 对患者进行全面康复，尽量恢复机体功能
- E. 预防并发症，延缓和减少残疾的发生、发展

【答案】 B

39、属于危险性护理诊断

- A. 发热
- B. 母乳喂养有效
- C. 社区应对无效

D. 有照顾者紧张的危险

E. 潜在并发症：心律失常

【答案】 D

40、精神分裂症的特征性思维障碍是

A. 破裂性思维

B. 原发性妄想

C. 思维贫乏

D. 思维鸣响

E. 病理性赘述

【答案】 A

41、属于危险性护理诊断

A. 发热

B. 母乳喂养有效

C. 社区应对无效

D. 有照顾者紧张的危险

E. 潜在并发症：心律失常

【答案】 D

42、健康教育“知-信-行”模式中，基础是

A. 信念

B. 态度

C. 行为

D. 信息

E. 知识

【答案】 D

43、不属于社区健康档案管理的是

A. 健康档案的建立

B. 健康档案的保管

C. 健康档案的使用

D. 普及健康档案的知识

E. 建立健全健康档案的有关制度

【答案】 D

44、抗抑郁药物的起效时间一般是

A. 3 天

B. 1 周

C. 2 周

D. 4 周

E. 6 周

【答案】 C

45、患者李某，女性，69岁，患高血压病8年，近3个月来间断胸骨后或心前区疼痛，持续3~5分钟，经入院检查确诊为冠心病心绞痛。医生医嘱用硝酸甘油，护士在为患者讲解用药知识中，下列不正确的一项为

A. 应坐位或卧位服药，以免发生体位性低血压

B. 该药应舌下含服，不可吞服或嚼服

C. 该药可扩张外周血管，减轻心脏负担

D. 一旦出现不良反应，需立即停药不可再服用

E. 该药的不良反应有头面部皮肤潮红、搏动性头疼等

【答案】 D

46、小刘因车祸而受伤，其脊髓损伤平面为 T5，损伤级别为 B，代表意义是

A. 颈髓 5 为最后一个正常脊髓平面，颈髓 5 以下存在感觉功能，无运动功能

B. 胸髓 5 为最后一个正常脊髓平面，胸髓 5 以下存在感觉功能，无运动功能

C. 胸髓 5 为最后一个正常脊髓平面，胸髓 5 以下存在运动功能，无感觉功能

D. 腰髓 5 为最后一个正常脊髓平面，腰髓 5 以下存在感觉功能，无运动功能

E. 腰髓 5 为最后一个正常脊髓平面，腰髓 5 以下存在运动功能，无感觉功能

【答案】 B

47、由父母及未婚子女组成的家庭，属于

A. 核心家庭

B. 主干家庭

C. 联合家庭

D. 兄弟姐妹组成的家庭

E. 同性恋家庭

【答案】 A

48、抗抑郁药物的起效时间一般是

A. 3 天

B. 1 周

C. 2 周

D. 4 周

E. 6 周

【答案】 C

49、按智商测定分级，轻度精神发育迟滞的范围为

- A. 70~84
- B. 55~69
- C. 40~54
- D. 25~39
- E. 0~25

【答案】 B

50、患者女性，53岁。近来常出现头晕、头痛、发热、出汗等多种症状，同时伴有月经周期紊乱，该患者可考虑诊断为

- A. 更年期综合征
- B. 更年期综合征
- C. 抑郁症
- D. 自主神经（植物神经）功能紊乱
- E. 功能失调性子宫出血

【答案】 A

51、不属于社区健康档案管理的是

- A. 健康档案的建立
- B. 健康档案的保管
- C. 健康档案的使用
- D. 普及健康档案的知识
- E. 建立健全健康档案的有关制度

【答案】 D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/825031221340011133>