

## 外科七

### 型题（最佳选择题肯定型）

骨盆骨折最易并发

- 关节僵硬
- 缺血性骨坏死
- 坐骨神经损伤
- 骨折不愈合
- 脂肪栓塞

手外伤中最常见的类型是

- 绞轧伤
- 贯穿伤
- 切割伤
- 烧伤
- 咬伤

慢性骨髓炎的手术适应症是

- 反复有发烧及局部疼痛
- 局部有红肿
- 局部压痛
- 病变骨质变粗，密度增高
- 有死骨且骨包壳充分形成

男性， 岁，土墙倒塌，砸伤左小腿 小时，现场用树皮块捆扎制动，途中呻吟小腿剧痛，查体：左小腿皮色绀红，肿胀，间有大小水泡，胫骨中段有骨擦响，压痛，腿腹触痛尤甚，背伸踝趾时加重。足动脉隐隐可扪及。立即应采取的主要措施是

- 小腿摄片
- 腘窝部血管探察
- 深筋膜切开
- 静脉脱水剂
- 多普勒仪监测肢体血供状况

男， 岁，翻修猪舍砸伤右腿 天，搬动时，外露骨折端回缩，流血多，用过止血带 小时，到县医院静脉补液，重新包扎伤口，加板固定，因软组织损伤严重又转院，诊断 右股骨干开放性骨折。病人 度， 次分， （ ）右大腿广泛，挫伤瘀斑肿胀，扪及皮下捻发音，血性液流出有气味，首要采取的是

- 扩大清洁创口
- 分泌物指定查细菌
- 骨牵引
- 多联有效抗菌素
- 以上都对

男孩， 岁，右髋痛伴发烧不能行走已 周。 度，髋部肿，触痛。关节液肿性， 线片示右髋肿，关节间隙增宽，除加强支持，抗菌素及患肢皮牵引外，局部最应选择何种外科处理？

- 关节抽尽脓，注射有效抗菌素
- 关节切开引流
- 切开排脓持续冲洗引流
- 持续闭式冲洗引流术
- 手术复位牵引下冲洗引流

女青年，腰痛 月，乏力易疲劳，查体：低热，右髋 氏征 髋窝膨满且有压痛，扣实音。腰椎深扣痛。腰椎照片，腰椎体不规则破坏，椎间隙变窄，椎旁因肠道充气显示不清。明确诊断最可靠的步骤选择为

- 超
- 或
- 髋窝穿刺
- 骨扫描

膝半月板损伤，最可靠的诊断依据

- 关节空气造影
- 关节镜检查
- 膝半屈，旋转挤压损伤后膝痛
- 外内侧膝眼压痛
- 关节交锁及麦氏征（ ）

岁男孩，近一个月来右小腿上端呈持续性剧痛，局部皮温高伴压痛，周身无发烧，下列哪项对初步诊断是最恰当的？

- 超检查
- 血化验白细胞总分数
- 线检查
- 血浆蛋白测定
- 血沉

中央型腰间盘脱出症与马尾神经痛最有意义的鉴别方法是

- 马鞍区麻醉
- 括约肌功能障碍
- 腰部压痛体征及放散痛
- 线检查
- 或 （核磁共振）

某女工腕桡侧疼痛，微肿乏力 个月，近来右手持物疼痛重，腕部尺偏时痛重，最可能诊断为

- 桡骨远端肿瘤
- 桡骨骨囊肿
- 颈椎病
- 狭窄性腱鞘炎
- 腕部腱鞘囊肿

血源性骨髓炎死骨形成的最主要原因是

- 骨膜坏死
- 骨质破坏
- 骨质病理骨折
- 细菌毒素致骨细胞坏死
- 骨质失去血供

前臂骨折手法复位夹板固定后，感觉局部剧痛，手指麻木肿胀，活动不灵，其最多见原因是

- 神经损伤
- 动脉受压
- 筋膜间隙高压
- 静脉受压

· 静脉栓塞  
股骨骨折后重叠移位，经整复后再移位，与下述哪种因素最有关？

- 肢体远端重叠
- 肌肉张力
- 暴力作用方向
- 整复后未采取有效固定
- 暴力的大小

岁男孩，左桡骨髁上骨折，已手法复位外固定 小时，为早期发现骨筋膜室综合症，要特别注意观察下列哪项？

- 桡动脉搏动
- 手及前臂的温度、颜色
- 肿胀的程度
- 有无麻木、感觉障碍
- 是否疼痛剧烈，及与手指活动的关系

个月前一青年踢球时突然左膝痛，不敢活动，检查左膝前外压痛，回旋挤压，试验阳性， 线摄片未见异常，下列哪种治疗方法最适宜？

- 理疗，热敷
- 石膏固定
- 小夹板固定
- 牵引
- 手术治疗

股骨干骨折后合并膝关节僵硬之最常见原因是

- 粉碎性骨折
- 合并神经损伤
- 持续牵引所致
- 夹板过紧所致
- 固定期缺少功能锻炼

下列哪种骨折最常以切开复位治疗？

- 锁骨骨折
- 髌骨翼骨折
- 耻骨骨折
- 股骨髁间骨折
- 桡骨远端骨折

关节受伤后出现关节囊空虚，畸形，请指出最可能原因？

- 关节囊破裂
- 关节内骨折
- 关节面失去对合关系
- 关节内血肿
- 关节功能丧失

在骨折过程中，原始骨痂在何时开始出现？

- 骨折端周围有血肿形成时
- 血肿机化中充满新生的毛细血管时
- 钙盐沉着时
- 骨板结构重现时
- 骨痂塑形时

急性化脓性髋关节炎小儿，突然发生髋关节剧痛，呈屈曲内收，内旋位，弹性固定，除应用抗菌素外最宜选用何种治疗？

- 手法整复与石膏固定
- 手法整复与小夹板固定
- 切开复位引流 持续皮肤牵引
- 持续骨牵引
- 切开引流加皮牵引

某男青年，被汽车撞倒，右髋着地，当时可起身行走 米后不敢活动，疼痛，右髋呈屈曲，缩短，外旋位，采取哪种治疗最宜？

- 卧床休息
- 止痛
- 小夹板固定
- 石膏固定
- 手术治疗

线片表现 三角，最常发生在哪种疾病？

- 内生软骨病
- 关节炎结核
- 骨肉瘤
- 骨软骨瘤
- 骨囊肿

胫骨上端外侧 线片可见皮质膨胀，边缘整齐的骨质透光区，中心有间隔改变，最可能诊断为

- 骨囊肿
- 转移癌
- 骨巨细胞瘤
- 内生软骨瘤
- 胫骨骨髓炎

岁，男，腰痛，微热，体质衰弱，查体：腰背角状后凸畸形，右髂窝肿胀，近日皮温高红肿，抽出脓液粘稠，最好处理办法为

- 绝对安静卧床休息，抗菌素治疗
- 切开引流周身抗菌素
- 脊柱融合术
- 抽脓后注入抗菌素
- 病灶清除术

男， 岁，入院前开始突然高烧 度，持续一周，大腿外上方疼痛，肿，该侧压痛严重，但无波动感，白细胞计数  $\times$  ，中性 ，最佳检查方法

- 血沉
- 血培养
- 线检查
- 局部分层穿刺
- 超

托马氏征 阳性说明

- 髋关节过伸畸形
- 髋关节屈曲畸形
- 髋关节缩短畸形
- 髋关节内旋畸形
- 髋关节外旋畸形

男， 岁，右股骨急性骨髓炎，经抗炎治疗，病期 天，体温趋于平稳 周，最适合治疗

- 继续选用有效抗菌素
- 患肢制动，观察经过
- 切开引流留管局部应用抗菌素
- 死骨剔除蝶形手术
- 死骨剔除肌瓣充填手术

一青年左小腿上端肿痛 个月，先是间歇痛，后加剧为连续性，夜间重，患部肿胀发热，静脉怒张，其最大可能是

- 恶性骨肿瘤
- 急性骨髓炎
- 胫骨结节骨软骨炎
- 骨结核
- 蜂窝织炎

下列哪种骨折最好以切开复位治疗？

- 锁骨骨折
- 桡骨远端骨折
- 肩胛骨骨折
- 腓骨干骨折
- 尺骨鹰嘴骨折

一名肱骨髁上骨折患者，经手法复位，小夹板固定后感觉局部剧痛，手指麻木，肿胀，活动不灵，最主要的原因是

- 神经损伤
- 动脉损伤
- 骨筋膜室内压增高
- 神经和静脉受压
- 静脉受压

有一 岁男，在弯腰劳动中，左臂部砸伤后 小时来诊，患肢呈屈曲，内收内旋位，下肢短缩，应如何治疗最佳？

- 卧床休息
- 应用抗菌素
- 法复位
- 石膏固定
- 牵引复位

某青年由高处坠落时，右小腿胫骨中段骨折，局部明显肿胀，趾端麻木，剧痛，足背动脉搏动微弱，应最先采取哪种措施？

- 应用止痛药
- 小夹板固定
- 减张切开
- 骨折复位
- 石膏固定

岁，男，左小腿被砸伤 小时，左小腿肿胀，压痛，异常活动，皮温略高于对侧，体温 度，最可能诊断为

- 左胫骨骨髓炎
- 左胫骨干骨折
- 左小腿软组织挫伤
- 左小腿软组织蜂窝组织炎
- 左小腿血肿

腓骨上端骨折，危害最严重损伤

- 畸形愈合
- 腓总神经损伤
- 腓侧副韧带损伤
- 不连接
- 近端胫腓关节脱位

中年女工，右腕痛，乏力 个月，近一个月来提暖水瓶倒水时困难，痛难忍，

- 局部热敷
- 石膏固定
- 局部封闭
- 应用止痛药
- 小夹板固定

试验阳性，最佳治疗方法是

急性血源性骨髓炎最好发部位是

- 短管状骨干
- 长管状骨干骺端
- 以上都不是
- 长管状骨干
- 长管状骨骨端

某腰椎结核病人，体质衰弱，有左髂窝脓肿合并感染，最好处理方法为

- 绝对安静卧床休息
- 切开引流
- 脊柱融合术
- 抽出脓汁后注入链霉素
- 抗结核治疗

腰痛并向下肢放散至小腿，拇指被伸力减弱最常见于

- 梨状肌综合症
- 小关节紊乱症
- 坐骨神经炎
- 腰间盘脱出症
- 腰肌劳损

有一位髋关节屈曲内收位受伤患者，上后髋剧痛，患肢短缩，髋关节屈曲内收内旋畸形，弹性固定，最可能诊断是

- 股骨颈骨折
- 髋关节后脱位
- 髋臼骨折
- 髋关节中心性脱位
- 髋关节前脱位

岁，男性患者，右大腿被汽车撞伤一小时，右大腿中段明显肿胀，压痛，轻度向外成角，皮温略高于内侧，体温 度，白细胞  $\times$  。采取何种治疗方法最佳？

- 应用抗菌素治疗
- 夹板固定
- 管形石膏固定
- 立即骨牵引加小夹板固定
- 手术探查

一男孩，从单杠上跌下，手掌触地后肘部疼痛，有骨擦音，手指剧痛，苍白，桡动脉波动触不清，应首先采取哪种措施？

- 止痛剂应用
- 小夹板固定
- 石膏固定
- 手术探查
- 血管扩张剂

岁男孩，右股骨干骨折 个月， 线检查为中段 斜折，重迭移位 厘米，成角移位 度，骨折端处有骨痂通过，最应选择处理是

- 切开复位，钢板内固定
- 手法折骨，石膏固定
- 手法折骨，牵引加小夹板
- 切开复位，髓内针固定
- 不需特殊治疗

急诊室病人，女性 岁，左腕部割伤，创口内可见掌长肌腱，桡侧屈腕肌腱，正中神经断裂，须首选何项处理？

- 加压包扎二期处理
- 缝合皮肤创口
- 吻合正中神经
- 吻合肌腱，石膏固定
- 彻底清创，修复损伤组织

岁，男性工人，被预制板砸伤左膝，剧痛，局部肿胀，皮下淤血，又畸形反常活动，哪项首先行检查最为重要？

- 给止痛剂止痛
- 拍 光片
- 检查足背动脉搏动
- 检查有无骨擦音
- 检查左小腿和足的感觉功能

检查正中神经损伤，应在以下何处检查感觉障碍区？

- 拇指背侧
- 第五指指腹
- 第二指指腹
- 鱼际区
- 虎口区背侧

急诊， 岁男性，有小腿开放骨折，动脉断裂，治疗方案应首选

- 血管造影后手术吻合
- 清创缝合，血管吻合
- 清创内固定，血管吻合
- 植骨内固定
- 截肢术

岁，女孩，触及左胫骨上端内侧硬性肿物，  $\times$  ， 线示肿物从骨皮质突起界限清楚，诊断最可能

- 骨肉瘤
- 软骨骨瘤
- 尤文肉瘤
- 骨巨细胞瘤
- 骨囊肿

一 岁男性，枪伤后，右上臂反常活动，其远端未触及动脉搏动，不能主动伸腕伸指，需立即

- 清创固定，修复血管
- 清创内固定
- 闭合创口，夹板固定
- 伤口清创，骨牵引
- 加压包扎，观察血循环

岁女性，右髌摔伤，不能行走，右下肢呈 度外旋畸形，最宜选择治疗方案

- 皮肤牵引
- 切开复位内固定
- 全髌关节置换术
- 骨牵引
- 人工股骨头置换术

岁，男运动员， 年前比赛中右膝扭伤，伤后右膝关节疼痛，肿胀活动障碍，经休息，理疗， 周后逐渐消肿，恢复正常活动，以后经常感觉右膝关节不稳，有时可听到弹响声并有绞锁感，查：右膝轻肿，股四头肌萎缩，外侧间隙压痛，麦氏征（ ） 线检查，右膝未见骨质异常，最可能的诊断

- 右膝关节前交叉韧带损伤
- 右膝外侧副韧带损伤
- 右膝内侧副韧带损伤
- 右膝关节内游离体
- 右膝外侧半月板损伤

双侧耻骨支骨折移位，伤后 小时未排尿，血压脉搏正常，为诊断有否尿道断裂，最简捷的方法是

- 静脉肾盂造影
- 膀胱镜检查
- 肾脏 扫描
- 放置导尿管
- 逆行性输尿管造影

男性， 岁，左小腿外伤 小时就诊，查：左小腿畸形，骨摩擦感，胫前伤口 厘米，骨端外露， 片显示：左胫骨中段粉碎性骨折，临床诊断：左胫骨中段开放性骨折，最正确的急诊治疗

- 急诊手术，钢板螺钉内固定
- 伤口包扎，石膏固定
- 清创缝合，跟骨牵引
- 清创缝合，小夹板固定
- 伤口包扎，小夹板固定

骨盆骨折最严重的并发症是

- 腹膜后巨大血肿
- 直肠损伤
- 膀胱尿道损伤
- 腰骶神经丛损伤
- 功能障碍

男性， 岁，左膝关节痛 个月，近一个月出现肿胀，疼痛与活动有关，有时夜间可痛醒，体检：左骨四头肌萎缩，左膝肿胀，不红，皮温略高，压痛广泛，关节穿刺抽出黄色较混稀薄液体 ， 线片示膝关节骨质疏松，关节软组织影肿胀，此时最佳处理方法

- 制动 强的松龙关节内注射
- 单纯醋酸强的松龙关节内注射
- 制动 庆大霉素关节内注射
- 制动 异烟肼关节内注射
- 制动 理疗

男孩，三岁，右上肢外伤一周，此时检查有无神经损害，最有诊断价值的是

- 主动活动异常
- 两点鉴别觉异常
- 关节位置觉异常
- 肢端皮肤潮红，皮肤多汗

- 征阳性
- 岁男性骨肿瘤患者，血清总蛋白升高，倒置，蛋白电泳显示 $\beta$ 和球蛋白升高，这时最可能是
- 骨肉瘤
- 尤文肉瘤
- 骨髓瘤
- 前列腺癌骨转移
- 骨巨细胞瘤

腰椎结核患者，一侧大腿外侧出现冷脓肿，其流注途径是

- 椎旁 骶棘肌 臀部 大转子 大腿外侧
- 椎旁 腰大肌 盆腔 坐骨大孔 大转子 大腿外侧
- 椎旁 腰大肌 盆腔 闭孔 小转子 大腿外侧
- 椎旁 腰大肌 髂腰肌 小转子 大腿后方 大腿外侧
- 椎旁 腰大肌 盆腔 腹股沟 股直肌 大腿外侧

测量下肢相对长度的方法

- 髂前上肌至第一趾蹠的距离
- 髂前上肌至外踝下缘的距离
- 大粗隆顶点到外踝下缘的距离
- 髂前上肌至内踝下缘的距离
- 大粗隆顶点到内踝下缘的距离

诊断骨、关节结核的辅助检查中最有实用价值的是

- 线平片
- 结核菌素试验
- 血沉
- 豚鼠接种

骨肿瘤分类法中，提出下列标准：（ ）分为良性，恶性，中间性；（ ）骨巨细胞瘤归入组织细胞源性；（ ）临床，病理和线三结合，这样分类法是由哪一个国家或组织制定的？

- 中国
- 澳大利亚
- 美国
- 联合国卫生组织
- 日本

血性化脓性髋关节炎脓性较粘稠时，最佳治疗方法是

- 反复关节穿刺，注入敏感性抗菌素
- 关节切开引流，开放创口换药
- 关节切开引流，闭式连续灌洗术
- 病灶清除术
- 关节融合术

化脓性关节炎，骨髓炎，能最早确定病灶的是

- 线摄片
- 放射性核素骨显像
- 分层穿刺术

股骨颈骨折后发生股骨头缺血坏死，最主要的原因是

- 来自圆韧带内小凹动脉供血中断
- 来自干骺端的滋养动脉供血中断
- 来自旋骨内侧动脉供血中断
- 来自旋骨外侧动脉供血中断
- 来自旋髂浅动脉供血中断

第四颈椎骨折脱位，完全性截瘫，伤后早期突然死亡的原因是

- 窒息
- 褥疮发生感染
- 尿潴留
- 肺炎或肺不张
- 泌尿系感染

胸椎骨折脱位，骨髓半横断损伤，损伤平面以下的改变是



- 两侧肢体运动消失，感觉正常
- 两侧肢体运动消失，活动正常
- 同侧肢体运动障碍，对侧感觉正常
- 对侧肢体感觉障碍，同侧感觉正常
- 痛侧肢体深感觉和运动障碍，对侧痛觉，温觉障碍

岁男孩，上午因肱骨髁上骨折来诊断，行手法复位，石膏固定后，夜间出现患肢剧痛，患手肿胀，手指麻木，屈指受限，首选应考虑

- 合并神经损伤
- 骨折压迫神经
- 骨筋膜室内压增高
- 正常的创伤后反应
- 合并屈指肌腱损伤

骨盆骨折早期最危险的并发症是

- 膀胱破裂
- 尿道断裂
- 坐骨神经损伤
- 直肠损伤
- 出血性休克

急性腰扭伤最有价值的检查是

- 腰部摄片
- 腰部压痛点
- 患者步态改变
- 直腿抬高试验
- 骨盆挤压分离试验

男性，岁，右大腿下端间歇疼痛 个月，加重 个月，查体：右大腿下端肿胀伴静脉怒张，皮温高，有触痛，呈实性，线片表现为右股骨下段干骺部骨质破坏，伴三角形新骨形成，以下哪种方法治疗最佳？

- 搔刮植骨
- 局部切除
- 整段切除 假体植入
- 截肢 化疗
- 化疗

患者，右髌肿胀，疼痛，穿刺抽液镜检有大量脓细胞，较粘稠，最好的治疗方法是

- 加强支持治疗
- 关节穿刺，注入药物
- 全身使用抗菌素
- 全身使用抗菌素 切开引流
- 石膏固定或皮牵引

全关节结核是指

- 关节内积液增多，且混浊
- 有瘘管形成
- 滑膜广泛结核病灶
- 线照片骨端有空洞形成
- 关节骨端，滑膜及关节软骨均受累

患者，男性，岁，半个月前因倒一盆水引起腰痛，天后加剧，并出现小腿外侧痛，弯腰，咳嗽及用力排便时加重，查体：脊柱侧弯，椎旁叩痛并向右腿放射，右直腿抬高试验阳性，线片见腰椎骨质有增生，首选诊断是

- 腰部扭伤
- 腰椎间盘突出症
- 退化性腰椎痛
- 腰椎结核
- 腰肌劳损

岁，男性，年前打篮球受伤后膝关节经常隐痛，检查发现：右膝前内侧关节间隙处有压痛，研磨试验阳性，试验有声响，最可能诊断是

- 内侧半月板损伤
- 创伤性关节炎
- 内侧副韧带损伤
- 前十字韧带损伤

- 髌骨软化症
- 血性血源性骨髓炎 周的 线表现是
  - 骨膜反应
  - 骨髓腔模糊
  - 骨质疏松
  - 骨质破坏
  - 无异常发现

骨肿瘤的临床表现和诊断下列哪项是最正确的？

- 疼痛是恶性肿瘤的特征性症状
- 转移性骨肿瘤 线上均是溶骨性破坏
- 骨肿瘤的诊断绝对依靠病理检查
- 碱性磷酸酶正常可排除恶性肿瘤的可能
- 三角见于骨肉瘤

患者，男性， 岁，农民，右小腿肿胀，流脓反复发作 年余，时有小碎骨片排出。体检：右小腿皮肤凹凸不平，色素沉着，小腿中段前内侧有一个窦道疤痕， 线平片见胫骨中段约 厘米，粗 厘米的死骨，死骨外侧有明显的新生骨形成，而内侧则无明显反应骨，本例近期病灶清除术后最易发生

- 死骨死腔不能完全消除
- 诱发急性发作
- 病理性骨折
- 软组织愈合不佳
- 出血性休克

岁妇女，被自行车撞倒后右髌痛，但仍能行走，次日疼痛加重，检查：右足外旋约 度，最大可能是

- 软组织挫伤
- 髌关节扭伤
- 大粗隆骨折
- 股骨颈骨折
- 髌骨骨折

患儿， 岁，左胫腓骨中段骨折 个月， 线片见胫腓骨中段斜形骨折，断端对位 ，向前成角 度，重叠 厘米已愈合，首选处理是

- 切开复位，钢板固定
- 切开复位，髓内钉固定
- 手法折骨，石膏固定
- 手法折骨，持续牵引
- 不需治疗

早期确诊急性化脓性骨髓炎的主要依据是

- 体温高达 度
- 血白细胞数和中性白细胞增多
- 线平片检查
- 局部分层穿刺
- 同位素骨扫描

腰椎结核手术后复查，判断病变治疗效果，有无复发的较简便，最敏感的检查方法是

- 线检查
- 扫描
- 血常规检查
- 血沉检查
- 结核菌素试验

患者，男性， 岁，学生，左膝关节扭伤后疼痛并出现左股骨下端肿块 月余。近来有加重，而收住院。体检： 度，脸色暗苍白，心肺腹均阴性，左股骨下短前外侧隆起，表面静脉怒张，皮温较高，有压痛， 线片见股骨下端斑点状，骨质破坏，伴日光放射状骨膜反应， 氏三角，进一步处理首选应是

- 近期截肢
- 肿瘤刮出后植骨
- 给予大剂量抗菌素
- 截肢 化疗
- 腹股沟淋巴活检

男性， 岁，外伤后左膝附近肿胀，剧痛，体温达 度，经大剂量抗菌素应用 天，效果不明显，体检：急性病容，左大腿下端及膝关节肿胀明显，发红，皮温高，压痛明显，左膝活动受限， 线平片骨质未见破坏，血白细胞  $\times$  ，中性 ，最佳处理

- 全身支持疗法
- 反复关节穿刺及腔内抗菌素注射
- 股骨下端切开引流
- 止痛药物应用
- 血液细胞培养

科雷氏骨折手法复位时，最好的麻醉选择是

- 不必使用麻醉
- 成人术前肌注 毫克苯巴比妥即可
- 选择能使肌肉完全松弛的麻醉，便于整复
- 可用普鲁卡因做局部麻醉，注射于骨折端周围
- 将针头刺入骨折端，回抽得陈旧血液后再注入麻醉药液

岁男性，左髌关节部位窦道反复流脓，髌关节活动明显受限，左下肢肌肉萎缩，但详细病史不清，为明确诊断应进行下列哪种检查最重要

- 结核菌素试验
- 线照片
- 血沉
- 超声波检查
- 细菌培养或病理检查

岁青年，左膝扭伤， 周后就诊：发现胫骨内髁窝部位有压痛，诊断内侧副韧带损伤，经休息理疗局部封闭治疗 月后不见好转，且疼痛加剧，夜间尤甚，再次就诊首选应做

- 碱性磷酸酶
- 白细胞
- 摄片
- 查血沉，白细胞
- 查抗 ，类风湿因子

男性 岁，左大腿肿痛高热，经大量抗菌素，输血治疗热退，至今 月来诊， 线片示股骨干全长呈广泛筛孔样破坏，最佳治疗

- 髌人字石膏固定，抗炎，对症治疗
- 夹板固定抗炎，对症治疗
- 钻孔引流术
- 夹板固定，早期关节活动，预防僵硬
- 病灶清除

男性， 岁， 年前抬重物时。腰部扭伤，以后多次发作，右下肢后侧疼痛，小腿足部麻木，并有间歇性跛行，检查腰部无畸形，无压痛，后伸略受限，右下肢直腿抬高试验 度（ ）加强试验（ ），感觉，肌力正常，踝反射减弱， 线片示 增生，为进一步确诊首选应做

- 腰穿，脑脊液检查
- 肌电图检查
- 检查
- 线断层检查
- 手术探查

农民 岁，汽车压伤右小腿， 小时后来我院，右小腿前方皮肤裂开  $\times$  污染泥沙，有  $\times$  长骨片游离，治疗最好是

- 清创，保留骨片，内固定，一期闭合创口
- 清创，外固定支架，清除骨片
- 清创，清除游离骨片，外固定
- 清创，清除骨片，内固定
- 截肢

患者， 岁，一月前左上臂肿胀，疼痛伴发热，经抗生素治疗不好转，于上臂下段形成软组织脓肿，自行穿破，流脓不愈， 线片，左肱骨全段有薄层新生包壳，尚不完整，此时最适合的治疗方法是

- 彻底摘除死骨，刮除窦道，闭合伤口

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/825320342314011110>