

2022~2023 临床执业医师考试题库及答案

1. 急性脓胸最常继发于 ( )

- A. 肺部感染
- B. 胸部开放性损伤
- C. 膈下脓肿
- D. 脓毒血症

正确答案:

A

2. 造成气流受限的病因中, 最常出现肺脏弹性回缩力减弱的是

- A. 弥漫性泛细支气管炎
- B. 支气管扩张
- C. 慢性支气管炎
- D. 慢性纤维空洞性肺结核
- E. 阻塞性肺气肿

正确答案:

E

3. 发生于股骨干骨折后的栓塞是 ( )

- A. 血栓栓塞
- B. 脂肪栓塞
- C. 氮气栓塞
- D. 羊水栓塞

正确答案:

B

4. 男, 32 岁, 慢性膀胱刺激症状伴终末血尿, 应首先考虑

- A. A. 膀胱结石
- B. B. 急性膀胱炎
- C. C. 膀胱肿瘤
- D. D. 急性肾盂肾炎
- E. E. 泌尿系结核

正确答案:

E

5. 肾综合征出血热患者引起出血的机制不包括下列哪种因素

- A. 血小板数目减少
- B. 肝素类物质减少
- C. 血管壁损伤

- D. 血小板功能异常
- E. DIC 导致的凝血机制异常

正确答案:

B

6. 对患有哮喘病的甲亢患者，禁止使用哪种药物

- A. 甲基硫氧嘧啶
- B. 阿替洛尔
- C. 丙基硫氧嘧啶
- D. 普奈洛尔
- E. 美托洛尔

正确答案:

D

7. 对胸腔积液患者，胸穿抽出有臭味混浊液体，则下列哪项对病因诊断最有价值

- A. 厌氧菌培养
- B. 查找肿瘤细胞
- C. 查找寄生虫卵
- D. 抗酸染色和涂片革兰染色
- E. 真菌和需氧菌培养

正确答案:

B

8. 吗啡用于治疗的适应证为

- A. 颅脑外伤疼痛
- B. 诊断未明急腹症疼痛
- C. 哺乳期妇女止痛
- D. 分娩止痛
- E. 急性严重创伤、烧伤所致疼痛

正确答案:

C

9. 重度贫血的诊断指标是

- A. Hb >120g/L
- B. Hb
- C. Hb
- D. Hb
- E. Hb

正确答案:

D

10. 以强制参保为原则，参保范围涵盖城镇所有用人单位和职工的保险为（）

- A. 城镇职工基本医疗保险
- B. 补充医疗保险
- C. 城镇居民基本医疗保险
- D. 社会医疗救助

正确答案：

A

11. 受血者配血试验的血标本必须是输血前

- A. 2天之内的
- B. 3天之内的
- C. 4天之内的
- D. 5天之内的
- E. 6天之内的

正确答案：

C

12. 疾病发生发展方向取决于：

- A. 病因的数量与强度
- B. 存在诱因
- C. 机体的抵抗力
- D. 损伤与抗损伤力量的对比
- E. 机体自稳调节的能力

正确答案：

D

13. 有关急性水肿性胰腺炎，下列哪一项是错误的

- A. 胰腺肿大，质地结实
- B. 可见轻度黄疸
- C. 腹痛多3—5天后缓解
- D. 多数病人可能发生休克
- E. 可发生假性囊肿

正确答案：

D

14. 动作电位有不不应期、可以总和、可以沿着神经纤维不衰减传导。（）

正确答案：

错误

15. 下丘脑控制生物节律日周期节律的关键部位是

- A. 外侧区
- B. 腹内侧区
- C. 视前区
- D. 视交叉上核
- E. 室旁核

正确答案：

D

16.  $Ca^{2+}$ 由细胞外进入细胞内需要细胞耗能。（）

正确答案：

错误

17. 心理活动或意识对一定对象的指向或集中的现象是（）

- A. 注意
- B. 人格
- C. 记忆
- D. 情感

正确答案：

A

18. 原发性三叉神经痛，查体可发现

- A. 面部感觉减退
- B. 患侧角膜反射消失
- C. 面部痛觉过敏
- D. 下颌反射减弱
- E. 没有阳性体征

正确答案：

A

19. “人际和谐”的特点一般不包括（）

- A. 乐于助人
- B. 乐于交往
- C. 宽以待人
- D. 不卑不亢

正确答案：

D

20. 诊断慢支的标准是

- A. 有咳嗽、咳痰症状，每年发病持续三个月
- B. 有咳嗽、咳痰症状，每年发病二个月连续三年
- C. 有咳嗽、咳痰伴喘息症状，每年发病持续三个月，连续四年
- D. 有咳嗽、咳痰伴喘息症状，每年发病三个月，连续三年，除外其他心、肺疾患
- E. 有咳嗽、咳痰症状，每年发病持续三个月，连续两年，并除外其他心肺疾患

正确答案：

E

21. 不属于医学伦理学原则的是

- A. 有利
- B. 公正
- C. 不伤害
- D. 克己
- E. 尊重

正确答案：

D

22. Wernicke 区受损，引起

- A. 运动失语
- B. 失写症
- C. 命名性失语
- D. 感觉失语症
- E. 失读症

正确答案：

D

23. 男，24 岁。急性起病，高热伴右胸痛，胸部 X 线片示右肺下叶实变影，其内可见多发气囊。其感染的病原体最可能是

- A. 肺炎链球菌
- B. 病毒
- C. 肺炎克雷伯杆菌
- D. 肺炎支原体
- E. 金黄色葡萄球菌

正确答案：

A

24. 腹部闭合性损伤时最容易受到损伤的内脏器官是（）

- A. 胃
- B. 脾
- C. 横结肠
- D. 肝

正确答案：

B

25. 抗人球蛋白试验阳性可见于下列哪种疾病

- A. 系统性红斑狼疮
- B. 遗传性球形细胞增多症
- C. 阵发性睡眠性血红蛋白尿
- D. 阵发性寒冷性血红蛋白尿
- E. 异常血红蛋白综合征

正确答案：

E

26. 窦房结自律细胞动作电位去极化相主要是由于（）

- A.  $\text{Na}^+$ 内流
- B.  $\text{K}^+$ 外流
- C.  $\text{Ca}^{2+}$ 内流
- D.  $\text{Cl}^-$ 外流

正确答案：

C

27. 简述神经调节及其特点。

正确答案：

神经调节是指中枢神经系统的活动通过神经元的联系对机体各部分的调节。神经调节的基本方式为反射。神经调节的特点是作用较迅速，反应部位比较局限，作用时间较为短暂。

28. 女，64岁。拟行直肠癌根治术。2型糖尿病病史20余年。现每日皮下注射胰岛素，平素晨起应用胰岛素12U。空腹血糖常为7~10mmol/L，尿糖(+~++)。下列围手术期处理不恰当的是

- A. 手术当日测定空腹血糖
- B. 必须将空腹血糖控制到正常水平
- C. 术前应用葡萄糖及胰岛素
- D. 尿糖可维持原水平
- E. 手术日晨停用胰岛素

正确答案：

B

29. 在心理治疗工作中，治疗对象有伤害他人的情况时，应该采取的措施是

- A. 继续治疗，无其他措施

- B. 治疗，同时录像取证
- C. 继续遵守保密原则
- D. 向有关部门报告
- E. 治疗者加强自我保护，继续治疗

正确答案：

E

30. 下列哪种副作用在非甾体抗炎药发生率最高

- A. 过敏反应
- B. 白细胞减少
- C. 肝功能损害
- D. 肾功能损害
- E. 胃肠道反应

正确答案：

B

31. 急性化脓性腹膜炎的常见原因应除外（）

- A. 腹腔内脏器穿孔
- B. 损伤引起的腹壁或内脏破裂
- C. 血源性感染
- D. 手术污染

正确答案：

C

32. 男，45岁。上腹部间断疼痛10余年。多于餐后半小时出现上腹饱胀、疼痛。平素常有反酸、暖气，偶有大便颜色发黑。近半年来疼痛不规律，餐前、餐后均可发能够进行确诊的检查是（）

- A. 超声内镜
- B. 腹部CT
- C. 腹部MRI
- D. 胃镜及组织活检病理

正确答案：

D

33. Hippocrates 法治疗的是

- A. 膝关节脱位
- B. 髌关节脱位
- C. 肘关节脱位
- D. 肩关节脱位
- E. 腕关节脱位

正确答案：

D

34. 简述感受器的一般生理特性。

正确答案：

(1) 适宜刺激：一种感受器通常只对某种特定形式的能量变化最敏感。

(2) 换能作用：感受器能把作用于它们的各种形式的刺激能量转换为传入神经的动作电位。

(3) 适应现象：当刺激作用于感受器时，虽然刺激仍持续作用，但其感觉传入神经纤维上的动作电位频率已开始逐渐下降的现象称为感受器的适应。

(4) 编码作用：即感受器把外界刺激转换为神经动作电位时，不仅发生了能量形式的转换，而且把刺激所包含的环境变化的信息，也转移到了动作电位的序列之中。

35. 与食管腺癌病关系密切的病理改变是

A. Barrett 上皮

B. 胃上皮化生

C. 乳头状瘤

D. 胃黏膜上皮细胞异型增生

E. 黏膜中性粒细胞浸润

正确答案：

A

36. 男性，35岁，突发性中上腹痛，1天后出现下腹部疼痛，特别是右下腹痛，诊断为急性阑尾炎入院，患者入院后拒绝手术治疗，庆大霉素等抗感染治疗，两天后热不退，突然出现寒战，高热，黄疸等症状，体检时发现右上腹压痛明显，伴肝脏肿大，白细胞升高。下列哪种方案不恰当

A. 查 AFP，CEA 排除肝癌可能

B. 开腹行阑尾切除术

C. 加强抗炎药物应用及支持疗法

D. 纠正水，电解质及酸碱失衡第 25 页

E. 出现休克时先纠正休克，同时抗感染治疗

正确答案：

E

37. 普通型流行性脑脊髓膜炎临床分期不包括

A. 恢复期

B. 败血症期

C. 前驱期

D. 脑膜炎期

E. 发热期

正确答案：



E

38. 男, 59 岁。外伤致右腕部疼痛、肿胀 1 小时。既往体健, 无糖尿病病史。查体: T36.8°C, P70 次/分, R18 次/分, BP100/60mmHg, 心肺腹未见异常, 右腕部疼痛、肿胀、活动受限。X 线片检查: 桡骨下端骨皮质不连续, 对位对线良好, 并有嵌插。最恰当的治疗措施是

- A. 皮牵引
- B. 中药活血化瘀
- C. 中药活血化瘀
- D. 骨牵引
- E. 手法复位外固定

正确答案:

E

39. 下列除哪项外, 均可诊断糖尿病

- A. 症状+随机血糖 $\geq 11.1\text{mmol/L}$ +空腹血糖 $\geq 7.8\text{mmol/L}$
- B. 随机血糖 $\geq 7.8\sim 11.1\text{mmol/L}$ +2h 血糖 $\geq 11.1\text{mmol/L}$
- C. 口服葡萄糖后 1h 血糖 $\geq 11.1\text{mmol/L}$
- D. 两次 OGTT2h 血糖 $\geq 11.1\text{mmol/L}$
- E. 空腹血糖 $\geq 5.6\sim 7.8\text{mmol/L}$ +2h 血糖 $\geq 7.8\sim$

正确答案:

E

40. 溶血性黄疸

- A. 皮肤呈柠檬色
- B. 皮肤呈浅黄色或金黄色
- C. 皮肤呈黄绿色、深绿色或绿褐色
- D. 皮肤呈浓茶色
- E. 皮肤呈苍白色

正确答案:

B

41. 佩戴金属首饰后局部皮肤出现炎症反应, 其免疫病理基础可能是 ( )

- A. II 型超敏反应
- B. I 型超敏反应
- C. III 型超敏反应
- D. IV 型超敏反应

正确答案:

D

42. Rotch 征是指

- A. 心浊音界向两侧增大，呈绝对浊音
- B. 心尖冲动微弱，位于心浊音界左缘的内侧或不能扪及
- C. 背部左肩胛角下呈浊音，语颤增强和支气管呼吸音
- D. 胸骨右缘第 3-6 肋间出现实音
- E. 心音低而遥远

正确答案：

D

43. 细支气管不完全阻塞所致的阻塞性通气障碍可造成（）

- A. 肺不张
- B. 肺纤维化
- C. 支气管扩张
- D. 肺气肿

正确答案：

D

44. 医务人员在诊疗活动中需要实施手术、特殊检查、特殊治疗时应当

- A. 向患者说明医疗风险、替代方案等，并取得其书面同意
- B. 向患者说明医疗风险、替代方案等，并取得其口头同意
- C. 向患者的近亲属说明医疗风险、替代方案等，并取得其书面同意
- D. 向患者的近亲属说明医疗风险、替代方案等，并取得其口头同意
- E. 医务人员对诊疗内容负全责，不需向患者及其近亲属说明

正确答案：

A

45. 腰椎间盘突出症与腰椎管狭窄症临床症状的主要鉴别点是

- A. 有无鞍区感觉障碍
- B. 间歇性跛行是否为主要特点
- C. 双下肢无力的程度
- D. 二便是否障碍
- E. 腰痛及下肢放射痛的程度

正确答案：

B

46. 男，68 岁，近一年来自觉长距离行走时感气短，休息后可好转，否认呼吸系统疾病及心脏病史，查体未见明显异常。血常规及胸部 X 线片检查大致正常，为明确诊断，应首先进行的检查是

- A. UCG
- B. D-二聚体

- C. 动脉血气分析
- D. 胸部 CT
- E. 肺功能

正确答案:

A

47. 肺炎链球菌可引起 ( )

- A. 支气管肺炎
- B. 肺脓肿
- C. 大叶性肺炎(即典型肺炎)
- D. 支气管哮喘

正确答案:

C

48. 假设检验的两类错误, 以下说法正确的是

- A. I 型错误: 拒绝实际上不成立的  $H_0$
- B. I 型错误的概率常用  $\beta$  表示
- C. II 型错误是“弃真”的错误
- D. II 型错误: 不拒绝实际上不成立的  $H_0$
- E. 以上都不对

正确答案:

D

49. 急进性肾小球肾炎 II 型最常见的检测异常是

- A. 循环免疫复合物阳性
- B. 血抗肾小球基底膜抗体阳性
- C. 血清中性粒细胞胞浆抗体 (ANCA) 阳性
- D. 血单克隆免疫球蛋白升高
- E. 血冷球蛋白阳性

正确答案:

A

50. 男, 19 岁。初发肾病综合征, 应用泼尼松 60mg/d 治疗 8 周, 水肿无明显好转, 复查尿蛋白仍大于 3.5g/d, 肾活检提示微小病变型肾病。下一步最适宜的治疗是

- A. 加用人血白蛋白
- B. 加用免疫抑制剂
- C. 增加泼尼松剂量
- D. 大剂量静脉应用免疫球蛋白
- E. 加用 ACEI/ARB

正确答案:

B

51. 男，38岁。3个月前搬重物后出现腰痛伴右下肢麻木疼痛，诊断为腰椎间盘突出症，经保守治疗后症状缓解，症状逐渐加重。2小时前出现大小便障碍，查体：T36.6℃，P89次/分，BP110/60mmHg，心肺腹未见异常，右下肢肌力4级，感觉减退，会阴部感觉减退，目前首选的治疗方法是

- A. 理疗按摩
- B. 牵引治疗
- C. 激素注射
- D. 急症手术
- E. 卧床休息

正确答案：

D

52. 良性高血压病脑的病理变化为（）

- A. 小动脉和细动脉发生玻璃样变；
- B. 脑膜发生了炎症反应
- C. 脑软化
- D. 脑组织化脓

正确答案：

A

53. 申请行政复议的申请人必须在指导具体行政行为之日起（）

- A. 15天
- B. 30天
- C. 60天
- D. 90天

正确答案：

C

54. 肺炎球菌肺炎患者若对青霉素过敏，宜选用的有效抗菌药物是（）

- A. 庆大霉素
- B. 阿米卡星
- C. 链霉素
- D. 左氧氟沙星

正确答案：

B

55. 糖尿病失明的主要原因是

- A. 视神经病变

- B. 糖代谢异常
- C. 血凝块机化后，纤维组织牵拉引起视网膜脱离
- D. 眼部化脓性感染
- E. 以上均不正确

正确答案：

C

56. 属于医师在执业活动中应履行的义务是（）

- A. 在注册的执业范围内，进行医学诊查、疾病调查、医学处置、出具相应的医学证明文件，选择合理的医疗、预防、保健方案
- B. 按照国务院卫生行政部门规定的标准，获得与本人执业活动相当的医疗设备基本条件
- C. 宣传卫生保健知识，对患者进行健康教育
- D. 从事医学研究、学术交流，参加医师协会和专业学术团体

正确答案：

C

57. 产时窒息的婴儿，紧急治疗措施首先是

- A. 弹足底，刺激呼吸
- B. 吸氧
- C. 人工呼吸
- D. 注射呼吸兴奋剂
- E. 清除呼吸道分泌物

正确答案：

D

58. 关于紫癜型过敏性紫癜的临床表现中，描述正确的是

- A. 可有粘膜下水肿、出血
- B. 血管壁可有灶性坏死及血小板血栓形成
- C. 脐周围或下腹部呈阵发性绞痛或持续性钝痛
- D. 蛋白尿、血尿、管型尿
- E. 关节肿胀、疼痛

正确答案：

CDE

59. 男，19岁。发热、咳嗽伴左胸痛5天。既往体健。查体：T39.5°C，左下肺叩诊呈浊音，可闻及支气管呼吸音。该患者最可能感染的病原体是

- A. 结合分枝杆菌
- B. 肺炎链球菌
- C. 金黄色葡萄球菌
- D. 肺炎支原体
- E. 铜绿假单胞菌

正确答案：

B

60. 影响动脉血氧分压高低的主要因素是

- A. 血红蛋白的含量
- B. 组织供血
- C. 血红蛋白与氧的亲合力
- D. 肺呼吸功能
- E. 线粒体氧化磷酸化酶活性

正确答案：

D

61. 下列含有 B 族维生素的辅酶，例外的是

- A. 磷酸吡哆醛
- B. 辅酶 A
- C. 细胞色素 b
- D. 四氢叶酸
- E. 硫胺素焦磷酸

正确答案：

C

62. 男，59 岁。吞咽困难半年余，进行性加重，现只能进流食，并出现胸痛及咳嗽。该患者食管 X 线钡剂造影检查不可能出现的影像是

- A. 食管造影是气道内出现造影剂
- B. 食管下段呈鸟嘴症改变，边缘光滑
- C. 局部食管腔扩张
- D. 不发食管腔明显狭窄
- E. 食管管壁僵硬，蠕动中断

正确答案：

B

63. 治疗慢性粒细胞性白血病，首选（）

- A. 二溴甘露醇
- B. 长春新碱
- C. 靛玉红
- D. 羟基脲

正确答案：

D

64. 女，30 岁。4 年前血小板减少，2 年前间断面部红斑伴低热。实验室检查：抗核抗体 (+)，抗心磷脂抗体 (+)，诊断系统性红斑狼疮。此次妊娠 6 个月，胎死宫内，同时出现左

下肢深静脉血栓。考虑合并的疾病是

- A. 妊娠期高血压疾病
- B. 干燥综合征
- C. 弥散性血管内凝血
- D. 抗磷脂综合征
- E. 血管闭塞性脉管炎

正确答案：

D

65. 在脊髓半横断患者，横断平面以下（）

- A. 对侧本体感觉障碍
- B. 对侧精细触觉障碍
- C. 同侧痛、温觉障碍
- D. 对侧痛、温觉障碍

正确答案：

D

66. 高血压病脑出血最常见的部位是（）

- A. 豆状核和丘脑
- B. 内囊和基底节
- C. 蛛网膜下腔
- D. 侧脑室

正确答案：

B

67. 女，22岁，医学生最近与男友发生了激烈的争执，以致两人分手，情绪极度低落，也十分愤恨，来找学校心理咨询师寻求帮助。心理咨询师针对其情绪的调节提出的办法中不适合的是（）

- A. 降低期望
- B. 放松训练
- C. 改变认知
- D. 不断宣泄

正确答案：

D

68. 确定肺结核是否为传染源的最主要依据是（）

- A. 血沉检查
- B. X线检查
- C. 痰结核菌检查
- D. 结核菌素试验

正确答案：

C

69. 男，55岁。诊断乙肝肝硬化4年，黑便2天，不认家人、吵闹2小时。下列治疗中不恰当的是

- A. 静脉应用奥美拉唑
- B. 口服地西洋
- C. 静脉应用生长激素
- D. 口服乳果糖
- E. 口服利福昔明

正确答案：

B

70. 失眠症治疗时，下列哪个药常用于白天

- A. 安定
- B. 艾司唑仑
- C. 利眠定
- D. 阿普唑仑
- E. 氯硝基安定

正确答案：

C

71. 洋地黄中毒最常见的心电图表现是（）

- A. 心房颤动
- B. 室性期前收缩
- C. 房性期前收缩
- D. ST-T缺血性改变

正确答案：

D

72. 急性阑尾炎患者，未及时就诊，出现右下腹部包块，有压痛，最可能的情况是

- A. 阑尾坏疽穿孔
- B. 阑尾类癌
- C. 形成阑尾周围脓肿
- D. 门静脉炎
- E. 盲肠后位阑尾炎

正确答案：

C

73. 女，21岁。1型糖尿病8年，平素4次(R-R-R-N)胰岛素皮下注射治疗，定期查糖化血红蛋白7.5%-8%，2日前患者受凉后发热，体温37.5°C-38°C，因食欲不佳，自行停用胰岛素，改用阿卡波糖治疗。渐出现恶心。食欲不振，呕吐少量胃内容物，尿中有异味。查



体:102次/分。P90/60mmHg, 体重 55Kg, 轻度脱水貌, 精神萎靡, 实验室检查: 随机血糖 25.6mmol/L, 血钾 4.8mmol/L, 血钠 144mmol/L, 尿糖(++++) , 尿酮体(+++) ;动脉血气分析 PH 值 7.25。患者入院后尿量约 50ml/h, 复查血钾 4.0mmol/L。关于补钾治疗应采取

- A. 每 2 小时测定血钾, 低于 3.5mmol/L 开始补钾
- B. 开始口服补钾
- C. 开始静脉补钾
- D. 两次检测血钾均正常, 不需要补钾
- E. 观察尿量如果有进一步的增加, 则补钾

正确答案:

E

74. 下列哪项属于肾功能不全的衰竭期

- A. GFR>50ml/min, Cr>445umol/L, BUN
- B. GFR25~50ml/min, Cr>178umol/L, BUN
- C. GFR178umol/L, BUN>20mmol/L
- D. GFR25 — 50ml/min, Cr>445umol/L, BUN>20mmol/L
- E. GFR445umol/L, BUN>2mmol/L

正确答案:

E

75. 慢性肾盂肾炎的镜下特征性病变是

- A. 蛋白管型和新月体
- B. 红细胞管型和小球出血
- C. 颗粒管型和小球坏死
- D. 透明管型和小球增生
- E. 胶样管型和球周纤维化

正确答案:

E

76. 男, 32 岁。支气管哮喘, 20 年。喘息加重 1 周。意识恍惚 1 天来急诊。查体: T37.5C, P94/分。面色暗红, 口唇发绀。可见胸腹矛盾运动, 双肺呼吸音低, 可闻及低调哮鸣音。该患者此时最可能出现的动脉血气变化

- A. PaO<sub>2</sub> 降低、PaCO<sub>2</sub> 降低、PH 升高
- B. PaO<sub>2</sub> 降低、PaCO<sub>2</sub> 升高、PH 降低
- C. PaO<sub>2</sub> 降低、PaCO<sub>2</sub> 升高、PH 升高
- D. PaO<sub>2</sub> 降低、PaCO<sub>2</sub> 升高、PH 正常
- E. PaO<sub>2</sub> 降低、PaCO<sub>2</sub> 正常、PH 降低

正确答案:

B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/826032134012010110>