



卫生事业单位招聘考试（临床医学专业知识）真题试卷汇编（一）
(总分 206, 做题时间 90 分钟)

1. 不定项选择题

不定项选择题下列各题的备选答案中，有一个或多个是符合题意的，请选出所有符合题意的备选答案。

1.

以下哪项肺功能指标对阻塞性肺气肿的诊断最有价值?()

	SSS_MULTI_SEL
--	---------------

- A 每分钟静息通气量
- B 肺活量
- C 动脉血氧分压
- D 残气量、残气量 / 肺总量

该题您未回答: x 该问题分值: 2

答案: B

解析: 不完全可逆的气流受限是该疾病的诊断必备条件。吸入支气管扩张药后 $FEV_1 / FVC < 70\%$ 及 $FEV_1 < 80\%$ 预计值可确定为不完全可逆性气流受限。

2.

胸膜摩擦音见于()。

	SSS_MULTI_SEL
--	---------------

- A 结核性干性胸膜炎
- B 结核性渗出性胸膜炎
- C 肺结核并发气胸
- D 金黄色葡萄球菌肺炎

该题您未回答: x 该问题分值: 2

答案: A, B

解析: 胸膜有炎症时, 由于两层胸膜纤维蛋白沉着而使其表面变得粗糙, 深呼吸时两层胸膜产生明显摩擦。有如触及皮革相互摩擦的感觉。见于纤维素性胸膜炎、渗出性胸膜炎早期等。

3.

患者, 心悸、气短 1 年, 劳累后加重。检查: 脉搏 80 次 / 分, 节律不规整, 心率约为 110 次 / 分, 心律完全不规则, 心音强弱绝对不一致, 此患者心律失常类型为()。

	SSS_MULTI_SEL
--	---------------

- A 窦性心律不齐
- B 窦性心动过速
- C 心房纤维颤动
- D 室上性心动过速

该题您未回答: x 该问题分值: 2

答案: C

解析：房颤典型的临床表现脉搏短绌。

4.

关于诊断室间隔缺损的描述，不正确的是()。

	SSS_MULTI_SEL
--	---------------

- A 胸骨左缘 3、4 肋间粗糙的收缩期杂音
- B 反复呼吸道感染
- C 心电图电轴右偏，不完全性右束支阻滞
- D X 线肺门血管增粗，肺野充血

该题您未回答：x 该问题分值：2

答案:C

解析：心电图电轴右偏，不完全性右束支阻滞为房间隔缺损的心电图表现。

5.

腹痛位于中上腹部，疼痛于卧位时加重，前倾位可减轻，多见于下列哪种疾病?()

	SSS_MULTI_SEL
--	---------------

- A 急性胆囊炎
- B 急性胃炎
- C 急性阑尾炎
- D 急性胰腺炎

该题您未回答：x 该问题分值：2

答案:D

解析：急性胰腺炎腹痛为首发症状，呈持续性，疼痛部位多在中上腹，可向腰背部呈带状放射，取弯腰抱膝位可减轻疼痛。急性胆囊炎腹痛常位于右上腹，放射到右肩部。急性胃炎多数感上腹不适或隐痛。急性阑尾炎为转移性右下腹疼痛，麦氏点固定压痛，反跳痛。

6.

应激性溃疡出血时，错误的治疗是()。

	SSS_MULTI_SEL
--	---------------

- A 使用 H₂ 受体拮抗剂
- B 使用胃粘膜保护剂
- C 行胃壁切开电灼止血
- D 胃镜下止血治疗

该题您未回答：x 该问题分值：2

答案:C

解析：应激性溃疡出血多数不经特殊处理可自行止血。治疗措施主要有抑制胃酸分泌药物、保护胃黏膜药物，多数不经特殊处理可自行止血，部分患者量体裁衣持续出血或再出血。内镜如见活动性出血或暴露血管的溃疡应进行内镜止血。有效方法包括热探头、高频电灼、激光、微波等有效治疗。

7.

肿大的甲状腺与颈前其他包块的鉴别，下列哪项最重要?()

	SSS_MULTI_SEL
--	---------------

- A 肿块表面光滑
- B 肿块位于甲状软骨下方
- C 肿块可随吞咽动作移动
- D 肿块在胸锁乳突肌以内

该题您未回答: x 该问题分值: 2

答案:C

解析: 甲状腺位于甲状软骨下方和两侧，正常表面光滑、柔软不易触及。触诊时可嘱被检者配合做吞咽动作，随吞咽而上、下移动者即为甲状腺。

8.

X 线下见右下肺出现大片的浓密阴影，其内见一个含有液平面的圆形空洞，洞内壁光整，洞壁较厚。应首先考虑的是 ()。

	SSS_MULTI_SEL
--	---------------

- A 肺大泡
- B 肺脓肿
- C 周围型肺癌空洞形成
- D 慢性纤维空洞型肺结核

该题您未回答: x 该问题分值: 2

答案:B

解析: 肺脓肿形成后，脓液经支气管排出，脓腔出现圆形透亮区及气液平面，脓腔内壁光整或略有不规则。空洞性肺结核 X 线显示空洞壁较厚，一般无气液平面，空洞周围炎性病变较少，常伴有条索、斑点及结节状病灶。周围型肺癌空洞壁较厚，多呈偏心空洞，残留的肿瘤组织使内壁凹凸不平，周围有少许炎症浸润。

9.

对诊断急性胰腺炎最有价值的血清酶检查是 ()。

	SSS_MULTI_SEL
--	---------------

- A 谷草转氨酶
- B 淀粉酶
- C 碱性磷酸酶
- D 谷丙转氨酶

该题您未回答: x 该问题分值: 2

答案:B

解析: 血淀粉酶超过正常 3 倍就可以确诊为急性胰腺炎。

10.

支气管哮喘与心源性哮喘一时难以鉴别时，可采用下列哪种药物 ?()

	SSS_MULTI_SEL
--	---------------

- A 呋塞米
- B 吗啡或哌替啶

C

雾化吸入 β_2 肾上腺素受体激动剂

D 西地兰

该题您未回答: x

该问题分值: 2

答案:C

解析: 支气管哮喘与心源性哮喘若一时难以鉴别, 可雾化吸入 β_2 肾上腺素受体激动剂或静脉注射氨茶碱缓解症状后, 进一步检查, 忌用肾上腺素或吗啡, 以免造成危险。

11.

女性, 26 岁, 风湿性心脏病二尖瓣狭窄伴主动脉瓣关闭不全患者, 发热两周。体检: T38.3°C, 口腔黏膜及下肢皮肤多处瘀点, 心率 104 次/分, 律齐, 二尖瓣闻及 2/6 级收缩期杂音及舒张期杂音, 主动脉瓣区舒张期杂音, 腹软, 脾左肋下 2cm, 有压痛。该患者应进行下列哪项检查最能明确诊断? ()

SSS_MULTI_SEL

A ESR+ASO

B 尿常规+肾功能

C 血培养

D 心电图

该题您未回答: x

该问题分值: 2

答案:C

12.

婴儿腹泻有明显周围循环衰竭时, 扩容宜选用 ()。

SSS_MULTI_SEL

A 高张含钠溶液

B 等张含钠溶液

C 2/3 张含钠溶液

D 1/2 张含钠溶液

该题您未回答: x

该问题分值: 2

答案:B

解析: 重度脱水或有周围循环衰竭者应首先静脉推注或静脉快速滴入 2:1 等张含钠液 20ml/kg, 总量不超过 300ml, 于 30~60 分钟内静脉输入, 以扩充血容量, 改善血循环和肾功能。

13.

男性, 42 岁, 有高血压史, 4 小时前因劳累而感觉头痛, 烦躁, 心悸, 多汗, 恶心, 面色苍白, 视力模糊, 收缩压 260mmHg, 舒张压 140mmHg。最宜采用 ()。

SSS_MULTI_SEL

A 氢氯噻嗪口服

B 心得安口服

C 安定肌注

D 硝普钠静滴

该题您未回答: x

该问题分值: 2

答案:D

解析: 在治疗高血压急症时要选择起效迅速, 短时间内达到最大作用, 不良反应较小, 最好在降压过程中不明显影响心率、心输出量和脑血流量。硝普钠、硝酸甘油、尼卡地平注射液相对比较理想, 大多首选硝普钠。

14.

溃疡性结肠炎治疗首选药物是()。

SSS_MULTI_SEL

A 甲硝唑

B 阿莫西林

C 强的松

D 柳氮磺胺吡啶

该题您未回答: x

该问题分值: 2

答案:D

解析: 溃疡性结肠炎常用药物有氨基水杨酸制剂、糖皮质激素免疫抑制剂。首选氨基水杨酸制剂(柳氮磺胺吡啶), 糖皮质激素免疫抑制剂用于氨基水杨酸制剂疗效不佳或急性发作时。

15.

关于肺小细胞未分化癌的叙述, 下列哪项不正确?()

SSS_MULTI_SEL

A 恶性程度最高, 早期远处转移

B 痰检癌细胞阳性率低

C 易产生副癌综合征

D 对化疗与放疗敏感

该题您未回答: x

该问题分值: 2

答案:B

解析: 肺小细胞未分化癌恶性程度最高, 初诊时可发现胸外转移灶, 对化疗与放疗敏感; 癌细胞浆内含有神经内分泌颗粒, 具有内分泌和化学受体功能, 能分泌5-羟色胺、儿茶酚胺、组胺、激肽等肽类物质, 可引起副癌综合征; 痰标本收集方法得当, 3次以上的系列痰标本可使其诊断率高达80%。

16.

引起大叶性肺炎最常见病原菌为()。

SSS_MULTI_SEL

A 葡萄球菌

B 结核菌

C 肺炎球菌

D 肺炎克雷伯杆菌

该题您未回答: x

该问题分值: 2

答案:C

解析：大叶性肺炎致病菌多为肺炎链球菌。

17.

以下哪项最符合病毒性心肌炎的临床表现?()

	SSS_MULTI_SEL
--	---------------

- A 寒战、高热、呼吸困难，偶见心律失常
- B 剧烈胸痛，发热，心电图出现 Q 波，ST 段弓背向上抬高
- C 发热，P-R 间期延长，血清抗“O”增高
- D 最先有低热、倦怠，与发热程度不平行的心动过速，各种心律失常

该题您未回答：x 该问题分值：2

答案:D

解析：病毒性心肌炎约半数发病前 1~3 周有病毒感染前驱症状，如发热、全身倦怠感，或恶心、呕吐等消化道症状。然后出现心悸、呼吸困难、水肿。甚至阿-斯综合征。体检可见与发热程度不平行的心动过速，各种心律失常等。心电图常见 ST-T 改变，室性心律失常和房室传导阻滞。血清肌钙蛋白、心肌肌酸激酶增高，血沉加快，高敏 C 反应蛋白增加等有助于诊断。

18.

抢救过敏性休克时，应首先选用 ()。

	SSS_MULTI_SEL
--	---------------

- A 多巴胺
- B 肾上腺素
- C 异丙嗪
- D 地塞米松

该题您未回答：x 该问题分值：2

答案:B

19.

女，38 岁，肝硬化腹水患者，1 周来畏寒发热，体温在 38℃左右，全腹痛，腹部明显膨隆，尿量 500ml / 日。应注意下列哪种体征?()

	SSS_MULTI_SEL
--	---------------

- A 蜘蛛痣及肝掌
- B 全腹压痛及反跳痛
- C 脾肿大
- D 腹部移动性浊音

该题您未回答：x 该问题分值：2

答案:B

解析：肝硬化用水患者常并发自发性细菌性腹膜炎，其发病率及高，体检发现轻重不等的全腹压痛和腹膜刺激征。可诱发肝性脑病。应予以注意。

20.

以下哪项不属于红细胞内部异常所致的溶血性贫血?()

	SSS_MULTI_SEL
--	---------------

- A 自身免疫性溶血性贫血

- B 阵发性睡眠性血红蛋白尿
- C 遗传性球形细胞增多症
- D 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏

该题您未回答: x 该问题分值: 2

答案:A

解析: 属于红细胞内部异常所致的溶血性贫血包括: 遗传性球形细胞增多症、阵发性睡眠性血红蛋白尿、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症、丙酮酸激酶缺乏症、血红蛋白病 S、D、E 以及血红素异常。自身免疫性溶血性贫血为红细胞外部异常所致的 HA。

21.

急性肝功能衰竭实验室检查一般不会出现()。

SSS_MULTI_SEL

- A 转氨酶增高
- B 胆红素增高
- C 凝血酶原时间缩短
- D 血肌酐增高

该题您未回答: x 该问题分值: 2

答案:C

22.

男, 40 岁, 3 天前体检时 B 超发现右肝内一肿物, 直径 3cm 血 AFP 500 $\mu\text{g/L}$ 。最有效的处理方法是()。

SSS_MULTI_SEL

- A 经股动脉插管治疗
- B 经皮肿瘤穿刺注射无水酒精
- C 行肝段切除术
- D 放射治疗

该题您未回答: x 该问题分值: 2

答案:C

解析: 早期肝癌和小肝癌的应尽量手术切除, 不能切除者应采取综合治疗的模式。

23.

某患者, 肥胖, 多血质面容, 血 ACTH 升高, 血皮质醇升高, 大剂量地塞米松抑制试验可被抑制, CT 见垂体微腺瘤, 最可能的肾上腺病理改变为()。

SSS_MULTI_SEL

- A 肾上腺皮质腺瘤
- B 肾上腺皮质癌
- C 肾上腺皮质萎缩
- D 肾上腺皮质增生

该题您未回答: x 该问题分值: 2

答案:D

解析：此病例考虑为依赖 ACTH 的库欣综合征：垂体 ACTH 分泌过多伴肾上腺皮质增生，垂体多有微腺瘤，少数为大腺瘤或垂体以外肿瘤分泌大量 ACTH，伴肾上腺皮质增生。

24.

女，45 岁，间断发作心悸，大汗，手抖 6 月余，发作时伴饥饿感，无黑朦，眩晕等。查体：血压 140 / 90mmHg，睑结膜无苍白，心率 68 次 / 分，律齐，发作时测血压与平素无明显变化。其心悸反复发作最可能的病因是（ ）。

SSS_MULTI_SEL

- A 贫血
- B 甲状腺功能亢进症
- C 低血糖症
- D 急性心肌炎

该题您未回答：x 该问题分值：2

答案：C

解析：患者睑结膜无苍白，无贫血表现，可排除 A 选项；基础代谢率正常，故排除 B 选项；急性心肌炎会出现与体温不平行的心动过速，一般可无大汗，故排除 D 选项。

25.

肝硬化腹水患者，一般每日进水量宜控制在（ ）。

SSS_MULTI_SEL

- A <500ml
- B 500~1000ml
- C 1500~2000ml
- D 2000~2500ml

该题您未回答：x 该问题分值：2

答案：B

26.

女性，26 岁，既往月经规律，停经 50 天，近 3 天晨起呕吐，厌油食，伴有轻度尿频，仍坚持工作。可能的诊断是（ ）。

SSS_MULTI_SEL

- A 病毒性肝炎
- B 膀胱炎
- C 继发性闭经
- D 早期妊娠

该题您未回答：x 该问题分值：2

答案：D

27.

特发性血小板减少紫癜治疗首选（ ）。

SSS_MULTI_SEL

- A 肾上腺糖皮质激素

- B 脾切除
- C 输浓缩血小板
- D 静脉滴注大剂量丙种球蛋白

该题您未回答: x 该问题分值: 2

答案:A

解析: 特发性血小板减少紫癜治疗首选糖皮质激素治疗. 常用药物为泼尼松。
28.

女性, 28岁, 21岁时因心慌、怕热、多汗、消瘦就诊, 确诊 Graves 病。再次他巴唑治疗, 2个月后甲状腺功能正常, 继续治疗一年半停药。最近2个月甲亢的症状、体征再现, 查血 T₃、T₄ 及 TSH 确认为甲亢第二次复发。患者结婚5年, 尚未生育, 希望治疗甲亢后怀孕, 拟选用()。

SSS_MULTI_SEL

- A 直接行甲状腺大部分切除术
- B 再次他巴唑治疗, 疗程延长 3-4 年
- C 用他巴唑, 甲状腺功能正常后加用 ¹³¹I 治疗
- D 用他巴唑。甲状腺功能正常后行甲状腺大部分切除手术

该题您未回答: x 该问题分值: 2

答案:D

解析: 患者甲亢反复发作, 有生育需求, 应选择甲状腺大部分切除手术。手术治疗治愈率 95%, 应给予抗甲状腺药物术前准备。

29.

男, 25岁, 反复上腹痛、反酸 4年。胃镜检查示十二指肠球部溃疡, 尿素酶试验阳性, 治疗方案首选抑酸剂加()。

SSS_MULTI_SEL

- A 解痉剂
- B 两种有效抗生素
- C 胃粘膜保护剂
- D 促胃动力剂

该题您未回答: x 该问题分值: 2

答案:B

解析: 患者尿素酶试验阳性, 可确诊有幽门螺旋杆菌感染, 故治疗应选择根除幽门螺旋杆菌治疗, 从而彻底治愈溃疡。常用治疗方案为抑酸剂为基础加上两种抗生素的三联方案。

30.

急性白血病可出现()。

SSS_MULTI_SEL

- A 胸骨压痛
- B 肢端麻木
- C 黄疸贫血

D 浅表淋巴结肿大

该题您未回答: x

该问题分值: 2

答案:A, D

解析: 急性白血病临床表现: (1) 正常骨髓造血功能受抑制表现有贫血(无黄疸)、发热、出血; (2) 白血病细胞增殖浸润的表现有浅表淋巴结肿大, 纵隔淋巴结肿大和肝脾肿大; 骨骼关节疼痛(常有胸骨下段压痛); 粒细胞瘤或绿色瘤最常累及眼眶骨膜引起眼球突出或失明; 中枢神经系统白血病表现为头痛、头晕, 重者呕吐、颈项强直, 甚至抽搐、昏迷; 睾丸无痛性肿大以及肺、心、消化道、泌尿生殖系统受累等。

31.

女性, 65岁, 多食多尿20天, 体重由55kg降45kg, 空腹血糖7.8mmol/L, 餐后血糖12.4mmol/L, 糖(++), 尿酮体(-), 宜选择()。

SSS_MULTI_SEL

A 饮食疗法

B 运动疗法

C 双胍类

D 胰岛素

该题您未回答: x

该问题分值: 2

答案:A, B, D

32.

甲状腺危象的主要原因是()。

SSS_MULTI_SEL

A 手术时过多挤压甲状腺

B 术前准备未达要求

C 切除腺体不足

D 切除腺体过多

该题您未回答: x

该问题分值: 2

答案:A, B

解析: 甲状腺危象的主要原因多为甲亢治疗或术前准备不充分及术中过多挤压甲状腺所致。

33.

抢救氰化物中毒, 选用()。

SSS_MULTI_SEL

A 亚硝酸钠+硫代硫酸钠

B 阿托品

C 小剂量亚甲蓝

D 二巯基丁二酸胶囊

该题您未回答: x

该问题分值: 2

答案:A

34.

关于使用止血带，下列哪项是错误的？()

	SSS_MULTI_SEL
--	---------------

- A 止血带应设在出血的近心端
- B 转运前应在转运卡上写明上止血带的时间
- C 上肢止血带最好放在上臂中 1 / 3
- D 上带前放置衬垫，转运中严密观察

该题您未回答：x 该问题分值：2

答案:C

解析：止血带绕扎部位：扎止血带的标准位置在上肢为上臂上 1 / 3。下肢为股中、下 1 / 3 交界处。上臂中、下 1 / 3 部扎止血带容易损伤桡神经，应视为禁区。止血带的松紧要合适：止血带的松紧应该以出血停止、远端以不能摸到脉搏为度。止血带不可直接缠在皮肤上，上止血带的相应部位要有衬垫，如三角巾、毛巾、衣服等均可，要求有明显标志，说明上止血带的时间和部位。

35.

抽羊水细胞作染色体检查的时间宜选在 ()。

	SSS_MULTI_SEL
--	---------------

- A 孕 10~12 周
- B 孕 16~20 周
- C 孕 24~36 周
- D 孕 30 周后

该题您未回答：x 该问题分值：2

答案:B

解析：羊膜腔穿刺一般选择孕期在 16~18 周时，在无菌条件下抽取羊水 10~20ml，注入 10ml 离心管中，立即送实验室。

36.

女，25 岁，低热两个月伴干咳，抗炎治疗无效。胸片未见明显异常，痰涂片找到抗酸杆菌。最可能的诊断是 ()。

	SSS_MULTI_SEL
--	---------------

- A 支原体肺炎
- B 过敏性肺炎
- C 支气管内膜结核
- D 结节病

该题您未回答：x 该问题分值：2

答案:C

解析：一般细菌无抗酸性，痰涂片找到抗酸杆菌是结核病与其他细菌重要鉴别诊断方法之一。

37.

急性肾小球肾炎，下行性水肿，双膝关节以下指压凹陷明显。两天来尿少。下列哪两项检查结果最相符？()

	SSS_MULTI_SEL
--	---------------

- A 大量蛋白尿
- B 血尿素氮异常
- C 高胆固醇血症
- D 尿中有蜡样管型

该题您未回答: x 该问题分值: 2

答案:A, B

解析: 急性肾小球肾炎几乎全部有血尿, 可伴有轻、中度蛋白尿, 少数患者可呈肾病综合征范围的大量蛋白尿, 尿沉渣除红细胞外, 早期尚可见白细胞和上皮细胞稍增多。并可有颗粒管型和红细胞管型; 水肿为起病的初发表现; 80% 患者出现一过性轻、中度高血压; 肾功能异常表现为轻度氮质血症; 老年患者可发生充血性心力衰竭; 免疫学检查异常。

38.

女性, 50 岁, 反复低热 1 年, 伴四肢小关节肿痛。WBC $8.0 \times 10^9 / L$, Hb $100g / L$ 。ANA(-), RF(+). 经多种抗生素正规治疗无效。最可能的诊断是 ()。

SSS_MULTI_SEL

- A 风湿热关节炎
- B 系统性红斑狼疮
- C 骨关节炎
- D 类风湿性关节炎

该题您未回答: x 该问题分值: 2

答案:D

解析: 骨关节炎多先累及膝、脊柱等负重关节。系统性红斑狼疮部分患者以手指关节肿痛为首发症状, 且部分患者 RF 阳性, 且关节外的系统性症状如蝶形红斑、脱发、蛋白尿等较突出, 血清 ANA、抗双链 DNA 抗体等多种自身抗体阳性。风湿性关节炎属变态反应性疾病, 是风湿热的主要表现之一。多以急性发热及关节疼痛起病, 发病前 1~4 周有溶血性链球菌感染史, 典型表现为急性游走性大关节炎, 受累关节多为膝、踝、肩、肘、腕等大关节, 常伴有风湿热的其他表现如心肌炎、环形红斑、皮下结节等。临床上用青霉素控制链球菌感染有效。

39.

对骨的生长和骨折后的修复都有十分重要的作用的结构是 ()。

SSS_MULTI_SEL

- A 骨密质
- B 骨松质
- C 骨髓
- D 骨膜

该题您未回答: x 该问题分值: 2

答案:D

40.

小儿阵发性室上性心动过速最常见于 ()。

	SSS_MULTI_SEL
--	---------------

- A 上呼吸道感染
- B 电解质紊乱
- C 预激综合征
- D 情绪激动

该题您未回答: x 该问题分值: 2

答案:C

解析: 小儿阵发性室上性心动过速指异位激动在希氏束以上的心动过速。主要由折返机制造成, 少数为自律性增高引起。常见于先心病, 预激综合征, 心肌炎等基础疾病, 但多数患儿无器质性心脏疾患。感染为常见诱因。

41.

引起慢性肾功能不全的病因, 最常见的是 ()。

	SSS_MULTI_SEL
--	---------------

- A 慢性肾盂肾炎
- B 慢性肾小球肾炎
- C 肾小动脉硬化
- D 肾结石

该题您未回答: x 该问题分值: 2

答案:B

42.

对于休克病人, 应根据下列哪项来选择血管活性药物 ?()

	SSS_MULTI_SEL
--	---------------

- A 血压的高低
- B 心跳的快慢
- C 休克的类型和阶段
- D 尿量的多少

该题您未回答: x 该问题分值: 2

答案:C

43.

犬吠样咳嗽见于 ()。

	SSS_MULTI_SEL
--	---------------

- A 急性喉炎
- B 急性支气管炎
- C 支气管哮喘
- D 肺结核

该题您未回答: x 该问题分值: 2

答案:A

解析: 犬吠样咳嗽是急性喉炎咳嗽的典型临床表现。

44.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/828116111041006051>