

2023 年主治医师之消化内科主治 306 综合练习试卷

A 卷附答案

单选题（共 50 题）

1、女性，28 岁。间断上腹痛 5 年，常于进食后缓解。近 1 周来上腹痛加重，伴反酸，黑粪，夜间痛醒。查体上腹部压痛。最可能的诊断是

- A. 肠系膜上动脉综合征
- B. 消化性溃疡
- C. 胃黏膜脱垂
- D. 胃癌
- E. 胃下垂

【答案】 B

2、狼疮肾

- A. 肾基底膜厚，有钉突
- B. 肾小球内有白金耳
- C. 系膜区有 IgA 及 C
- D. 肾小球硬化
- E. 肾小管坏死上述 X 线胸片分别符合下述何种疾病的典型表现

【答案】 B

3、女性，30 岁，分娩后 20 天出现尿频、尿急、尿痛。尿检：蛋白(-)，红细胞 0-3 个/HP，白细胞(++)，中段尿细菌培养 3 次阴性，既往有泌尿系统感染史。需作何种尿培养才能检出原浆型菌株()

- A. 低渗培养
- B. 碱性培养

- C. 高渗培养
- D. 等渗培养
- E. 普通培养

【答案】 C

4、青年女性，有静脉注射麻醉药物史，高热 10 余天，偶有咳嗽，少量黄痰，院外静脉滴注青霉素、头孢等抗生素一周后体温下降到 38.1：回家口服药物，两天前再次发热，体温 39.7℃，一直持续发热，间断咳黄色浓痰，偶有痰中带血。急查血常规白细胞总数 22.4×10^9

- A. 三代头孢菌素
- B. 万古霉素
- C. 二代头孢菌素
- D. 抗霉菌药物
- E. 以上都不是

【答案】 B

5、溃疡型肠结核多见的临床表现是

- A. 便秘
- B. 里急后重
- C. 糊样便
- D. 黏液脓血便
- E. 鲜血便

【答案】 C

6、乙醇在消化道中被吸收入血，空腹饮酒则吸收更快。血中的乙醇由肝脏来解毒，其中哪两个酶起主要作用

- A. 乙醇脱氢酶，乙醛脱氢酶
- B. 乙醇脱氢酶，乙酸脱氢酶
- C. 乙醛脱氢酶，乙酸脱氢酶
- D. 乳酸脱氢酶，乙醇脱氢酶
- E. 乳酸脱氢酶，乙醛脱氢酶

【答案】 A

7、肝硬化最常见的并发症

- A. 上消化道出血
- B. 肝性脑病
- C. 肝肾综合征
- D. 肝肺综合征
- E. 腹水

【答案】 A

8、酮症酸中毒患者的呼吸节律最可能是

- A. 抑制性呼吸
- B. 库斯莫尔呼吸
- C. 陈-施呼吸
- D. 毕奥呼吸
- E. 叹气样呼吸

【答案】 B

9、男，26岁，反复上腹部隐痛2年余，进食后缓解，伴反酸，胃液分析BAO及MAO均高于正常人水平

- A. Curling 溃疡
- B. 十二指肠溃疡
- C. Cushing 溃疡
- D. 复发性溃疡
- E. 吻合口溃疡

【答案】 B

10、胰性霍乱综合征

- A. 分泌性腹泻
- B. 运动性腹泻
- C. 药源性腹泻
- D. 高渗性腹泻
- E. 吸收障碍性腹泻

【答案】 A

11、女性，30岁，发热，夜间盗汗20天就诊，体温37.5~38℃之间，查体：腹部稍膨隆，腹壁柔韧感，全腹轻压痛及反跳痛，肝脾肋下未触及，移动性浊音阳性，血白细胞 $8.1 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞0.75，淋巴细胞0.25。

- A. 钡灌肠
- B. 腹水检查
- C. 腹部B超

D. X 线钡餐检查

E. 肝功能检查

【答案】 B

12、男性，50 岁。颈粗 20 年，心悸、乏力 1 年，加重 1 个月。查体：无突眼，甲状腺 II 度肿大，不平，无触痛。可闻及血管杂音，心界不大，心率 90 次/分，可闻及期前收缩 6~8 次/分。则最可能的病因诊断是

A. Graves 病

B. 结节性甲状腺肿伴甲亢

C. 桥本病

D. 甲亢性心脏病

E. 单纯性甲状腺肿伴冠心病

【答案】 B

13、男性，50 岁。胃病史 5 年余，近 1 个月腹痛症状加剧。胃镜检查示胃角溃疡，幽门螺杆菌检查阳性。

A. 发作性剧痛

B. 腹痛发生于餐后 0.5~1 小时

C. 午夜痛为主

D. 饥饿痛为主，进食后缓解

E. 上腹痛无规律

【答案】 B

14、男性，50 岁。诊断肝硬化 2 年，1 年前行食管钡餐检查，发现食管下段虫蚀样充盈缺损。2d 前曾有黑便，继之出现嗜睡，晚间烦躁不安即来急诊。体检：双手有扑翼样震颤。

- A. 磺胺嘧啶
- B. 青霉素
- C. 甲硝唑
- D. 黄连素
- E. 氯霉素

【答案】 C

15、在我国急性胰腺炎最常见的病因是()

- A. 手术与创伤
- B. 大量饮酒
- C. 胆石症与胆道疾病
- D. 暴饮暴食
- E. 胰管阻塞

【答案】 C

16、穿孔最常发生于()

- A. 急性胃炎
- B. 慢性胃体炎
- C. 胃癌
- D. 十二指肠溃疡
- E. 胃溃疡

【答案】 D

17、肠易激综合征时的腹泻()

- A. 分泌功能亢进为主的慢性腹泻
- B. 运动功能亢进为主的慢性腹泻
- C. 混合性原因
- D. 吸收功能亢进为主的慢性腹泻
- E. 消化功能障碍为主的慢性腹泻

【答案】 B

18、下列哪种疾病的原因因为血管壁功能异常

- A. 特发性血小板减少性紫癜
- B. 血友病
- C. 过敏性紫癜
- D. 严重肝病
- E. 白血病

【答案】 C

19、肺结核

- A. 痰抗酸染色
- B. 痰菌培养
- C. 痰革兰染色
- D. 痰真菌培养
- E. 痰找阿米巴滋养体下列情况应进行何种检查

【答案】 A

20、下列哪项属变态反应性疾病

- A. 中暑
- B. 风湿热
- C. 重度安眠药中毒
- D. 脑出血
- E. 严重脱水

【答案】 B

21、慢性浅表性胃炎的临床表现哪项是错误的

- A. 易出现暖气、反酸、腹胀等症状
- B. 消化性溃疡的发生率增高
- C. 胃酸偏低
- D. 可以引起恶性贫血
- E. 有时症状酷似消化性溃疡

【答案】 D

22、对于左心衰竭患者可使患者症状缓解的措施不包括

- A. 坐位
- B. 强心剂
- C. 利尿剂
- D. 平卧位
- E. 降压

【答案】 D

23、十二指肠壶腹(球部)溃疡()

- A. 上腹疼痛多在餐后发生，呕吐多见
- B. 右上腹节律性疼痛，夜间痛和背部痛多见且突出
- C. 多为上腹正中或偏右节律性疼痛
- D. 上腹持续性剧烈疼痛，放射至背部
- E. 多为剑突下正中或偏左节律性疼痛

【答案】 C

24、女性，16岁，发热头痛1天，于1月2日入院。T39.8℃，BP110/70mmHg(14.6/9.3kPa)，神志恍惚，全身散在淤点，颈抵抗(+)，克氏征(+)，确诊此病的最重要方法()

- A. 脑脊液细菌培养
- B. 脑脊液涂片查细菌
- C. 脑脊液常规
- D. 血常规
- E. 血沉

【答案】 A

25、女性，26岁。服农药约20ml后，咳嗽，出汗多，继之先咳白色泡沫痰，后呈粉红色，抽搐，呼之不应。体检：呼吸26次/分，血压110/80mmHg，两侧瞳孔似针尖大，两肺布满啰音，心率80次/分，律整。衣服上有呕吐物，大蒜样气味。本病例应立即给予

- A. 洗胃
- B. 吸入经乙醇湿化的高浓度氧气
- C. 毛花苷丙静脉注射
- D. 静脉注射阿托品
- E. 氨茶碱静脉注射

【答案】 A

26、胃溃疡癌变时

- A. 餐后上腹疼痛，呕吐量最大，含隔夜宿食
- B. 恶心、呕吐、泛酸
- C. 腹痛失去节律性，粪便隐血试验持续阳性
- D. 面色苍白，尿少，血压下降
- E. 突然全腹剧痛，腹肌紧张

【答案】 C

27、下列不是幽门管溃疡特点的是

- A. 早期可出现呕吐
- B. 餐后很快发生疼痛，制酸剂难控制
- C. 部分患者需手术治疗
- D. 好发在 20~40 岁
- E. 易并发幽门梗阻、出血及穿孔

【答案】 B

28、女性，23 岁。查体上肢血压为 130/70mmHg，下肢血压为 120/65mmHg，首先考虑

- A. 心包积液
- B. 先天性动脉畸形
- C. 心肌病
- D. 甲状腺功能亢进

E. 心力衰竭

【答案】 B

29、男性，55岁。喉结核不规则服用异烟肼半年，2周前突发言语不清，右侧肢体肌力下降，胸片两肺弥漫性小结节影，上中部较多部分有融合，颅脑CT示脑梗死。

A. 异烟肼

B. 链霉素

C. 利福平

D. 顺铂

E. 吡嗪酰胺

【答案】 B

30、脑中氨的主要去路是

A. 合成尿素

B. 扩散入血

C. 合成氨基酸

D. 合成谷氨酰胺

E. 合成嘧啶

【答案】 D

31、以下哪项如重叠感染丁型肝炎病毒则使慢性肝炎加重

A. 乙型肝炎病毒

B. 丁型肝炎病毒

C. 戊型肝炎病毒

- D. 丙型肝炎病毒
- E. 甲型肝炎病毒

【答案】 A

32、左心衰竭患者呼吸困难的机制不包括

- A. 肺淤血
- B. 肺泡张力增高
- C. 肺泡弹性减退
- D. 右心房与上腔静脉压升高
- E. 肺循环压力升高

【答案】 D

33、女性，28岁，8月初无明显诱因下出现畏寒、发抖，继之发热，体温达39℃，伴有剧烈头痛，数小时后热退，热退后患者感体力尚可，能进食，每2天发作1次。血象：白细胞数 $6.3 \times 10^9/L$

- A. 血培养
- B. 出血热 IgM 抗体
- C. 钩体病凝溶试验
- D. 血涂片找疟原虫
- E. 乙脑 IgM 特异性抗体

【答案】 D

34、女性，30岁，因二尖瓣狭窄做了手术，术前肝功正常。HbsAg(-)，术中输血800ml，40天后肝功能ALT280U/L，AST160U/L，Tbil18 $\mu\text{mol/L}$ 。

- A. 预防注射

- B. 饮食卫生
- C. 严格血源管理
- D. 水源管理
- E. 隔离病人

【答案】 C

35、异常支气管呼吸音常见于以下疾病，除了

- A. 支气管肺炎
- B. 空洞性肺结核
- C. 大叶性肺炎实变期
- D. 压迫性肺不张
- E. 大量胸腔积液

【答案】 A

36、男性，59岁。有十二指肠溃疡病史25年，因患类风湿关节炎需要服用非甾体抗炎药，则最佳选用

- A. 阿司匹林
- B. 吲哚美辛
- C. 布洛芬
- D. 西乐葆
- E. 安乃近

【答案】 D

37、下列体征提示有少量腹水存在的是

- A. 有振水音
- B. 水坑征阳性
- C. 最大腹围在脐孔水平以下
- D. 平卧位时，腹部叩诊中部呈鼓音，侧腹为浊音
- E. 腹部向前隆起

【答案】 B

38、下列哪个不是干啰音的特点

- A. 音调较高
- B. 持续时间长
- C. 呼气时明显
- D. 干啰音强度和性质固定
- E. 干啰音瞬间数量可明显增减

【答案】 D

39、提示左心室衰竭的是

- A. 迟脉
- B. 无脉
- C. 交替脉
- D. 水冲脉
- E. 奇脉

【答案】 C

40、肝性脑病的发生机制是

- A. 蛋白质代谢紊乱，氨基酸不平衡
- B. 水、电解质平衡失调
- C. 多种因素综合作用的结果
- D. 慢性肝病导致大脑敏感性高
- E. 脂肪代谢紊乱

【答案】 C

41、消化性溃疡最常见的并发症是

- A. 穿孔
- B. 出血
- C. 癌变
- D. 幽门梗阻
- E. 息肉

【答案】 B

42、男性，60岁，健康体检中发现：乙型肝炎病毒标记阳性，ALT：120U/L，AFP：150 μg/L。B超和CT检查均未发现肝脏占位性病变

- A. 肝硬化
- B. 亚临床肝癌
- C. 原发性肝癌
- D. 慢性肝炎
- E. 急性肝炎

【答案】 D

43、男，52岁，既往肝硬化10年，近日发生肝性脑病，血钾 2.8mmol/L ，血钠 135mmol/L ，血氯 110mmol/L ，血氨 $230\mu\text{mol/L}$ ，血 $\text{pH}7.36$

- A. 给予肥皂水灌肠
- B. 口服新霉素
- C. 禁用速效类巴比妥类药物
- D. 血氨高时给予谷氨酸钠
- E. 静滴谷氨酸钾

【答案】 A

44、男性，34岁。近三天排柏油样便，每日2~3次，以往常有反酸，上腹痛，夜间重，进食可缓解，查体：贫血貌，肝脾不大，右上腹压痛，最可能的诊断是

- A. 胃炎并出血
- B. 胆石症并出血
- C. 胃癌并出血
- D. 消化性溃疡病并出血
- E. 肝硬化并胃底静脉曲张出血

【答案】 D

45、以下有关亚硝酸盐中毒处理正确的是

- A. 及时洗胃、催吐和导泻
- B. 以后不可以使用食用盐
- C. 直接服用美兰就可以
- D. 空腹1天即可
- E. 透析治疗

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/835013340024011101>