

1) 关于诊病时应有的思路流程，叙述错误的是： C

- A. 不可根据患者主诉“想当然”的下结论
- B. 查体是为病史中的疑点获取客观证据
- C. 辅助检查应该“撒大网”以免漏诊
- D. 诊断应建立在全方位考虑、鉴别和排除的基础上

2) 临床思维应具体考虑以下哪三个方面 A

- A. 病情特点、患者特点、药物特点
- B. 病情特点、医患关系、医护关系
- C. 药物价格、患者经济、病情特点
- D. 药品广告、医患关系、患者特点

3) 关于查体，叙述错误的是： D

- A. 应认真且目的明确
- B. 既全面又有重点
- C. 查体重点是在收集病史过程中发现的疑点
- D. 只有阳性的查体结果才对诊断有意义

4) 病史与查体的关系，叙述正确的是： A

- A. 相互补充，反复印证
- B. 彼此独立，互不干扰
- C. 问病史比查体的意义更重大
- D. 查体比问病史的意义更重大

5) () 是医生进行临床思维的根据 C

- A. 从书本得到的医学知识
- B. 医生的临床经验
- C. 从患者那里直接获得的第一手资料
- D. 医生的直觉

6) 临床思维方法从理论上讲包括 () D

A. 认识论的方法

B. 逻辑学方法

C. 现代学技术方法

D. 以上均是

7) 伴有消化性溃疡的高血压患者宜选用 D

A. 甲基多巴

B. 胍屈嗪

C. 胍乙啶

D. 可乐定

8) 下列情形医生需要承担法律责任的是: C

A. 有误诊, 确有过失, 但没有造成伤害或被及时纠正

B. 有误诊, 有过失, 造成损害, 但不构成因果关系

C. 有误诊, 有过失, 造成损害并构成因果关系

9) 临床思维的基点, 不包括 D

A. 具有较大的变异性

B. 具有一定的隐蔽性

C. 具有资料的相对性

D. 具有病程的一致性

E. 具有思维的概然性

10) 白癜风属于: C

A. 先天性局限性皮肤色素减退性疾病

B. 先天性泛发性皮肤色素减退性疾病

C. 获得性皮肤色素减退性疾病

D. 伴有其它皮损的皮肤色素减退性疾病

11) 疑为弥漫性支气管肺泡癌的一位患者，CT 检查中见磨玻璃影，需要做出与很多疾病进行鉴别诊断，除外：E

A. 淋巴细胞性的间质性肺炎

B. 肺泡蛋白沉积症

C. 特发性肺纤维化

D. 呼吸性细支气管炎

E. 真性红细胞增多症

12) 自然科学中难度最大的学科是：() C

A. 数

B. 化

C. 医

D. 工

13) 良好的临床思维是：A

A. 运用临床知识的精辟路径

B. 运用临床知识的直接障碍

C. 运用临床知识逾越的鸿沟

D. 运用临床知识的必然结果

14) 有关全科医疗的临床思维描述错误的是：B

A. 全科医疗是一种整合生物医学、行为科学和社会科学的医学专科

B. 全科医疗以病人的性别、年龄和器官系统进行疾病分科

C. 全科医疗以人的健康为中心，综合了生物-心理-社会科学的立体思维

15) 下面哪项描述不符合胸壁疾病引起的疼痛特点？C

A. 是躯体疼痛

B. 由脊神经传导

C. 疼痛定位不明确

D. 疼痛较尖锐

16) 一般以下哪项常作为疾病的信号: A

A. 症状

B. 体征

17) 医疗过程属于何种合同: B

A. 服务合同

B. 技术转让合同

18) 黄瘤病的定义正确的是: A

A. 是由于含有脂质的组织和巨噬细胞局限性聚集于皮肤或肌腱, 表现为黄色斑片、丘疹或结节的一组皮肤病。常伴有全身性脂质代谢紊乱。

B. 是由于含有脂质的组织和巨噬细胞局限性聚集于皮肤或肌腱, 表现为黄色斑片、丘疹或结节的一组皮肤病。一般不伴有全身性脂质代谢紊乱。

19) 以下说法错误的是: B

A. 在临床实践中, 对任何症状或体征进行判断都应从最常见的疾病入手

B. 在临床实践中, 对任何症状或体征进行判断都应首先考虑少见病和罕见病入手

C. 从常见病入手之后, 应逐一地否定、类比排除一些诊断假设, 发现那些与习惯的、常见的临床表现过程不符的特有现象, 直至作出最后诊断的过程

20) 临床思维的形式的实质是 () A

A. 认识形式

B. 临床知识

C. 感觉形式

D. 经验形式

21) 对归纳推理说法正确的是: B

A. 归纳推理是从个别到个别或从一般到一般的推理过程

B. 归纳推理是从个别到一般的推理过程

22) 以下效果评价中不属于远期效果评价的选项是: D

A. 慢性病人、带菌者是否治疗, 新发病人分布描述、与以前比较

B. 井水粪便管理及改造的情况，井水化验是否达到指标

C. 卫生知识态度行为是否达到要求

D. 流行高峰是否控制，是否还有新发病人，井水检验是否达到指标

23) 好发于眼睑内眦处、手掌躯干、颈部是以下哪项疾病的特征： B

A. 结节黄瘤

B. 扁平黄瘤

C. 发疹黄瘤

24) 收集病史的技巧，如下表述错误的是： B

A. 不单是听病人讲述

B. 按照某种表格的顺序填写

C. 要调动全部感知能力获取有意义的资料

D. 要进行及时的分析思考

25) 不同发展阶段医学有其不同的哲学根基，生物-心理-社会医学的哲学基础为： A

A. 自然哲学

B. 机械唯物论

C. 系统论或辩证的唯物论

26) 关于感冒的临床表现的叙述哪项不正确： B

A. 起病急，病程短，一般 3~5 天

B. 鼻塞、流浊涕、喷嚏

C. 流泪、味觉迟钝、轻咳、声嘶

D. 可低热、畏寒、头痛、肌肉关节酸痛

27) 只发生于女婴的皮肤色素减退性疾病是 A

A. 结节性红斑

B. 结节性血管炎

C. 结节性多动脉炎

D. 结节性梅毒疹

28) () 是临床思维形式的灵魂，是思维规律的具体运用，也是我们在思维中最积极主动的环节 A

A. 临床经验

B. 临床思维方法

C. 临床实践

D. 医学知识

29) 对于病情特点显著，发病急，双侧对称；上肢症状为主，其他部位尚未发现异常的患者，首先应推测哪个部位发病： A

A. 颈部的神经、血管或骨关节病变

B. 腹部、胸腔部病变

C. 下肢血管、神经病变

30) 下面哪项不是胸部的感觉纤维？ B

A. 肋间神经感觉纤维

B. 支配心脏和主动脉的迷走神经纤维

C. 支配气管与支气管的迷走神经纤维

D. 膈神经的感觉纤维

31) 剂量—反应关系中描述的是什么： B

A. 是指在所有人群中发生某种效应的人数所占的比例与剂量的关系

B. 是指在暴露人群中发生某种效应的人数所占的比例与剂量的关系

C. 是指在暴露人群中发生某种效应的人数所占的比例与数量的关系

32) 思维定势的正面影响不包括： C

A. 定势思维可以省去许多摸索、试探的步骤，缩短思考时间，提高解决问题的效率。

B. 思维定势可以使人在解决新问题时做好积极的心理准备

C. 思维定势可以使人们产生思想上的“保守性”

33) 下列几种医学理念不科学的是：A

- A. 症状驱动式的诊疗模式
- B. 医学整合理念
- C. 循证医学
- D. 生物心理社会环境生态医学

34) 以下关于贫血痣描述错误的是：B

- A. 出生后即有，或儿童期出现，偶见成年人发病
- B. 边缘处正常皮肤的颜色加深
- C. 可见于身体任何部位
- D. 无自觉症状，持续终生不退

35) 对炎性乳腺癌说法错误的是：C

- A. 是一种乳腺癌继发炎性病变
- B. 是癌细胞浸润到真皮下淋巴管，引发淋巴管阻塞和继发炎症。
- C. 炎性乳腺癌以侵蚀白细胞为主要表现。

36) 在临床诊断过程中，一旦感到可能出现诊断失误，较好的提示问句是：B

- A. 能不能再深入想一想？
- B. 能不能是其他疾病？
- C. 还有哪些细节没有想到？
- D. 能不能再全面复查一下？

37) 下列不属于全科医学临床思维的基本特征的是：C

- A. 以病人为中心、以问题为导向的临床思维。
- B. 按照辩证思维、逻辑思维、系统思维方式全面、综合、整体地认识问题及问题之间的相互关系。
- C. 运用流行病学和循证医学的科学思维方式评价与决策临床问题。
- D. 按照“生物-心理-社会医学模式”来思考。

38) 伴有急性心肌梗死或心力衰竭的高血压患者宜选用 C

A. 氢氯噻嗪

B. 胍乙啶

C. 硝普钠

D. 利血平

39) 属于患者社会性差异的一项是：D

A. 性别

B. 年龄

C. 基本健康情况

D. 营养状况

40) 现代医学模式指导下的“全人照顾”理念不包括：C

A. 全照顾完整的人

B. 全年的家庭照顾

C. 全面的个人护理

D. 全连续性的照顾

41) 关于以问题为导向的全科思维，下列说法不正确的是：A

A. 在基层卫生保健服务中，大部分健康问题处于早期未分化阶段。

B. 传统的诊断方法最适宜在基层医疗保健中使用。

C. 不同的症状反映不同的疾病，一个症状可以在诸多疾病中出现，一个疾病又可产生多种不同的症状。

D. 沿着在诊断中治疗、在治疗中诊断这条主线，扩大对症状的临床思考是正确做出诊断和处理的首要前提。

42) 肝硬化的并发症是：E

A. 肝性脑病

B. 肝肺综合征

C. 肝肾综合征

D. 肝细胞肝癌

E. 以上均是

43) 临床思维的要点中，药物的选择依据，一般不包括： D

A. 根据患者的症状

B. 根据病人的生理特性

C. 根据疾病的伴发症

D. 根据药品的价格

44) 关于高新设备在临床诊断中的作用，下列说法错误的是： C

A. 可以验证医生思维的正确性

B. 可以得出明确的图象和数据

C. 有利于培养医生独立思考的能力

D. 可能使医生对设备产生依赖思想

45) 对急性乳腺炎说法错误的是： C

A. 由金黄葡萄球菌或链球菌沿淋巴管入侵所致的乳房感染性炎症。

B. 常在短期内形成脓肿，多于初产后 2~4 周发生。

C. 以侵犯淋巴管道为主要表现

46) 临床思维的基本形式包括 () D

A. 临床概念、临床判断、临床推理

B. 临床假说、临床经验、临床直觉

C. 临床想象、临床灵感、临床机遇

D. 以上均是

47) 要想当个好医生，() 是第一位的。 A

A. 掌握理论知识

B. 悟性

C. 大量的实践

D. 聪明的头脑

48) 关于疾病的心理精神因素，如下表述错误的是：C

A. 精神/心理疾病比以往增多

B. 很多器质性疾病可产生精神心理表现

C. 诊病时首先要考虑精神心理疾病

D. 诊断中要充分认识到精神心理因素

49) 下面对肝硬化患者上消化道钡餐摄片描述错误的是：D

A. 可发现食管及胃底静脉曲张征象

B. 食管静脉曲张呈现出蚀状或蚯蚓状充盈缺损

C. 胃底静脉曲张呈菊花样缺损

D. 诊断的敏感性高于胃镜检查

50) 下列哪类昏迷患者不出现呼吸频率减慢？A

A. 肺水肿

B. 吗啡中毒

C. 颅内压增高

D. 脑出血性病变

51) 上世纪 80 年代初，裘法祖教授将医生分为上医、中医、和下医。其中，上医：B

A. 同时看片和报告

B. 先看病人，再看片子，最后再看检验报告

C. 只看报告，提笔开药

52) 无色素性色素失禁症区别于白化病的特征表现是 D

A. 为常染色体显性遗传

B. 无自觉症状

C. 白斑奇形怪状

D. 不伴眼脉络膜色素消失

53) 哌唑嗪作用机理正确的是:D

- A. 选择性地阻断突触后膜 $\alpha 1$ 受体
- B. 显著降低血清三酰甘油和低密度脂蛋白
- C. 升高高密度脂蛋白
- D. 以上都是

54) 《新医学》杂志 1983 年第 6 期 1992 年 12 期, 共发表 776 例误诊病例原因分析, 其中所占比例最大的原因是: A

- A. 病史采取不当
- B. 思维方法不当
- C. 工作责任心不强
- D. 业务知识不足

55) 以下说法错误的是: C

- A. 演绎推理是一种严格的逻辑推理。它是从一般性的前提出发, 通过推导即“演绎”, 得出具体陈述或个别结论的推理思维
- B. 也就是从个别到一般的推理
- C. 在演绎推理中, 只要前提和推理形式是正确的, 结论必定是正确的。

56) 下面哪项不属于肝硬化患者进行肝移植的禁忌证: C

- A. 不能控制的全身感染如 HIV 阳性
- B. 吸毒
- C. 已发生过 SBP 或肝性脑病者
- D. 酗酒
- E. 不能依赖术后免疫抑制剂者

57) 关于临床工作的特点, 叙述错误的是: C

- A. 疾病发展是一个过程, 诊断是在一个短暂的时点进行
- B. 病情的发展难以预料
- C. 病情与教科书描述总是完全相符

D. 疾病的临床表现具有多样性

58) 如果一个病例多项辅助检查的结果不一致,甚至互相矛盾,临床医生应该以 () 为基础,对所存在的疑点进行合理的分析,争取做出较为切合实际的诊断 B

A. 化验结果

B. 患者临床表现

C. B 超检查结果

D. CT 检查结果

59) 制订临床治疗方案需要做到的内容不包括: B

A. 合乎疾病发生发展的病理

B. 不考虑卫生经济学

C. 合乎人群的情理、法理

D. 合乎药物的药理

60) 下列关于全科医生的工作特点错误的是: B

A. 全科医生服务的人群相对是固定的,必须进行长期、连续的负责式照顾,提供全人医疗照顾。

B. 全科医生的工作地点在社区卫生服务机构,提供的是住院医疗服务。

C. 全科医生面对的疾病谱非常广泛。

D. 双向转诊工作。

61) 按照临床思维原则,在诊断过程中,首先必须明确(诊断)的是 A

A. 有无疾病?

B. 什么部位的疾病?

C. 哪个学科的疾病?

D. 是急性病还是慢性病?

E. 是全身性疾病还是局部性疾病?

62) 急性呼吸困难不用考虑的疾病是: D

A. 肺栓塞

B. 急性心力衰竭

C. 自发性气胸

D. COPD

63) 临床思维的基础不包括: D

A. 病情

B. 病人

C. 药物

D. 医生

64) 下面对主动脉夹层临床体征描述错误的是? A

A. 脉搏增强, 双上肢血压相差 20mmHg 以上

B. 胸片示纵隔增宽, 主动脉轮廓消失或胸膜渗出

C. 心脏 B 超示主动脉根部内腔直径大于 40mm

D. 主动脉造影可发现夹层动脉瘤

65) 靶向治疗分三个层次: 器官靶向、细胞靶向和分子靶向。其相对于传统手术的优势不包括: D

A. 更具有“治本”的功效

B. 具有选择性杀伤肿瘤细胞的特点, 减少对正常组织的损伤

C. 副作用较少, 更能针对性的治疗肿瘤

D. 疗效稳定, 有效率高

66) 某县 1970 年代, 肠道传染病流行, 伤寒痢疾发病率很高, 在流行时期应采取的主要措施是: A

A. 井水消毒、粪便管理、病人治疗

B. 改水、改厕

C. 病人及带菌者治疗、健康教育

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/836030142115010044>