

公共卫生与预防医学考试题库

第一部分 单选题(300题)

1、小儿流感嗜血杆菌感染首选的药物是:【单选题】——

- A. 青霉素
- B. 磺胺嘧啶
- C. 氨苄青霉素
- D. 头孢唑啉 林可霉素

【答案】: C

2、B-D 试验只适用于【单选题】——

- A. 下排气压力蒸汽灭菌器检测
- B. 预真空压力蒸汽灭菌器监测
- C. 流动蒸汽灭菌器的监测
- D. 环氧乙烷灭菌器的监测 化学消毒液浸泡消毒时

【答案】: B

3、某医院收入一痢疾患者,该患者在入院时又感染了白喉杆菌,入院后发生白喉,这属于【单选题】——

- A. 交叉感染
- B. 医源性感染
- C. 自身感染
- D. 带入感染 以上都不是

【答案】: D

4、层流洁净室【单选题】——

- A. 空气 $\leq 10\text{cfu}/\text{m}^3$,物体表面 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^3$,医护人员手 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$
- B. 空气 $\leq 200\text{cfu}/\text{m}^3$,物体表面 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^3$,医护人员手 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$
- C. 空气 $\leq 500\text{cfu}/\text{m}^3$,物体表面 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^3$,医护人员手 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$
- D. -,物体表面 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^3$,医护人员手 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$

空气 $\leq 1000\text{cfu}/\text{m}^3$, 物体表面 $\leq 8\text{cfu}/\text{cm}^3$, 医护人员手 $\leq 8\text{cfu}/\text{cm}^2$?下列各医疗区的细菌学指标是

【答案】：A

5、手术中切开空腔脏器前用纱垫保护的目的是【单选题】——

- A. 防止内脏器官暴露过久
- B. 防止细菌污染
- C. 防止出血
- D. 防止损伤 防止术后腹胀

【答案】：B

6、小儿流感嗜血杆菌感染首选的药物是【单选题】——

- A. 青霉素
- B. 氨苄西林
- C. 磺胺嘧啶
- D. 头孢唑啉 林可霉素

【答案】：B

7、传染病区使用的拖把【单选题】——

- A. 每次使用后清水冲洗, 悬挂晾干备用
- B. 先用 1000mg/L 有效氯消毒剂适量倒在污染地面 30min 后, 用拖把拖干净
- C. 应先消毒, 用 500mg/L 有效氯消毒液浸泡 30min, 再用水洗干净, 然后用 500mg/L 有效氯消毒液浸泡 30min, 悬挂晾干备用
- D. 拖把应有明显的标记, 严格分区使用 拖把用 500mg/L 有效氯消毒液浸泡 30min 后, 再洗干净, 晾干备用

【答案】：C

8、取无菌纱布的正确方法是【单选题】——

- A. 戴手套拿取纱布
- B. 以上都不是
- C.

用灭菌换药镊子夹取纱布

- D. 用无菌持物钳夹取纱布 用消毒的手指拿取纱布

【答案】：D

9、判断某传染病患者是否为医院感染引起的主要依据是【单选题】——

- A. 临床症状期
B. 检查结果
C. 病程
D. 潜伏期 传染期

【答案】：D

10、对怀疑医院内感染的病例取标本进行病原体检查,错误的是【单选题】——

- A. 在使用抗菌药物前送标本
B. 为节约经费,应该在抗感染治疗效果不佳时取标本做病原体检查
C. 采集标本后及时送检
D. 采集标本时防止污染 接到临床标本后及时正确接种

【答案】：B

11、下述不符合环境卫生学标准的是【单选题】——

- A. 层流洁净手术室物体表面细菌数 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$
B. 普通手术室空气细菌数 $\leq 500\text{cfu}/\text{m}^3$
C. 治疗室医务人员手细菌数 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$
D. 传染病房物体表面细菌数 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$ 婴儿室空气细菌数 $\leq 200\text{cfu}/\text{m}^3$

【答案】：B

12、医院感染控制措施中手术部位感染已证实有效的措施不对的是【单选题】——

- A. 清洁的手术环境
B. 工作人员装束和手术室的无菌操作

- C. 术前沐浴和患者局部皮肤准备
- D. 合理的预防性抗生素的应用和外科伤口监测

熏蒸消毒,术前剃毛

【答案】：E

13、SARS 最主要的传染源是【单选题】——

- A. SARS 患者
- B. SARS 病毒携带者
- C. SARS 感染的动物
- D. 携带 SARS 的动物 污染的环境

【答案】：A

14、给传染病患者发药,下述哪一项是错误的【单选题】——

- A. 协助同一病种的患者服药后,再给另一病种患者喂药
- B. 用过的药杯放在消毒液内浸泡
- C. 全病区发药完毕,按常规消毒药杯
- D. 车下层放盆,内盛消毒液 将备好的药及水壶放在治疗车上

【答案】：A

15、手术台上器械护士需要增加无菌纱布,巡回护士取用的正确方法是

【单选题】——

- A. 用消毒的手指拿取纱布
- B. 其他都不对
- C. 用灭菌换药镊子夹取纱布
- D. 戴手套拿取纱布 用无菌持物钳夹取纱布

【答案】：E

16、病室内住有百日咳病人,已知病室长 6m、宽 3.2m、高 3m,用纯乳酸进行空气消毒,乳酸的用量是【单选题】——

- A. 7ml
- B. 6ml
- C. 12ml
- D. 15ml 5ml

【答案】：A

17、丙型病毒性肝炎宜采取【单选题】——

- A. 消化道隔离
- B. 呼吸道隔离
- C. 两者均是
- D. 两者均不是

【答案】：D

18、儿科病房【单选题】——

- A. $\leq 10 \leq 5 \leq 5$
- B. $\leq 200 \leq 5 \leq 5$
- C. $\leq 500 \leq 10 \leq 10$
- D. $= - \leq 15 \leq 15$

【答案】：C

19、医疗区域属于半污染区的是【单选题】——

- A. 患者洗涤间
- B. 病区化验室
- C. 病室及厕所
- D. 治疗室 病区营养配餐室

【答案】：B

20、对怀疑医院内感染的病例取标本进行病原体检查,下述描述中错误的是【单选题】——

- A. 在使用抗菌药物前送标本
- B. 为节约经费,应该在抗感染治疗效果不佳时取标本做病原体检查
- C. 采集标本后及时送检
- D. 采集标本时防止污染 接到临床标本后及时正确接种

【答案】：B

21、医院内感染主要发生在【单选题】——

- A. 门诊、急诊病人
- B. 探视者
- C.

医务人员

D. 住院病人 陪护人员

【答案】：D

22、对传染性非典型肺炎无效的公众预防措施是【单选题】——

A. 讲究个人卫生

B. 不接触传染性非典型患者或临床诊断患者

C. 在通风不好或人群密集的场所戴口罩

D. 勤洗手 注射丙种球蛋白

【答案】：E

23、下列情况不是医院感染【单选题】——

A. 病人发生的感染是上次住院期间获得的

B. 有明确潜伏期的感染,自入院时计算起。超过其常见潜伏期而发生的感染

C. 在原有医院感染的基础上又出现其他部位新的感染(除外脓毒症的迁徙病灶)

D. 没有明确潜伏期的感染,发生在入院48小时以后者 新生儿经胎盘获得的感染

【答案】：E

24、三级医院【单选题】——

A. 医院感染发生率 $\leq 8\%$

B. 切口感染率 $\leq 0.5\%$

C. 两者均是

D. 两者均不是

【答案】：B

25、巴氏消毒常用消毒指标是【单选题】——

A. 消毒温度为 $65\sim 75^{\circ}\text{C}$,作用时间 $10\sim 15\text{min}$

B. 消毒温度为 $70\sim 80^{\circ}\text{C}$,作用时间 $5\sim 8\text{min}$

C. 消毒温度为 $45\sim 55^{\circ}\text{C}$,作用时间 $20\sim 25\text{min}$

D. 消毒温度为 $85\sim 95^{\circ}\text{C}$,作用时间 $10\sim 15\text{min}$

消毒温度为 62°C,作用时间 30min

【答案】：E

26、有关隔离的概念,下列哪项是错误的【单选题】——

- A. 咽白喉应严格隔离,皮肤白喉需接触隔离
- B. 流行性腮腺炎进行呼吸道隔离,脊髓灰质炎进行肠道隔离
- C. 大面积烧伤进行接触隔离
- D. 多重耐药株感染应列入接触隔离 活动性肺结核的隔离期是有效治疗后 6 周

【答案】：E

27、ICU【单选题】——

- A. 空气 $\leq 10\text{cfu}/\text{m}^3$,物体表面 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^3$,医护人员手 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$
- B. 空气 $\leq 200\text{cfu}/\text{m}^3$,物体表面 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^3$,医护人员手 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$
- C. 空气 $\leq 500\text{cfu}/\text{m}^3$,物体表面 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^3$,医护人员手 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$
- D. -,物体表面 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^3$,医护人员手 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$ 空气 $\leq 1000\text{cfu}/\text{m}^3$,物体表面 $\leq 8\text{cfu}/\text{cm}^3$,医护人员手 $\leq 8\text{cfu}/\text{cm}^2$?下列各医疗区的细菌学指标是

【答案】：B

28、为预防医院感染的发生,新生儿病房床位之间的间距不少于【单选题】——

- A. 100cm
- B. 90cm
- C. 80cm
- D. 70cm 60cm

【答案】：B

29、一般病室.办公室.治疗室.换药室.走廊等使用的拖把【单选题】——

- A.

先用 1000mg/L 有效氯消毒剂适量倒在污染地面 30min 后,用拖把拖干净

- B. 拖把用 500mg/L 有效氯消毒液浸泡 30min 后,再洗干净,晾干备用
- C. 拖把应有明显的标记,严格分区使用
- D. 每次使用后清水冲洗,悬挂晾干备用 应先消毒,用 500mg/L 有效氯消毒液浸泡 30min,再用水洗干净,然后用 500mg/L 有效氯消毒液浸泡 30min,悬挂晾干备用

【答案】： D

30、根据我国卫生标准回答以下问题:接触皮肤的医疗用品【单选题】

——

- A. 必须无菌
- B. 细菌菌落总数应 $\leq 20\text{cfu/g}$ 或 $\leq 20\text{cfu}/100\text{cm}^2$,致病性微生物不得检出
- C. 细菌菌落总数应 $\leq 200\text{cfu/g}$ 或 $\leq 200\text{cfu}/100\text{cm}^2$,致病性微生物不得检出
- D. 细菌菌落总数应 $\leq 100\text{cfu/mL}$,致病性微生物不得检出 细菌菌落总数应 $\leq 300\text{cfu/mL}$,致病性微生物不得检出

【答案】： C

31、穿脱隔离衣时要避免污染【单选题】 ——

- A. 袖子后面
- B. 胸前、背后
- C. 腰带以下部分
- D. 衣领 腰带以上部分

【答案】： D

32、低效消毒剂【单选题】 ——

- A. 0.5%碘伏
- B. 2%戊二醛
- C. 两者均是

D. 两者均否

【答案】：D

33、对特殊感染而无保留价值的物品,最彻底的灭菌方法是【单选题】——

- A. 煮沸消毒灭菌法
- B. 过氧乙酸浸泡法
- C. 燃烧灭菌法
- D. 高压蒸汽灭菌法 日光曝晒法

【答案】： C

34、目前胃镜消毒首选的消毒剂是【单选题】——

- A. 乙醇
- B. 84 消毒液
- C. 2%戊二醛
- D. 洗必泰 新洁尔灭

【答案】： C

35、紫外线消毒的有效距离是【单选题】——

- A. 10m
- B. 2m
- C. 1m
- D. 5m 15m

【答案】： B

36、目前国内医院感染最常发生的部位是【单选题】——

- A. 泌尿道
- B. 外科切口
- C. 血液
- D. 下呼吸道 胃肠道

【答案】： D

37、美国一护士在护理埃博拉感染患者时,也被诊断为埃博拉出血热,其属【单选题】——

- A. 外来病毒感染
- B.

非接触性感染

- C. 自患传染性疾病
- D. 医院感染 因空气造成的感染

【答案】：D

38、肠道隔离的要求哪项不对【单选题】——

- A. 患者尽可能住隔离室,相同疾病可居一室
- B. 接触感染物时戴手套,若容易污染衣服时穿隔离衣,不需戴口罩
- C. 接触患者及污染物后,护理另一患者前要洗手
- D. 被粪便污染的物品要先清洗再送消毒处理 探视者进入隔离室前应通知值班护士

【答案】：D

39、传染病房每间病室的病人数不应超过【单选题】——

- A. 6人
- B. 5人
- C. 4人
- D. 3人 2人

【答案】：C

40、外科刷手法刷手顺序【单选题】——

- A. 手掌,指尖,甲缘,指间,腕部,前臂,肘部刷手至肘上
- B. 甲缘,指尖,指间,手掌,腕部,前臂,肘部,刷手至肘上
- C. 指间,指尖,甲缘,手掌,腕部,前臂,肘部刷手至肘上
- D. 指尖,甲缘,指间,手掌,腕部,前臂,肘部,刷手至肘上 腕部,前臂,肘部,肘上,指间,指尖,甲缘,刷手至肘上

【答案】：D

41、关于医院感染的概念错误的是:【单选题】——

- A. 入院时处于潜伏期的感染不是医院感染
- B. 医院感染是指在医院内获得的感染
- C. 慢性感染急性发作是医院感染
- D. 与上次住院有关的感染是医院感染

婴幼儿经胎盘获得的感染不是医院感染

【答案】：C

42、传染病区中划分为清洁区的是【单选题】——

- A. 走廊
- B. 洗漱室
- C. 配餐室
- D. 化验室 浴室

【答案】：C

43、引起医院感染的病原微生物主要是【单选题】——

- A. 条件致病菌
- B. 细菌
- C. 弓形体
- D. 衣原体 真菌

【答案】：A

44、对患者或怀疑患者传染病的产妇用过的一次性用品及胎盘必须【单选题】——

- A. 放入黄色塑料袋内,密闭运送,无害化处理
- B. 放入红色塑料袋内,密封后丢弃
- C. 放入黑色塑料袋内,按垃圾处理
- D. 放入黑色塑料袋内,密闭运送,无害化处理 放入白色塑料袋内,标记处理

【答案】：A

45、手术部位感染的常见诱因是【单选题】——

- A. 留置导尿管
- B. 气管切开
- C. 两者均是
- D. 两者均否

【答案】：D

46、新生儿重症监护室对每张床位占地面积的要求是不少于一般新生儿床位的【单选题】——

- A. 1 倍
- B. 2 倍
- C. 3 倍
- D. 4 倍 5 倍

【答案】： B

47、消毒的含义是【单选题】——

- A. 杀灭物品上的所有微生物
- B. 杀灭物品上的芽孢
- C. 消灭包括细菌芽孢在内的各种病原微生物
- D. 消除物品上的一切污秽 消灭除细菌芽孢外的各种病原微生物

【答案】： E

48、某霍乱患者在行严密隔离时,其具体措施不包括【单选题】——

- A. 只能在休息日探视
- B. 病人住单人病室,门窗关闭,病人不外出
- C. 接触病人需戴口罩、帽子,穿隔离衣、裤、鞋
- D. 病室每天消毒 1 次 病人的一切用物应严格消毒处理

【答案】： A

49、外科刷手时间每次【单选题】——

- A. 3 分钟以上
- B. 1 分钟以上
- C. 2 分钟以上
- D. 5 分钟以上 4 分钟以上

【答案】： A

50、输血科的医院感染管理描述正确的是【单选题】——

- A. 血液检验和处置室设在清洁区
- B.

采集患者自体血应在 I 类环境中进行

C. 储存、发放血液应分室在 I 类环境中进行

D. 血浆置换术应在 II 类环境中进行 布局合理,分为有清洁区、污染区

【答案】: D

51、关于医院内感染知识培训,错误的叙述是【单选题】——

A. 培训内容包括管理知识和专业知识

B. 培训对象包括管理、医务、工勤人员

C. 非专职人员每年不少于 2 小时培训

D. 进修医师必须培训 实习医师必须培训

【答案】: C

52、对洗衣房的医院感染管理,下列哪项错误【单选题】——

A. 布局上要求洁、污分区,路线由污到洁,不能逆行

B. 运送车辆应洁、污分开,浸有血液、体液的布类应置于防水袋内封闭运送

C. 洗衣房应有定期清洁消毒制度

D. 各类衣服应分类清洗,感染病人与普通病人的衣物应分开清洗
对血污布类应区分其感染性,必要时按感染性布类处理

【答案】: E

53、和破损皮肤、黏膜相接触,而不进入无菌的组织内的器材适用于下列哪种方式消毒【单选题】——

A. 灭菌剂或物理、化学灭菌方法

B. 杀灭细菌繁殖体的消毒剂

C. 应用灭菌剂或高效消毒剂

D. 杀灭结核杆菌的消毒剂或中、低效消毒剂 应用物理灭菌方法

【答案】: C

54、 I 类. II 类区域工作人员卫生手及物体表面的合格标准为【单选题】——
A.

细菌总数 $\leq 25\text{cfu}/\text{cm}^2$, 未检出致病菌

B. 细菌总数 $\leq 20\text{cfu}/\text{cm}^2$, 未检出致病菌

C. 细菌总数 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$, 未检出致病菌

D. 细菌总数 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$, 未检出致病菌 细菌总数
 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$, 未检出致病菌

【答案】：D

55、取无菌溶液时, 下列哪项是错误的【单选题】——

A. 倒溶液时可不顾及瓶签的朝向

B. 用前核对瓶签

C. 保持瓶盖内侧面无菌

D. 用后立即盖上 检查药液是否有沉淀

【答案】：A

56、医院感染管理中, 应重点管控的传染来源是【单选题】——

A. 动物

B. 血液制品

C. 各种病人

D. 食品 病原携带者

【答案】：C

57、根据我国下列卫生标准回答: 监督、指导医务人员严格执行无菌技术操作规程, 合理应用抗感染药, 实施对一次性医疗用品的管理等有关医院内感染管理的制度的是【单选题】——

A. 国家医院感染管理咨询专家委员会

B. 省医院感染管理专家咨询委员会

C. 各级医院的医院感染管理委员会

D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：E

58、高效消毒剂是【单选题】——

A. 醋酸氯己定

B. 新洁尔灭

C.

两者均是

D. 两者均否

【答案】：D

59、关于血液净化室的医院内感染管理,下列哪项不正确【单选题】——

A. 应对病人常规进行血液净化前肝功能、肝炎病原体等检查

B. 工作人员定期体格检查,加强个人防护

C. 透析器、管路应一次性使用

D. 传染病病人在隔离净化室进行血液净化,专机透析 急诊病人不需固定透析机

【答案】：E

60、下列消毒剂中哪一种不能达到灭菌水平【单选题】——

A. 甲醛

B. 戊二醛

C. 含氯消毒剂

D. 环氧乙烷 过氧化氢

【答案】：C

61、关于医院感染的概念错误的是【单选题】——

A. 医院感染是指在医院内获得的感染

B. 与上次住院有关的感染是医院感染

C. 入院时处于潜伏期的感染一定不是医院感染

D. 出院之后发生的感染可能不是医院感染 婴幼儿经胎盘获得的感染是医院感染

【答案】：E

62、护理人员为术前清洁洗肠准备所需肛管,采取煮沸消毒法,以下哪项不正确【单选题】——

A. 肛管腔内注水,用纱布包好

B. 在沸水中持续煮沸 10min 以上

C.

冷水时即放入计时

D. 水沸后开始计时 先将肛管洗刷干净

【答案】：C

63、无菌盘铺好后有效时间不超过【单选题】——

A. 4h

B. 6h

C. 8h

D. 5h 7h

【答案】：A

64、预真空蒸汽灭菌器手术器械包的体积不得超过多少【单选题】——

A. 30cm×30cm×30cm

B. 30cm×30cm×50cm

C. 30cm×30cm×45cm

D. 30cm×30cm×25cm 35cm×35cm×50cm

【答案】：B

65、标准预防针对体内物质的隔离预防不包括【单选题】——

A. 血液

B. 体液

C. 汗液

D. 排泄物 分泌物

【答案】：C

66、细菌耐药最常见的机制是【单选题】——

A. 细菌改变代谢途径

B. 产生抗生素灭活酶

C. 抗菌药物作用靶位改变

D. 细菌细胞膜渗透性改变使抗菌药物不易进入细菌细胞
细菌细胞将抗菌药物排除细菌

【答案】：B

67、下列内镜需灭菌,但除外【单选题】——

- A. 纤维支气管镜
- B. 腹腔镜
- C. 脑室镜
- D. 关节镜 胸腔镜

【答案】：A

68、肾移植患者应采取哪种隔离措施【单选题】——

- A. 严密隔离
- B. 接触隔离
- C. 呼吸道隔离
- D. 消化道隔离 保护性隔离

【答案】：E

69、有关医院内感染预防与控制的概念,错误的是【单选题】——

- A. 部分医院内感染是可以预防的
- B. 洗手是预防医院内感染的重要措施
- C. 医院内感染一定是由于消毒隔离缺陷所致
- D. 内源性医院内感染是医院内感染的重要原因 滥用抗菌药物可致二重感染

【答案】：C

70、根据我国卫生标准回答以下问题:使用中的消毒剂【单选题】——

- A. 必须无菌
- B. 细菌菌落总数应 $\leq 20\text{cfu/g}$ 或 $\leq 20\text{cfu}/100\text{cm}^2$,致病性微生物不得检出
- C. 细菌菌落总数应 $\leq 200\text{cfu/g}$ 或 $\leq 200\text{cfu}/100\text{cm}^2$,致病性微生物不得检出
- D. 细菌菌落总数应 $\leq 100\text{cfu/mL}$,致病性微生物不得检出 细菌菌落总数应 $\leq 300\text{cfu/mL}$,致病性微生物不得检出

【答案】：D

71、无菌盘铺好后有效期不超过【单选题】——

- A. 8h
- B. 2h
- C. 16h
- D. 12h 4h

【答案】：E

72、医疗废物【单选题】——

- A. 使用过的注射针头
- B. 带血的敷料
- C. 两者均是
- D. 两者均否

【答案】：C

73、轮状病毒感染宜采取【单选题】——

- A. 消化道隔离
- B. 呼吸道隔离
- C. 两者均是
- D. 两者均不是

【答案】：A

74、乙型脑炎主要传播媒介是【单选题】——

- A. 蚊
- B. 虱
- C. 螨
- D. 鼠 蚤

【答案】：A

75、为预防医院感染的发生新生儿病房每张床位占地面积不应少于【单选题】——

- A. 5m²
- B. 4m²
- C.

3m2

D. 2m2 1m2

【答案】：C

76、当被沾有 HBsAg 阳性血的针头刺伤时,立即应作的主要处理是【单选题】——

- A. 乙型肝炎高价免疫血清注射
- B. 给受伤者立即注射丙种球蛋白
- C. 乙型肝炎疫苗注射
- D. 伤口立即涂以碘酒 受伤者立即抽血作乙型肝炎全套抗原抗体检测

【答案】：A

77、医院感染的含义是【单选题】——

- A. 所有发生在医院内的细菌感染
- B. 因医疗器械消毒不严造成的感染
- C. 病人在住院期间发生的感染
- D. 病人在住院期间或医院职工在护理或治疗患者过程中发生的感染 医院内病人直接或间接传播引起的感染

【答案】：D

78、患者女性,45岁。III度烧伤后行植皮术,大腿内侧供皮区消毒不可使用【单选题】——

- A. 3%碘酊
- B. 1:1000 苯扎溴铵酊
- C. 0.5%PVP 碘
- D. 1:1000 氯己定酊 70%乙醇

【答案】：A

79、生活垃圾为【单选题】——

- A. 使用过的注射针头
- B. 带血的敷料
- C.

两者均是

D. 两者均否

【答案】：D

80、关于压力蒸汽灭菌效果监测要求正确的是【单选题】——

A. 工艺监测每天进行

B. 化学监测每包进行

C. 生物监测每周进行

D. B-D 试验每天灭菌后进行 B-D 试验每锅进行

【答案】：B

81、二级医院【单选题】——

A. 医院感染发生率 $\leq 8\%$

B. 切口感染率 $\leq 0.5\%$

C. 两者均是

D. 两者均不是

【答案】：C

82、有关内镜消毒下列哪项是错误的【单选题】——

A. 腹腔镜用环氧乙烷消毒

B. 消化内镜用 500×10^{-6} 有效氯的含氯消毒剂消毒

C. 直肠镜采用高压灭菌

D. 内镜活检钳使用过频时,采用 2%戊二醛消毒 45 分钟 磷

苯二甲醛消毒内镜 5 分钟可灭菌

【答案】：B

83、医院感染最常发生的疾病是【单选题】——

A. 肠道传染病

B. 泌尿道感染

C. 外伤感染

D. 表皮传染病 呼吸道传染病

【答案】：E

84、下列消毒剂中属高水平消毒剂的有【单选题】——

- A. 戊二醛
- B. 络合碘
- C. 苯扎溴铵
- D. 乙醇 碘酊

【答案】：A

85、传染病区所采取的隔离措施,下列不正确【单选题】——

- A. 同住一室的不同的呼吸道传染病患者只要做好床边隔离
- B. 给同一种病种患者测血压时可不换血压计
- C. 斑疹伤寒患者须更衣后才可入病房
- D. 护理消化道隔离病人时,须按病种分别穿隔离衣 严密隔离患者禁止走出病房

【答案】：A

86、根据我国卫生标准回答以下问题:进入组织、器官或接触破损皮肤、黏膜的医疗用品【单选题】——

- A. 必须无菌
- B. 细菌菌落总数应 $\leq 20\text{cfu/g}$ 或 $\leq 20\text{cfu}/100\text{cm}^2$,致病性微生物不得检出
- C. 细菌菌落总数应 $\leq 200\text{cfu/g}$ 或 $\leq 200\text{cfu}/100\text{cm}^2$,致病性微生物不得检出
- D. 细菌菌落总数应 $\leq 100\text{cfu/mL}$,致病性微生物不得检出 细菌菌落总数应 $\leq 300\text{cfu/mL}$,致病性微生物不得检出

【答案】：A

87、医院感染控制措施中泌尿道感染已证实有效的措施是【单选题】——

- A. 全身预防性抗生素的使用
- B. 膀胱冲洗或灭菌生理盐水或抗生素冲洗
- C. 限制插管时间,插入时的无菌技术,保持密闭引流
- D. 引流袋内加入抗菌剂,抗微生物药物包裹的导尿管

每天灭菌剂清洁会阴

【答案】：C

88、下列细菌是目前医院内感染常见的细菌,但除外【单选题】——

- A. 葡萄球菌特别是金黄色葡萄球菌和凝固酶阴性葡萄球菌
- B. 大肠埃希菌
- C. 沙门菌属
- D. 铜绿假单胞菌 肺炎杆菌

【答案】：C

89、取无菌溶液时,先倒去少量溶液的的目的是【单选题】——

- A. 冲洗瓶口
- B. 练习操作,以便从原处倒出
- C. 减少瓶内溶液
- D. 检查液体是否清亮 检查瓶口是否有裂缝

【答案】：A

90、有关医院感染预防与控制的概念,错误的是:【单选题】——

- A. 外源性感染是可以预防的
- B. 洗手是预防医院感染的重要措施
- C. 做好消毒隔离就可杜绝医院感染的发生
- D. 内源性医院感染是难以预防的 滥用抗菌药物可致二重感染

【答案】：C

91、潜伏病毒的激活感染是【单选题】——

- A. 麻疹恢复期
- B. 隐性乙型脑炎病毒感染
- C. 乙型肝炎病毒携带者
- D. 单纯疱疹反复发作 慢性活动性肝炎

【答案】：D

92、下列哪种情况属于医院感染【单选题】——

- A. 烧伤创面培养出金黄色葡萄球菌
- B. 经产道感染的乙型肝炎
- C. 红霉素静脉滴注后发生静脉炎;拔出的导管在血平皿上滚动培养,细菌菌落数8个
- D. 羊肠线吸收不佳的炎症反应 入院后5天发生的甲型肝炎

【答案】: B

93、对高压蒸汽灭菌效果的监测,最可靠的方法是【单选题】——

- A. 化学指示卡法
- B. 生物测试法
- C. 化学指示管法
- D. 化学指示胶带法 留点温度计法

【答案】: B

94、无菌治疗巾打开后,未用完其继续使用的有效时间是【单选题】——

- A. 4h
- B. 12h
- C. 6h
- D. 2h 24h

【答案】: E

95、紫外线辐射强度为多少时更换紫外线灯管【单选题】——

- A. $\approx 70 \mu W/cm^2$
- B. $= 70 \mu W/cm^2$
- C. $< 70 \mu W/cm^2$
- D. $\geq 70 \mu W/cm^2$

【答案】: C

96、下列情况属于医院感染的是【单选题】——

- A.

在皮肤、粘膜开放性伤口只有细菌定植而无临床症状或体征者

- B. 由损伤而产生的炎症或由非生物因子刺激产生的炎性反应
- C. 婴儿经胎盘获得的感染,如 CMV,弓形虫发生在出生后 48 小时以内者
- D. 住院中由于治疗措施而激活的感染 由于输注碳酸氢钠溶液(苏打)外渗引起的局部炎性反应

【答案】： D

97、隔离衣一般情况下更换时间是【单选题】——

- A. 72h
- B. 24h
- C. 6h
- D. 12h 48h

【答案】： B

98、对芽孢无效的化学消毒剂是【单选题】——

- A. 0.5%过氧乙酸溶液
- B. 环氧乙烷
- C. 40%甲醛溶液
- D. 2%戊二醛溶液 70%乙醇溶液

【答案】： E

99、进行医院感染管理的策略研究,为卫生部提供咨询意见【单选题】——

- A. 卫生部医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】： A

100、避污纸的正确使用方法为【单选题】——

- A. 污染的手取避污纸可掀页撕取

B. 从页面抓取

C.

随便撕取

D. 掀开页面抓取第一页 清洁手取避污纸需他人传递

【答案】：B

101、我国医院内感染最常发生的部位是【单选题】——

A. 泌尿道

B. 外科切口

C. 血液

D. 呼吸道 胃肠道

【答案】：D

102、对门诊胃镜室使用过的纤维胃镜进行消毒,应该选择的消毒溶液是【单选题】——

A. 1%氯胺溶液

B. 5%碘伏

C. 0.1%苯扎溴铵溶液

D. 2%碱性戊二醛溶液 0.2%过氧乙酸溶液

【答案】：D

103、铺无菌盘时,使用无菌持物钳的操作如下,其中正确的是【单选题】——

A. 夹取物品时钳端触及罐口边缘

B. 使用中钳端始终朝下,无反转动作

C. 用无菌持物钳夹取消毒油纱布

D. 到远处夹取物品后立即返回放回浸泡容器内 从浸泡容器中取放时先将钳前端打开

【答案】：B

104、关于医院内感染的概念,错误的是【单选题】——

A. 医院内感染是指在医院内获得的感染

B. 与上次住院有关的感染是医院内感染

C. 出院之后发生的感染可能不是医院内感染

D. 入院时处于潜伏期的感染一定不是医院内感染

婴幼儿经胎盘获得的感染是医院内感染

【答案】：E

105、AFB 隔离指的是【单选题】——

- A. 空气隔离
- B. 接触隔离
- C. 结核菌(病)隔离
- D. 严密隔离 血液-体液隔离

【答案】：C

106、肛管煮沸消毒时,操作错误的是【单选题】——

- A. 先将肛管洗刷干净
- B. 水沸后开始计时
- C. 肛管腔内注水,用纱布包好
- D. 冷水时放入 在沸水中持续 5~10 分钟

【答案】：D

107、关于锐器伤后的预防措施,错误的是【单选题】——

- A. 如不慎发生锐器伤,应立即采取相应的保护措施,清创、对创面进行严格消毒处理
- B. 对发生锐器伤者进行血源性疾病的检查和随访
- C. 被 HBV 阳性病人血液、体液污染锐器刺伤,应在 1 周内注射乙型肝炎高效价免疫球蛋白
- D. 被 HBV 阳性病人血液、体液污染的锐器刺伤,应及时进行血液乙肝标志物检查 被 HBV 阳性病人血液、污染锐器刺伤,血液乙肝标志物阴性者按规定接种乙肝疫苗

【答案】：C

108、属污染区的区域是【单选题】——

- A. 更衣室
- B. 库房
- C.

走廊

D. 浴室 化验室

【答案】：D

109、后勤人员在治疗室要安置新的紫外线灯做空气消毒,护理人员指导安装其灯管离地面的距离为【单选题】——

A. <4m

B. <2m

C. <2.5m

D. <3m <3.5m

【答案】：B

110、根据我国卫生标准回答:使用中的消毒剂【单选题】——

A. 必须无菌

B. 细菌菌落总数应 $\leq 20\text{Cfu/g}$ 或 $\leq 20\text{cfu}/100\text{cm}^2$,致病性微生物不得检出

C. 细菌菌落总数应 $\leq 200\text{cfu/g}$ 或 $\leq 200\text{cfu}/100\text{cm}^2$,致病性微生物不得检出

D. 细菌菌落总数应 $\leq 100\text{cfu/mL}$,致病性微生物不得检出
细菌菌落总数应 $\leq 300\text{cfu/mL}$,致病性微生物不得检出

【答案】：D

111、医院感染控制措施中血管内装置感染,已证实有效的措施错误的是【单选题】——

A. 所有导管均应为密闭系统并限制插管的持续时间

B. 局部皮肤准备,插管时的无菌技术,疑有感染应立即拔除导管

C. 中心血管导管插管时外科灭菌

D. 限制敷料更换的频率,短期使用抗生素包裹的导管,限制插管时间
抗微生物药膏用于皮肤准备

【答案】：E

112、手术间通常保持的温度【单选题】——

A. 22~26℃

B.

18~20℃

C. 22~25℃

D. 20~22℃ 16~18℃

【答案】：C

113、关于消毒因子对人体的危害,错误的是【单选题】——

A. 微波对人体无害

B. 液体消毒剂可以造成人体过敏

C. 紫外线直接照射可伤害人体皮肤和角膜

D. 环氧乙烷泄漏不仅对人体直接有毒,还可以发生爆炸
吸入戊二醛气体对人体有害

【答案】：A

114、医院必须对消毒、灭菌效果定期进行监测,灭菌合格率必须达到

【单选题】——

A. 0.8

B. 1

C. 0.85

D. 0.95 0.9

【答案】：B

115、下列消毒剂中哪一种为高效消毒剂【单选题】——

A. 聚维酮碘

B. 碘酊

C. 乙醇

D. 含氯消毒剂 酚类消毒剂

【答案】：D

116、拟定各级医院感染管理政策【单选题】——

A. 卫生部医政司医院感染管理委员会

B. 省市卫生行政部门医院感染管理委员会

C. 医院的医院感染管理委员会

D. 医院感染管理科

临床科室以下各项工作是哪个部门的职责

【答案】：A

117、医院感染最重要的传染来源是【单选题】——

- A. 病原携带者
- B. 血液制品
- C. 食品
- D. 动物 各种病人

【答案】：E

118、一次性使用无菌医疗用品用后的处理正确的是【单选题】——

- A. 进行消毒、毁形、进行无害化处理
- B. 经消毒灭菌后重复使用
- C. 集中管理,统一交废品公司回收利用
- D. 经管理部门统一进行消毒处理后可重复使用 先浸泡,再清洗,然后再进行灭菌处理

【答案】：A

119、B-D 试验合格的标准是【单选题】——

- A. 指示图各部位颜色变化由深变浅
- B. 指示图各部位颜色变化为浅灰色
- C. 指示图各部位颜色变化为深黑色
- D. 指示图各部位颜色变化大致均匀 指示图各部位颜色变化深浅一致均匀

【答案】：E

120、手术室的医院感染管理错误的是【单选题】——

- A. 手术器具及物品能压力蒸汽灭菌的应避免使用化学灭菌剂浸泡灭菌
- B. 洗手刷应一用一灭菌
- C. 隔离手术间应远离手术室入口处
- D. 隔离病人手术术后器械及物品双消毒 手术室必须湿式清洁

【答案】：C

121、脱隔离衣的正确步骤是【单选题】——

- A. 解腰带. 刷手. 解领扣. 解袖扣. 脱去隔离衣
- B. 松腰带. 解袖扣. 刷手. 解领扣. 系腰带. 脱去隔离衣
- C. 松腰带. 系腰带. 解袖扣. 刷手. 解领扣. 脱去隔离衣
- D. 解袖扣. 刷手. 解领扣. 解腰带. 脱去隔离衣 刷手. 解腰带. 解袖扣. 解领扣. 脱去隔离衣

【答案】： C

122、无需执行昆虫隔离的疾病是【单选题】——

- A. 疟疾
- B. 气性坏疽
- C. 斑疹伤寒
- D. 流行性出血热 流行性乙型脑炎

【答案】： B

123、穿过皮肤或黏膜进入无菌的组织或器官内部的器材【单选题】——

- A. 灭菌剂或物理. 化学灭菌方法
- B. 应用灭菌剂或高效消毒剂
- C. 杀灭结核杆菌的消毒剂或中. 低效消毒剂
- D. 应用物理灭菌方法 杀灭细菌繁殖体的消毒剂

【答案】： A

124、在医院感染暴发流行或流行得到证实后, 医院应在多长时间内报告上级卫生行政部门【单选题】——

- A. 48h
- B. 36h
- C. 24h
- D. 12h 6h

【答案】： C

125、预防免疫功能低下患者发生医院感染,不正确的是【单选题】——

- A. 保护皮肤黏膜的完整性
- B. 保护性隔离
- C. 全身使用广谱抗生素
- D. 治疗局部感染病灶 注射相关疫苗

【答案】： C

126、手术区皮肤消毒的正确方法是【单选题】——

- A. 消毒范围超过手术切口 15cm
- B. 会阴部用碘酊消毒
- C. 消毒范围与备皮范围一致
- D. 用 2.5~3%的碘酊消毒 3 遍 用 95%乙醇脱碘

【答案】： A

127、三级综合医院的医院感染管理机构每月发布发生率最高的医院感染性疾病是【单选题】——

- A. 泌尿道感染
- B. 表皮传染病
- C. 呼吸道传染病
- D. 外伤感染 肠道传染病

【答案】： C

128、支气管镜采用 2%碱性戊二醛消毒时间应不少于【单选题】——

- A. 120min
- B. 60min
- C. 30min
- D. 20min 10min

【答案】： D

129、做洁净手术间空气培养,培养皿暴露时间【单选题】——

- A. 10 分钟

B. 20 分钟

C.

15 分钟

D. 30 分钟 40 分钟

【答案】：D

130、无菌盘铺好后,有效时间不超过【单选题】——

A. 4 小时

B. 6 小时

C. 5 小时

D. 7 小时 8 小时

【答案】：A

131、医疗废物为【单选题】——

A. 使用过的注射针头

B. 带血的敷料

C. 两者均是

D. 两者均否

【答案】：C

132、下列隔离操作中哪项是错误的【单选题】——

A. 操作过程中应用手扶好露出鼻部的口罩

B. 用避污纸打开床旁桌上的瓶塞灌开水

C. 测脉搏时持手表放入塑料袋内

D. 用避污纸取回病人用过的药杯 用过的体温表放于消毒液中

【答案】：A

133、使用紫外线照射消毒,关灯后至再使用前须间隔【单选题】——

A. 3~4min

B. 5~6min

C. 1~2min

D. 7~8min 9~10min

【答案】：A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/838024135143006066>