

口腔医学主治医师：口腔内科学必看考点真题

1、单选 患者，女性，39岁，1年来下唇反复糜烂，并伴有多处皮肤的不规则红斑，户外劳动后上述症状加重。查体示：下唇唇红盘状糜烂面，上覆血痂，周围放射状白纹，皮肤界限清楚；头皮、耳旁（江南博哥）、颈、前胸、双侧手背均见大小不等的不规则红斑伴萎缩，表面有黏着性鳞屑覆盖。按照上述诊断，下列关于该患者的预后和医嘱中错误的是（）

- A. 预后良好，少数可能发生转型或癌变
- B. 羟氯喹对胃黏膜刺激性不大，建议饭前服用
- C. 防晒
- D. 少食辛辣刺激食物
- E. 由于DLE病因不明，目前仍无根治性药物

正确答案：B

2、单选 淋病的口腔表现特征为（）

- A. 硬下疳
- B. 充血、水肿、糜烂、溃疡
- C. 白色斑块
- D. 大疱
- E. 肉芽肿形成

正确答案：B

3、单选 梅毒黏膜斑表现为（）

- A. 灰白色光亮斑块
- B. 白垩色斑块
- C. 珠光白色斑块
- D. 红色斑块
- E. 天鹅绒样斑块

正确答案：A

4、单选 下列关于白斑病的病理特征叙述错误的一项是（）

- A. 均质型表现为上皮萎缩，可伴有上皮异常增生或原位癌
- B. 颗粒型常为原位癌或早期浸润癌
- C. 基底细胞液化变性
- D. 角化层变薄甚至缺失，仅余2~3层棘细胞
- E. 上皮细胞常出现核浆比例倒置

正确答案：C

5、单选 手机消毒不能采用下述哪种方法（）

- A. 甲醛蒸气熏
- B. 高压消毒
- C. 紫外线消毒
- D. 2%碘酊擦拭后再用75%乙醇擦拭
- E. 0.1%苯扎溴铵过夜浸泡

正确答案：E

6、单选 获得性免疫缺陷综合征的病原体是（）

- A. DNA 病毒
- B. RNA 病毒
- C. 革兰阳性菌
- D. 革兰阴性菌

E. 苍白螺旋体 正确答案：B

7、单选 用于治疗口腔念珠菌病的碳酸氢钠溶液浓度范围为（）

- A. 2%~4%
- B. 1%
- C. 5%
- D. 10%

E. 0.1% 正确答案：A

8、单选 下列哪组口腔病损与 HIV 感染关系最为密切（）

- A. 口腔念珠菌和口腔溃疡
- B. 腮腺肿大和牙周病
- C. 带状疱疹和牙周病
- D. 灼口综合征和口干症
- E. Kaposi 肉瘤和毛状白斑

正确答案：E

9、单选 后牙鸠尾峡的宽度一般为颊舌牙尖间距的（）

- A. 1 / 4 到 1 / 3
- B. 1 / 3 到 1 / 2
- C. 1 / 5 到 1 / 4
- D. 1 / 2 到 2 / 3

E. 2 / 3 到 3 / 4 正确答案：B

10、单选 口腔扁平苔藓口腔黏膜损害的主要特征是（）

- A. 珠光白色条纹
- B. 丘疹
- C. 斑块
- D. 水疱

E. 糜烂 正确答案：A

11、单选 患者，男性，55岁，从事焊接工作35年，牙龈缘发黑就诊，检查发现右颊黏膜亦有棕黑色色素沉着斑，患者长期神经衰弱，伴有肌肉和关节酸痛，诊断可能是（）

- A. 铅中毒
- B. 汞中毒
- C. 铋中毒

D. 磷中毒

E. 砷中毒 **正确答案: A**

12、单选 患者，男性，26岁，舌部溃疡1个月。患者近2月来，低热、乏力、盗汗。体检：舌部右侧溃疡，较深，约1cm×0.5cm，边缘不齐，表面假膜，基底有细小的颗粒状结节，触痛明显。口腔病损的最佳治疗为（）

A. 0.1%雷夫奴尔含漱

B. 溃疡药膜局部贴敷

C. 2%普鲁卡因加地塞米松局部注射

D. 链霉素0.5g局部注射，隔日1次

E. 庆大霉素加氢化可的松雾化吸入 **正确答案: D**

13、单选 全口义齿基托蜡型的厚度为（）

A. 0.5~1mm

B. 1.5~2mm

C. 约0.5mm

D. 约1mm

E. 3mm

正确答案: B

14、单选 釉质发育不全与浅龋的区别为（）

A. 釉质表面缺损

B. 色素沉着斑

C. 探针时损害部位硬而光滑

D. 患者无症状

E. 釉质表面有白垩斑 **正确答案: C**

15、单选 口腔念珠菌病的诱发因素不包括（）

A. 广谱抗生素长期应用

B. 鼻咽癌局部放射治疗

C. Sjgren's syndrome

D. Behcet's disease

E. 糖尿病

正确答案: D

16、单选 DLE的病理表现中炎性细胞浸润的特点是（）

A. 角化层中有中性粒细胞浸润，常形成微脓肿

B. 固有层中密集的淋巴细胞呈带状浸润

C. 固有层中淋巴细胞呈灶性或扩张的毛细血管周围浸润

D. 固有层或黏膜下层有淋巴滤泡形成，滤泡周围是淋巴细胞，中心为网织细胞及组织细胞

E. 固有层或黏膜下层早期主要是嗜酸性粒细胞浸润，继而中性粒细胞增加

正确答案: C

17、单选 备洞时洞侧壁的釉质壁必须与釉柱的方向（）

- A. 呈 75°
- B. 垂直
- C. 平行
- D. 呈 30°
- E. 呈 60°

正确答案：C

18、单选 男性患者，38岁，10年来左侧后牙反复发生疼痛。冷热水引起剧痛，发作时夜间痛醒，在当时工院曾两次诊断为左侧Ⅱ、Ⅲ支三叉神经痛。住院、服药，因患者不同意而未作手术治疗。患者面容痛苦，口腔卫生极差。现在仍服用“卡马西平”。检查口腔见左侧上下后牙多个有邻面深龋，均未治疗，要求医师诊治。该主诉牙诊断三叉神经痛的条件是（）

- A. 扳机点存在
- B. 无夜痛
- C. 患牙治疗后疼痛仍存在
- D. 发作疼痛剧烈，短暂
- E. 包括以上各项

正确答案：E

19、单选 患者，女性，30岁，在口角唇缘处出现成簇小水疱，直径1~2mm，周围有轻度红斑，疼痛，不敢进食，自述该位置曾反复出现类似情况，拟诊断为（）

- A. 多型渗出性红斑
- B. 原发性疱疹性口炎
- C. 带状疱疹
- D. 复发性疱疹性口炎
- E. 盘状红斑狼疮

正确答案：D

20、单选 临床上牙髓息肉一般见于（）

- A. 急性牙髓炎浆液期
- B. 急性牙髓炎化脓期
- C. 慢性闭锁性牙髓炎
- D. 慢性溃疡性牙髓炎
- E. 慢性增生性牙髓炎

正确答案：E

21、单选 龋病的发病率表示在一特定观察期间内，新发龋病的频率，观察期间一般选择（）

- A. 年
- B. 月
- C. 季
- D. 周
- E. 日

正确答案：A

22、单选 男性，65岁，高热3天，昏迷1天。尿酮体(-)，血糖38mmol/L，血钠155mmol/L，血浆渗透压340mmol/L，尿素氮13.5mmol/L。最可能的诊断为()。

- A. 酮症酸中毒昏迷
- B. 高渗性非酮症昏迷
- C. 乳酸酸中毒
- D. 脑梗死
- E. 低血糖昏迷

正确答案：B

23、单选 支架固位复合树脂修复特别适用于几类洞()

- A. I类
- B. II类
- C. III类
- D. IV类
- E. V类

正确答案：D

24、单选 患者，男性，2岁半，初入幼儿园2周，父母发现其口腔内多个溃疡，手指、足趾等多部位散在小水疱。有关该病描述错误的是()

- A. 为自限性疾病
- B. 多为集体暴发，也可散发
- C. 冬季易流行
- D. 患儿需要适当隔离
- E. 春秋季节流行

正确答案：C

25、单选 口腔黏膜带状疱疹的临床表现为()

- A. 散在分布的单个小溃疡
- B. 各处成簇小水疱
- C. 单侧性皮肤、黏膜疱疹，沿三叉神经分支排列，且疼痛明显
- D. 广泛糜烂
- E. 单个或几个大小不等的水疱

正确答案：C

26、单选 用碳酸氢钠片治疗口腔白色念珠菌病，是因为碳酸氢钠()

- A. 可制造弱酸环境
- B. 可制造弱碱环境
- C. 可增强患者免疫力
- D. 可增加机体对维生素的吸收
- E. 可杀死白色念珠菌

正确答案：B

27、单选 口腔黏膜下纤维化()

- A. 癌前病变

- B. 癌前状态
- C. 既非癌前病变，也非癌前状态

正确答案： B

28、单选 患者，男性，49岁，自觉口咽部溃烂50天。口腔检查左侧舌腭弓中部见一直径约1.0cm×0.8cm大小溃疡，溃疡呈弹坑状，边缘不整齐，基底略硬，有灰白色假膜覆盖，用棉签擦去假膜有轻微触痛，可见基底有颗粒状肉芽，溃疡边缘微隆，呈鼠啮状。该患者两侧磨牙排列咬合良好，无修复体。该病的最佳治疗方案（）

- A. 局部注射激素
- B. 口服异烟肼
- C. 口服维生素B12
- D. 手术切除
- E. 脱敏治疗

正确答案： B

29、单选 铸件表面气孔形成的原因是（）

- A. 包埋材料的化学纯度低
- B. 合金里低熔点成分过多
- C. 包埋材料透气性不良
- D. 铸金加温过高、过久
- E. 铸圈焙烧时间过长

正确答案： D

30、单选 龋损在什么阶段开始产生牙髓反应（）

- A. 釉牙本质界处
- B. 牙本质浅层
- C. 牙本质中层
- D. 牙本质深层
- E. 髓壁处

正确答案： C

31、单选 先天梅毒的临床表现不包括（）

- A. 桑葚牙
- B. 哈钦森牙
- C. 神经性耳聋
- D. 间质性角膜炎
- E. 硬下疳

正确答案： E

32、单选 艾滋病又称获得性免疫缺陷综合征，它是因感染以下哪种病毒所致（）

- A. AIDS病毒
- B. HPV病毒

- C. HIV 病毒
- D. EB 病毒
- E. HSV 病毒

正确答案：C

33、单选 以下哪一条不符合棘层松解导致的临床损害（）

- A. 口腔内存在不易愈合的糜烂面
- B. 牙龈长期糜烂充血
- C. 腭部长期起疱糜烂
- D. 松弛性大疱
- E. 突发性口底水肿

正确答案：E

34、单选 临床治疗过程中根管的工作长度是指（）

- A. 牙根的实际长度
- B. 从牙齿的切缘或牙尖到根尖止点的距离
- C. X 线片上显示的根管长度
- D. 从牙齿的切缘或牙尖到器械有落空感的距离
- E. 从牙齿的切缘或牙尖到解剖根尖孔的距离 **正确答案：B**

35、单选 有关牙根纵裂的病因叙述不正确的是（）

- A. 慢性持续性的创伤
- B. 牙刷选择不当
- C. 牙根发育缺陷
- D. 无髓牙
- E. 过度根管预备 **正确答案：B**

36、单选 下列关于口腔白斑病的组织病理描述正确的一项是（）

- A. 不同类型及程度的过角化，伴有或不伴有上皮异常增生
- B. 过度正角化，伴有或不伴有上皮异常增生
- C. 过度不全角化，伴有或不伴有上皮异常增生
- D. 过度正角化或不全角化，伴有上皮异常增生
- E. 过度正角化或不全角化，不伴有上皮异常增生

正确答案：A

37、单选 口腔黏膜白色病损可以由下列原因引起，除了（）

- A. 上皮增生
- B. 上皮过度角化
- C. 上皮萎缩
- D. 结缔组织发生纤维素变性
- E. 上皮水肿

正确答案：C

38、单选 白塞病除常见口腔溃疡外，还可出现（）

- A. 手、足掌的虹膜状损害
- B. 生殖器溃疡、虹膜睫状体炎
- C. 干燥性角膜炎、结膜炎
- D. 沟纹舌、地图舌
- E. 口腔黏膜疱状损害

正确答案： B

39、单选 年轻恒牙急性浆液性牙髓炎，应施行（）

- A. FC 活髓切断术
- B. 直接盖髓术
- C. 根尖诱导成形术
- D. 间接盖髓术
- E. 氢氧化钙活髓切断术

正确答案： C

40、单选 白色念珠菌的致病形式是（）

- A. 酵母
- B. 假菌丝
- C. 真菌丝
- D. 芽生孢子
- E. 厚壁孢子

正确答案： B

41、单选 患者，男性，45岁，一个月前发现右下后牙牙龈有白色小疱，平时有轻微胀痛不适，右下4面龋深及髓，牙髓无活力，叩痛（-），X线片见右下4根尖透射区不规则，边界模糊。主诉牙应诊断为（）

- A. 慢性牙髓炎
- B. 慢性牙槽脓肿
- C. 根尖囊肿
- D. 根尖肉芽肿
- E. 慢性牙周炎

正确答案： B

42、单选 患者，男性，50岁。近来感觉口腔黏膜粗糙，涩感，偶然发现舌右侧黏膜有1cm²大小白色斑块状改变，白斑表面有小颗粒，稍微隆起高出黏膜面。检查见局部为非均质性白色斑块，触诊白色斑块基底稍微发硬，黏膜尚无破溃。口腔白斑主要与哪些疾病鉴别（）

- A. 白色角化症
- B. 疱疹性口炎
- C. 腺周口疮
- D. 红斑狼疮
- E. 白塞病

正确答案： A

43、单选 在新生儿和免疫力低下的老年人容易罹患的口腔念珠菌病类型主要是（）

- A. 急性假膜型念珠菌病
- B. 急性萎缩型念珠菌病
- C. 慢性肥厚型念珠菌病
- D. 慢性萎缩型念珠菌病
- E. 念珠菌性口角炎
- F. 慢性黏膜皮肤念珠菌病

正确答案： A

44、单选 患者，女性，40岁，下唇反复糜烂、渗血、结痂5年余。体检：下唇红椭圆形损害，被覆痂皮，损害外围短白纹，呈放射状排列，唇红近皮肤侧黑色素沉着。口内黏膜及皮肤未见损害。据此诊断可能是（）

- A. 盘状红斑狼疮
- B. 多形红斑
- C. 慢性非特异性唇炎
- D. 光化性唇炎
- E. 糜烂型扁平苔藓

正确答案： A

45、单选 下列哪项不是急性根尖周炎浆液期的临床症状（）

- A. 患牙浮出感
- B. 咬紧牙时痛缓解
- C. 自发痛
- D. 叩诊痛
- E. 温度测验敏感

正确答案： E

46、单选 以下是白斑的临床表现，除了（）

- A. 斑块状
- B. 颗粒状
- C. 水疱状
- D. 皱纸状
- E. 疣状

正确答案： C

47、单选 成年人唇周皮肤出现红斑、灼痒，随后出现簇集针头大小头疮，破溃后结有黄痂，可诊断为（）

- A. 口角炎
- B. 唇疱疹
- C. 鹅口疮
- D. 盘状红斑

E. 扁平苔藓

正确答案： B

48、单选 患者，男性，52岁，牙龈及腭部溃烂2月余。检查：右唇侧牙龈有一直径约0.5cm的水疱，透明。右侧软腭有1.0cm~1.5cm糜烂面，探针可伸入糜烂面周围的黏膜下方。该病的病理特点是（）

A. 上皮下疱

B. 基底细胞液化变性

C. 上皮角质栓

D. 结缔组织炎症细胞浸润

E. 上皮内疱

正确答案： E

49、单选 对于特发性血小板减少性紫癜患者描述错误的是（）

A. 皮肤、黏膜瘀点、瘀斑、血肿

B. 牙龈自发性出血

C. 血小板减少

D. 出血时间长

E. 凝血时间延长

正确答案： E

50、单选 关于梅毒的叙述错误的是（）

A. 致病微生物是苍白密螺旋体

B. 人是唯一传染源

C. 梅毒螺旋体难以人工培养

D. 根据潜伏期的长短分为早期和晚期

E. 血清试验阴性不能排除该病 **正确答案：** D

51、单选 正常情况下，唾液中含量最高的免疫球蛋白是（）

A. IgA

B. IgG

C. IgE

D. IgM

E. IgD **正确答案：** A

52、单选 梅毒临床治愈是指（）

A. 症状消失，损害愈合

B. 症状消失，损害愈合，损害愈合后无功能障碍

C. 症状消失，损害愈合，损害愈合后无组织缺损

D. 症状消失，损害愈合，梅毒血清反应阴性

E. 症状消失，损害愈合，损害愈合后无瘢痕形成

正确答案： A

53、单选 有避光作用的软膏是（）

- A. 皮质类固醇软膏
- B. 氯喹软膏
- C. 红霉素软膏
- D. 金霉素软膏
- E. 制霉菌素软膏

正确答案：B

54、单选 以下哪种是盘状红斑狼疮的诱发因素（）

- A. 饮食过量
- B. 饮茶过量
- C. 高脂肪食物
- D. 念珠菌感染
- E. 药物（如胍屈嗪）

正确答案：E

55、单选 患者男，42岁，诉右上后牙自发性钝痛1个月，1天前加重，出现夜间痛，冷热刺激加剧。视诊见16深龋洞，探痛。患者应先行以下哪项检查（）

- A. 牙髓电活力测试
- B. 牙髓活力温度测试
- C. X线检查
- D. 咬诊
- E. 诊断性麻醉

正确答案：B

56、单选 创伤性溃疡的临床特点包括（）

- A. 周期性反复发作史
- B. 溃疡边缘呈鼠蚀状
- C. 溃疡周围有白色斑块
- D. 初为水疱，疱破后形成溃疡
- E. 黏膜反复糜烂

正确答案：D

57、单选 患儿女，14岁。突然出现左下后牙咬物痛，无明显诱因自发肿痛1天，夜间加剧。检查：恒牙列，牙齿排列整齐，口腔卫生良好，左下5未见明显龋坏及缺损，叩（++），I度松动，对应根尖区黏膜肿胀，触痛明显。最恰当的应急处理（）

- A. 拔除左下5
- B. 静脉滴注广谱抗生素
- C. 左下5开髓封失活剂
- D. 左下5开髓引流，开放，根尖部牙龈切开排脓
- E. 左下5开髓通根，封药安抚治疗

正确答案：D

58、单选 酸蚀刻法复合树脂的粘接机理（）

- A. 螯合
- B. 化学键
- C. 范德华力
- D. 机械粘结
- E. 结合共聚 **正确答案：D**

59、单选 患者，女性，10岁，舌背反复出现红色斑片1年，病损形态时常变换，一般无疼痛。检查：舌背及舌缘有一红色区域，丝状乳头萎缩，周边为黄白色的围线，界限分明。以下可能是该病的病因，除了（）

- A. 舔舌习惯
- B. 消化不良
- C. 肠寄生虫
- D. 病灶感染
- E. 遗传因素

正确答案：A

60、单选 可复性牙髓炎行盖髓术后复诊的时间为（）

- A. 1~2天
- B. 3~4天
- C. 5~6天
- D. 1~2周
- E. 2~3个月 **正确答案：D**

61、单选 患者，男性，53岁，舌体进行性肿大5年，逐渐发硬，进食及言语受影响。口腔检查：整个舌体肿胀肥大，舌缘有结节状突起，舌背有沟裂、结节、紫癜和丘疹等损害，舌乳头水肿；扪诊舌体质韧，运动受限，其余口腔黏膜未见异常。经临床医师确诊患者具有多发性骨髓瘤。其发病可能与以下哪一种因素有关（）

- A. 糖代谢紊乱
- B. 脂肪代谢紊乱
- C. 蛋白质代谢紊乱
- D. 水电解质紊乱
- E. 内分泌紊乱

正确答案：C

62、单选 牙本质过敏症最可靠的诊断方法是（）

- A. 电活力测定
- B. 尖锐探针在牙面上滑动
- C. 热诊
- D. 备洞试验
- E. 冷诊 **正确答案：B**

63、单选 患者 30 岁，左上 6 因深髓治疗时不慎意外穿髓，穿髓孔一钻针大小。该患牙应如何处理（）

- A. 氢氧化钙制剂直接盖髓，羧酸水门汀垫底，银汞合金充填
- B. 氢氧化钙制剂直接盖髓，氧化锌丁香油糊剂安抚
- C. 氢氧化钙制剂直接盖髓，玻璃离子水门汀充填
- D. 活髓切断术
- E. 牙髓治疗

正确答案：E

64、单选 患者，女性，38 岁，左下后牙 3 天来持续胀痛，有冷热刺激痛，有跳痛，不能咬物。近 2 个月以来，该牙一直严重食物嵌塞而来我院就诊。最有可能的诊断是（）

- A. 牙龈乳头炎
- B. 急性上颌窦炎
- C. 急性根尖周炎
- D. 三叉神经痛
- E. 急性牙髓炎

正确答案：C

65、单选 天疱疮的临床类型（）

- A. 萎缩型、肥厚型
- B. 皱襞状、海绵状、鳞片状
- C. 斑块状、颗粒状、皱纸状、疣状
- D. 光滑型、结节型
- E. 寻常型、增殖型、落叶型、红斑型

正确答案：E

66、单选 盘状红斑狼疮容易发生在口腔黏膜哪一部分（）

- A. 唇红黏膜
- B. 口底黏膜
- C. 软腭黏膜
- D. 牙龈黏膜
- E. 舌腹黏膜

正确答案：A

67、单选 激素类的口控制剂不能用于哪种口腔黏膜病的治疗（）

- A. 复发性口腔溃疡
- B. 扁平苔藓
- C. 多形红斑
- D. 类天疱疮
- E. 口腔念珠菌病

正确答案：E

68、单选 先天缺牙的数目，最常见的是（）

- A. 2 颗
- B. 1 颗
- C. 3 颗
- D. 5 颗

E. 4 颗 **正确答案：A**

69、单选 患儿，女，8岁半，右上颌1外伤冠折，1切角缺损，即刻来院就诊。口腔检查：穿髓孔大，探痛(+++)，叩痛(±)。进行这种治疗成功的关键是()

- A. 保证患者无痛
- B. 保持无菌操作
- C. 止血彻底
- D. 盖髓剂的选择
- E. 拔髓彻底

正确答案：B

70、单选 有关多形渗出性红斑下列哪项描述是错误的()

- A. 口腔黏膜表现为大面积糜烂
- B. 皮肤损害为红斑、水疱
- C. 眼部病损为虹膜睫状体炎及前房积脓
- D. 是一种变态反应性疾病
- E. 可伴有明显的全身反应

正确答案：E

71、单选 全口义齿人工牙折断的修理方法是()

- A. 只磨除折断的人工牙
- B. 磨除折断的人工牙，并将近远中相邻的塑料牙邻面磨粗糙，磨去舌侧基托
- C. 磨除折断的人工牙，并将近远中相邻的塑料牙邻面磨粗糙
- D. 磨除折断的人工牙和唇、颊侧基托
- E. 磨除折断的人工牙和唇、颊、舌侧基托

正确答案：B

72、单选 患者右下6龋洞深，探不敏感，热试验引起疼痛，刺激去除后，持续时间长，其原因可能是()

- A. 急性牙髓炎
- B. 可复性牙髓炎
- C. 慢性牙髓炎
- D. 慢性增生性牙髓炎

E. 牙髓坏死 **正确答案：C**

73、单选 患者，女性，39岁，1年来下唇反复糜烂，并伴有多处皮肤的不规则红斑，户外劳动后上述症状加重。查体示：下唇唇红盘状糜烂面，上覆血痂，周围放射状白纹，皮肤界限清楚；头皮、耳旁、颈、前胸、双侧手背均见大小不等的不规则红斑伴萎缩，表面有黏着性鳞屑覆盖。下列哪项不是辅助检查的重点（）

- A. 总补体、C3、C4
- B. 肾功能
- C. 血沉
- D. 抗上（表）皮基底膜抗体
- E. 狼疮带试验

正确答案：D

74、单选 下列哪项不是白色海绵状斑痣的特点（）

- A. 家族性遗传疾病
- B. 常伴有口干
- C. 损害皱襞状、海绵状
- D. 口腔、眼结膜、外阴都可发生
- E. 无痛 **正确答案：B**

75、单选 患者，女性，30岁，不明原因双侧口角区充血、水肿、糜烂、皲裂3天，伴有口内黏膜广泛充血、糜烂及皮肤荨麻疹。诊断考虑为（）

- A. 念珠菌性口角炎
- B. 疱疹性口角炎
- C. 球菌性口角炎
- D. 创伤性口角炎
- E. 毒物性口角炎
- F. 营养不良性口角炎
- G. 接触性口角炎

正确答案：E

76、单选 垂体性侏儒症的口腔表征是（）

- A. 下颌骨巨大，上颌骨增大不明显，导致错~~畸~~畸形
- B. 舌体增大呈巨舌，舌缘齿痕明显
- C. 双唇肥厚，舌大，常伸出口外
- D. 牙齿萌出迟缓，乳牙迟脱，造成牙列拥挤
- E. 口腔黏膜苍白，并可出现瘀点、瘀斑或血肿

正确答案：D

77、单选 患者，男性，20岁。主诉：唇舌溃疡4天。吃刺激性食物加重。口腔检查：下唇黏膜可见5mm×3mm溃疡，充血轻，假膜薄，边缘规则。舌右侧黏膜可见3mm×4mm溃疡，充血水肿明显，有假膜，边缘高起，假膜厚、触痛。3年前口腔反复溃疡，一周左右愈合，间隔一个月复发。未治疗。一年前起生殖

器溃疡，体积大，愈合慢，近6个月下肢皮肤时常出现疼痛性结节，可消退。
该病全身治疗的首选药物是（）

A. 羟基氯喹

- B. 细胞毒类药物
- C. 秋水仙碱
- D. 免疫增强剂
- E. 糖皮质激素

正确答案：E

78、单选 唾液具有缓冲功能的最重要的物质是（）

- A. 重碳酸盐
- B. 磷酸盐
- C. 氯化物
- D. 钠离子
- E. 钾离子

正确答案：A

79、单选 下列除哪一项外一旦确诊后应行外科手术根治（）

- A. 颊黏膜内侧三角形口角区颗粒状白斑
- B. 牙槽嵴疣状白斑
- C. 舌腹红斑（赤斑）
- D. 下唇 DLE 继发鳞状细胞癌
- E. 牙龈斑块状白斑

正确答案：E

80、单选 天疱疮的病理特点是出现（）

- A. 上皮内疱
- B. 基底细胞排列异常
- C. 上皮角质栓
- D. 上皮下疱
- E. 上皮过角化

正确答案：A

81、单选 口腔黏膜下纤维性变临床特点（）

- A. 黏膜纤维条索损害
- B. 黏膜白色斑块损害
- C. 黏膜白色网状、树枝状损害
- D. 黏膜红色斑块损害
- E. 黏膜大疱损害

正确答案：A

82、单选 活髓切断术成功的关键因素是（）

- A. 去尽腐质
- B. 髓室顶揭除完全
- C. 止血彻底
- D. 无菌操作
- E. 放置盖髓剂

正确答案：C

83、单选 下列哪种不良习惯可直接引起牙周组织的破坏（）

- A. 儿童多动症
- B. 咀嚼槟榔
- C. 偏食
- D. 磨牙症
- E. 酗酒

正确答案： D

84、单选 患者，男性，14岁，牙龈肿胀肥大、暗紫色，极易出血，该患者面色苍白，长期不吃新鲜水果蔬菜，最可能的诊断是（）

- A. 再生障碍性贫血
- B. 粒细胞缺乏症
- C. 烟酸缺乏症
- D. 维生素 B2 缺乏症
- E. 维生素 C 缺乏症

正确答案： E

85、单选 临床表现为反复发作的大而深的溃疡最多见的是（）

- A. 二期梅毒
- B. 复发性坏死性黏膜腺周围炎
- C. 急性坏死性龈口炎
- D. 疱疹样阿弗他溃疡
- E. 口腔黏膜结核 **正确答案：** B

86、单选 目前预防艾滋病最重要的措施是（）

- A. 及时隔离 HIV 感染者
- B. 充分理解和关心艾滋病患者，以免其隐瞒病情
- C. 提高公众意识，切断传播途径
- D. 易感者接种 HIV 疫苗
- E. 应用高效价免疫球蛋白保护易感者 **正确答案：** C

87、单选 圆锥型套筒冠义齿修复后一段时间引起基牙疼痛的最常见原因是（）

- A. 早接触
- B. 牙髓炎
- C. 牙髓充血
- D. 继发龋
- E. 牙周组织炎症

正确答案： E

88、单选 最常见的口腔念珠菌病是（）

- A. 急性红斑型念珠菌口炎
- B. 增殖型念珠菌口炎
- C. 慢性红斑型念珠菌口炎

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/838136064031006055>