

皮肤与性病学主治医师：相关专业知识与专业知识考试试题（题库版）

1、单选 下列关于表皮样囊肿说法不正确的是（）。

- A. 是一种真皮内含有角质的囊肿
- B. 好发于青年、儿童
- C. 通常见于头皮、面部、颈部、躯干及臀部等
- D. 多发（江南博哥）表皮样囊肿见于 Gardner 综合征
- E. 外伤性表皮样囊肿也多发于头皮、面部、颈部、躯干及臀部等

**正确答案：** E

2、单选 患者，男，40岁。已婚，健康检查发现血 RPR 阴性，TPPA 阳性。关于该患者下列说法不正确的是（）。

- A. 既往可能患有梅毒，现已治愈
- B. 不可能患有活动性梅毒
- C. 可能患有活动性梅毒
- D. 可能不患有梅毒
- E. 如不及时予以治疗可能出现神经梅毒

**正确答案：** B

3、单选 关于大疱性红斑狼疮描述错误的是（）。

- A. 为急性皮肤红斑狼疮的一种新亚型
- B. 皮肤好发于曝光部位
- C. 组织病理是表皮下水疱
- D. 免疫电镜是免疫球蛋白沉积在透明板
- E. 患者对氨苯砞治疗非常敏感

**正确答案：** D

**参考解析：**大疱性红斑狼疮为急性皮肤红斑狼疮的一种新亚型，皮损为单个或成簇的水疱或大疱，好发于曝光部位。组织病理为含有中性粒细胞的表皮下水疱。免疫电镜示：在致密板有颗粒状 IgG、IgM 或 IgA 沉积。患者对氨苯砞治疗敏感，以此可与获得性大疱表皮松解症鉴别。

4、单选 患者，男，34岁。半年前反复出现口腔溃疡，有灼痛且不易愈合；近两个月来在头面、颈部、胸背、腋下及腹股沟部起红斑，1周后陆续在红斑基础上出现黄豆至蚕豆大小水疱，部分还可融合成大疱，疱壁薄且松弛，尼氏征阳性，水疱破裂后所形成的糜烂不易愈合，故前来就诊。患者最可能的诊断是（）。

- A. 寻常型天疱疮
- B. 大疱性类天疱疮
- C. 疱疹样皮炎
- D. 多形红斑
- E. 线状 IgA 大疱性皮肤病

**正确答案：** A

5、单选 有关淋球菌错误的是（ ）。

- A. 奈瑟淋球菌是一种革兰阴性双球菌
- B. 人是淋球菌的唯一自然宿主
- C. 淋球菌主要寄居于黏膜表面的柱状上皮细胞内
- D. 淋球菌不耐热，干燥环境存活 1~2 小时
- E. 淋球菌适宜的生长温度是 32~36℃

**正确答案：**E

**参考解析：**淋球菌适宜的生长温度是 37~38℃。

6、单选 患者，男性，45 岁。主因龟头起皮疹 10 余天伴瘙痒就诊。否认婚外性接触史。查体：龟头、包皮内板表现为红斑、丘疹、小的点片状的糜烂面，上覆白色点状乳酪状分泌物。最可能的诊断是（ ）。

- A. 坏疽性龟头炎
- B. 干燥闭塞型龟头炎
- C. 念珠菌性包皮龟头炎
- D. 浆细胞性包皮龟头炎
- E. 环状糜烂性包皮龟头炎

**正确答案：**C

7、单选 患者，女性，40 岁。面部、上肢等部位散在分布暗红色的坚韧丘疹、结节，表面光滑、境界清楚，组织病理学示：真皮内上皮样细胞肉芽肿，可见上皮样细胞裸结节，无干酪样坏死。以下药物一般不用于本病的治疗的是（ ）。

- A. 羟基氯喹
- B. 雷公藤制剂
- C. 糖皮质激素
- D. 免疫抑制剂
- E. 抗组胺药物

**正确答案：**E

8、单选 依据尖锐湿疣疣体形态分类，下列不是其分类的是（ ）。

- A. 丘疹型
- B. 乳头型
- C. 菜花型
- D. 鸡冠型
- E. 针尖型

**正确答案：**E

**参考解析：**尖锐湿疣依据疣体形态可以分为丘疹型、乳头型、菜花型、鸡冠型和蕈样型。

9、单选 患者，女性，65岁。全身皮疹反复发作30年，近半年来皮损加重。患者既往诊断银屑病予外用药物治疗，具体不详。2年前间断口服泼尼松治疗，皮损控制不理想，于半年前自行停用。系统检查：急性病容，T38.7，脉搏98次/分，轻度库欣面容。专科检查见颜面、躯干和双大腿大片状潮红斑，见细碎鳞屑。头皮见斑丘疹，伴厚层鳞屑，四肢散在斑丘疹、丘疹，其上附着鳞屑。患者的诊断是（）。

- A. 寻常型银屑病
- B. 脓疱型银屑病
- C. 关节病型银屑病
- D. 红皮病型银屑病
- E. 剥脱性皮炎

**正确答案：**D

10、单选 患者，男性，36岁。主因面正中部皮疹3年余就诊。查体：患者鼻部、双颊、眉间充血性红斑，毛细血管扩张，上有丘疹、脓疱。可采用的治疗方法是（）。

- A. 外用5%硫磺霜
- B. 口服甲硝唑
- C. 口服大环内酯类药
- D. 口服异维A酸
- E. 以上方法均可选用

**正确答案：**E

11、单选 线性IgA大疱性皮肤病的治疗首选（）。

- A. 皮质类固醇激素
- B. 氨苯砞
- C. 免疫抑制剂
- D. 伊曲康唑
- E. 少量多次输血

**正确答案：**B

12、单选 患者，女性，65岁。右侧乳房片状浸润性红斑、表面有轻度糜烂和结痂，病程慢性，无异常物质接触史，无明显自觉症状。组织病理学示：表皮Paget细胞。以下不是Paget细胞的特点的是（）。

- A. 体积较大
- B. 细胞圆形
- C. 胞质淡染
- D. PAS染色阴性
- E. 耐淀粉酶

**正确答案：**D

13、单选 关于鳞状毛囊角化症下列不正确的是（）。

- A. 好发于青壮年
- B. 可能与鱼鳞病属同类病

- C. 为角化性皮肤病
- D. 在少数病例中家族中有相同患者
- E. 为常染色体显性遗传

**正确答案：** E

14、单选 急性湿疹的好发部位是（ ）。

- A. 耳后
- B. 颈部
- C. 胸部
- D. 背部
- E. 四肢

**正确答案：** A

15、单选 患者，女，24岁。阴道分泌物增多1个月，无阴道瘙痒。体格检查：阴道壁覆有较多米糊状分泌物，阴道黏膜无潮红，宫颈口见少量透明分泌物。对该患者的处理下列方法不适当的是（ ）。

- A. 甲硝唑 500mg，每日2次，连服1周
- B. 甲硝唑 2g，一次性顿服
- C. 克林霉素 300mg，每日2次，连服1周
- D. 米诺环素 100mg，每日2次，连服1周
- E. 甲硝唑阴道栓剂 200mg，塞入阴道，每晚一次，连续1周

**正确答案：** D

16、单选 关于疱疹样皮炎的叙述，不正确的为（ ）。

- A. 可能是遗传易感性的免疫病
- B. 皮疹对称发生于四肢伸侧
- C. 尼氏征阴性
- D. 治疗首选免疫抑制剂
- E. 免疫病理提示真皮乳头层及基底膜带有颗粒状 IgA 沉积

**正确答案：** D

17、单选 关于一期梅毒，错误的是（ ）。

- A. 一般患者起病前有不洁性交史
- B. 潜伏期 2~4 周
- C. 硬下疳是主要的表现
- D. 在硬下疳处取材以暗视野检查可见苍白螺旋体
- E. 梅毒血清试验阴性可排除一期梅毒

**正确答案：** E

**参考解析：** 梅毒早期血清学试验可为阴性。

18、单选 对淤积性溃疡处理错误的是（ ）。

- A. 抬高患肢
- B. 急性炎症期 1：5000 高锰酸钾溶液湿敷

- C. 不可用含抗生素的糊膏外敷
- D. 对长期小溃疡不愈合，可考虑手术切除
- E. 新发溃疡避免刺激

**正确答案：**C

19、单选 下列病毒属 DNA 病毒的是（ ）。

- A. 麻疹病毒
- B. 风疹病毒
- C. 人类乳头瘤病毒
- D. 埃可病毒
- E. 柯萨奇病毒

**正确答案：**C

**参考解析：**人类乳头瘤病毒属于 DNA 病毒。麻疹病毒、风疹病毒、埃可病毒、柯萨奇病毒均属于 RNA 病毒。

20、单选 患者，女性，24 岁。双下肢遇冷后出现大理石样纹，部分皮肤呈斑点状红斑，自觉双下肢刺痛感间或麻木感，保暖后症状缓解。系统性检查无异常。双侧足趾冬季易发冻疮，血尿常规检查无异常，免疫系统检查正常。根据临床表现，该患者最可能的诊断为（ ）。

- A. 网状青斑
- B. 皮炎
- C. 硬皮病
- D. 系统性红斑狼疮
- E. 类风湿关节炎

**正确答案：**A

21、单选 红癣用 Wood 灯照射后呈（ ）。

- A. 珊瑚红色
- B. 黄白色
- C. 绿色
- D. 蓝白色
- E. 棕黄色

**正确答案：**A

**参考解析：**滤过紫外线检查（Wood 灯检查）是由高压汞灯作为发射光源，通过由含 9%镍氧化物的钡硅酸滤片发出 320~400nm 波长的光波。主要诊断用于色素异常性疾病、皮肤感染和卟啉病。如白癜风为明亮的蓝白色斑片、假单胞菌为绿色荧光、红癣为珊瑚红色荧光、痤疮为黄白色荧光。

22、单选 SSSS 治疗错误的是（ ）。

- A. 局部采用暴露疗法，可用 20%紫草油外涂，加强眼、口腔、外阴护理
- B. 床旁隔离，保持干燥
- C. 及早系统使用抗生素--控制感染，清除或减少细菌产生的外毒素

- D. 注意水电解质紊乱及继发感染
- E. 可用糖皮质激素辅助治疗

**正确答案：**E

23、单选 外用治疗寻常型痤疮常用（）。

- A. 异维 A 酸
- B. 维胺脂
- C. 阿维 A 酯
- D. 阿维 A 酸
- E. 阿达帕林

**正确答案：**E

**参考解析：**维 A 酸类药物是一组与天然维生素 A 结构类似的化合物，能调节上皮细胞和其他细胞的生长和分化。其中第一代维 A 酸主要包括全反式维 A 酸、异维 A 酸和维胺脂。全反式维 A 酸外用可用于痤疮；后两者口服对寻常型痤疮、掌部角化症等有良好效果。第二代维 A 酸主要包括阿维 A 酯、阿维 A 酸及维 A 酸乙酰胺的芳香组衍生物。阿维 A 酯主要用于重症银屑病、各型鱼鳞病、掌跖角化病等，与糖皮质激素、PUVA 联用可用于治疗皮肤肿瘤。

24、单选 皮脂分泌适度，皮肤滋润、富有弹性的是（）。

- A. 油性皮肤
- B. 干性皮肤
- C. 混合性皮肤
- D. 中性皮肤
- E. 敏感性皮肤

**正确答案：**D

25、单选 下列梅毒螺旋体检查方法中正确的是（）。

- A. 暗视野法
- B. 培养
- C. 涂片做 PAS 染色
- D. 苛性钾法
- E. 荧光染色

**正确答案：**A

26、单选 患者，女性，65 岁。因右侧面颊部溃疡 1 个月就诊，患者 1 年前于患处发生一角化性丘疹，后逐渐增大，并于 1 个月前在皮损表面出现溃疡。体格检查：右侧面颊部一 3cm×4cm 大小角化性疣状增生，表面凹凸不平，并有一 1cm×1cm 大小溃疡，边缘隆起，底部有出血。该患者诊断应首先考虑（）。

- A. 表皮痣
- B. 脂溢性角化病
- C. 基底细胞癌
- D. 鳞状细胞癌

E. 恶性黑素瘤

**正确答案：D**

27、单选 患者，男，43岁。10余年前每于夏季在腹股沟、大腿内侧、腋下出现皮疹，主要表现为红斑、小水疱，自觉瘙痒，抓挠后有渗出。一般夏季加重，冬季缓减，每年反复发作。其父有类似病史。皮科情况：双腋下0.5cm×1.0cm~1.0cm×2.0cm大小红斑，无糜烂及渗液；双大腿根部内侧大片红斑，中央糜烂渗液，有异味。红斑边缘见黄豆大水疱，壁松弛，疱液混浊，尼氏征阳性。该病与自身免疫性大疱病的主要区别是（）。

- A. 组织病理示表皮下 / 表皮内水疱
- B. 尼氏征阳性 / 阴性
- C. 直接 / 间接免疫荧光检测阴性
- D. 直接免疫荧光检测阳性
- E. 紧张性 / 松弛性水疱

**正确答案：C**

28、单选 接触过敏性皮炎致敏的抗原呈递细胞为（）。

- A. 棘细胞
- B. 角质形成细胞
- C. 颗粒细胞
- D. 基底细胞
- E. 朗格汉斯细胞

**正确答案：E**

29、单选 患者，女，13岁。反复口周化脓破溃半年。2年前因外伤在当地医院输过血。体格检查：右面部及下颏见一处3cm×4cm大小溃疡，表面见较多黄绿色脓性分泌物。下列有助于该患儿疾病诊断是（）。

- A. 外周血白细胞显著升高
- B. 外周血嗜酸性粒细胞显著升高
- C. 血清中免疫球蛋白IgG显著升高
- D. CD4T+淋巴细胞显著减少
- E. 血清中C3显著下降

**正确答案：D**

30、单选 患者，男性，60岁。颞部2cm×2cm大小黑素斑块，略隆起于皮面，边界清楚但不规整，黑色不均匀，近2个月来缓慢增大。根据Clark分级法，下列可定义为III级的是（）。

- A. 黑素瘤细胞局限于表皮和皮肤附属器
- B. 侵入真皮乳头层
- C. 侵入乳头下血管丛，但未侵入真皮网状层
- D. 侵入真皮网状层
- E. 侵入皮下脂肪组织

**正确答案：C**

31、单选 患者，女性，40岁。躯干、上肢皮疹伴瘙痒2天就诊。患者2天前于颈前、上胸部、双前臂伸侧出现红色皮疹，有明显瘙痒，皮疹渐加重、扩大，出现局部渗出，该患者发病前有去海边旅游日晒史。查体：颈前、上胸部、双前臂伸侧密集成簇分布的小丘疱疹、水疱，局部轻度肿胀、渗液。该患者临床表现属于（）。

- A. 丘疱疹型
- B. 丘疹型
- C. 红斑水肿型
- D. 痒疹型
- E. 混合型

**正确答案：A**

32、单选 对于梅毒血清试验中生物性假阳性反应，下列不恰当的是（）。

- A. 生物性假阳性反应的孕妇所生的婴儿，不出现生物性假阳性反应
- B. 一般不发生于由密螺旋体抗原引起的反应
- C. 见于心磷脂抗原引起的反应
- D. 常见于全身性红斑狼疮
- E. 生物学假阳性反应往往自然消失

**正确答案：A**

**参考解析：**生物性假阳性反应的孕妇所生的婴儿也可出现生物性假阳性反应。

33、单选 下列抗真菌药物适应证不正确的是（）。

- A. 灰黄霉素口服治疗甲癣
- B. 制霉菌素口服治疗消化道念珠菌感染
- C. 两性霉素B治疗隐球菌病
- D. 联苯苄唑外用治疗足癣
- E. 伊曲康唑口服治疗曲霉病

**正确答案：A**

**参考解析：**灰黄霉素口服一般用来治疗头癣，由于它具有肝毒性，一般不用来治疗甲癣。

34、单选 下列念珠菌对氟康唑天然耐药的是（）。

- A. 近平滑念珠菌
- B. 热带念珠菌
- C. 白色念珠菌
- D. 克柔念珠菌
- E. 都柏林念珠菌

**正确答案：D**

35、单选 手部湿疹发病率高是因为（）。

- A. 与角质层较厚有关

- B. 与手部汗腺较多有关
- C. 与手部生理和病理有关
- D. 接触外界致病因素机会较多
- E. 因该部位有透明层

**正确答案：**D

36、单选 在颗粒层或棘层上部海绵形成的基础上有中性粒细胞聚集，形成脓疱，多见于脓疱型银屑病、连续性肢端皮炎等疾病的是（）。

- A. Kogoj 微脓肿
- B. 表皮水肿
- C. 肉芽肿
- D. Pautrier 微脓肿
- E. Munro 微脓肿

**正确答案：**A

37、单选 变应性血管炎（）。

- A. 透明变性
- B. 纤维素样变性
- C. 胶样变性
- D. 黏液变性
- E. 嗜碱性变

**正确答案：**B

**参考解析：**变性是指细胞或组织由于代谢障碍引起的一些异常物质沉着。可分为淀粉样变性、透明变性、纤维素样变性、胶样变性、嗜碱性变、弹力纤维变性、胶原均质化、胶原溶解和黏液变性。

38、单选 患者，女性，40岁。面部皮肤肿胀，发硬2年。病程中伴四肢关节活动障碍。体检：面部轻度肿胀，皮肤发硬，不能捏起；张口受限；耳后、颈部，前胸部皮肤异色病样改变；双手、前臂、双足及小腿皮肤发硬、不能捏起；多个手指外侧缘有钙化。四肢活动受限，不能平举。该患者最可能的诊断（）。

- A. 局限性硬皮病
- B. 系统性硬皮病
- C. 皮炎
- D. 系统性红斑狼疮
- E. 混合性结缔组织病

**正确答案：**B

39、单选 患者，女性，40岁。面部皮肤肿胀，发硬2年。病程中伴四肢关节活动障碍。体检：面部轻度肿胀，皮肤发硬，不能捏起；张口受限；耳后、颈部，前胸部皮肤异色病样改变；双手、前臂、双足及小腿皮肤发硬、不能捏起；多个手指外侧缘有钙化。四肢活动受限，不能平举。

该病最常见的死亡原因是（）。

- A. 肾损害
- B. 心脏损害
- C. 皮肤损害
- D. 肺损害
- E. 感染

**正确答案：D**

40、单选 患儿，男性，10岁。阴囊皮疹伴瘙痒6周，呈阵发性，以夜间为重。查体：全身皮肤黏膜无黄染，未见风团。阴囊见散在结节，约黄豆大小，质地中等硬度，无触痛。为提示诊断，应注意询问病史，其中最应注意有无（）。

- A. 疥疮病史
- B. 慢性荨麻疹病史
- C. 阴囊湿疹病史
- D. 虫咬皮炎病史
- E. 哮喘或过敏性鼻炎病史

**正确答案：A**

41、单选 患者，女，30岁。发热3周伴皮疹。体温呈弛张热，中毒症状轻，抗生素治疗2周无效。非甾体消炎药及糖皮质激素退热效果佳。发热时皮疹呈水肿性红斑样，伴有四肢关节酸痛，热退时皮疹不明显。体格检查：体温39.6℃，一般情况尚可，颌下、腋下数个蚕豆大小淋巴结，活动。心肺无异常。面及躯干见散在水肿性红斑。实验室检查：WBC $21.3 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞占82.3%；RBC $300 \times 10^{12}/L$ ，Hb90g/L；尿及大便常规检查正常；ESR42mm/h；血培养3次均阴性；血抗ANA抗体全套阴性；骨髓穿刺细胞学检查为增生性骨髓象；骨髓细菌培养阴性，肥达反应阴性；淋巴结病理为反应性增生。该患者临床上最可能的诊断为（）。

- A. 系统性红斑狼疮
- B. 败血症
- C. 成人Still病
- D. 淋巴瘤
- E. 风湿热

**正确答案：C**

42、单选 头癣的首选治疗是（）。

- A. 综合治疗
- B. 剪发
- C. 外用抗真菌药
- D. 口服灰黄霉素
- E. 抗真菌药洗发

**正确答案：**D

**参考解析：**头癣应采取综合治疗。内服与外用相结合。内服药首选灰黄霉素，皮肤外用抗真菌药。患者尽可能把头发全部剪除。患者使用的物品应常煮沸消毒。服药后3周取患处头发进行真菌镜检。

43、单选 卡氏肺囊虫肺炎的治疗，首选药物是（）。

- A. 红霉素
- B. 四环素
- C. 青霉素
- D. 头孢菌素
- E. 复方新诺明

**正确答案：**E

44、单选 血液系统恶性肿瘤预防深部真菌感染首选用药为（）。

- A. 两性霉素 B
- B. 氟康唑
- C. 特比萘芬
- D. 酮康唑
- E. 伊曲康唑

**正确答案：**B

45、单选 患者，男，46岁。口腔糜烂1年，躯干水疱6个月。体格检查：躯干见蚕豆大小的水疱，壁薄，基底红，尼氏征（+）；并见较多糜烂面，表面有污秽痂皮；口腔黏膜糜烂。实验室检查：血尿及大便常规检查正常；肝肾功能正常；ESR正常。该病治疗首选药物（）。

- A. CTX
- B. 糖皮质激素
- C. 氨苯砞
- D. MTX
- E. 免疫球蛋白

**正确答案：**B

46、单选 SLE的特征性抗体是（）。

- A. 抗Sm抗体
- B. 抗nRNP抗体
- C. 抗dsDNA抗体
- D. 抗红细胞抗体
- E. 抗心磷脂抗体

**正确答案：**A

**参考解析：**抗Sm抗体是其特征性抗体。

47、单选 不是麻风的治疗原则的是（）。

- A. 早期

- B. 及时
- C. 适量
- D. 规则治疗
- E. 足量

**正确答案：**E

48、单选 引起 SSSS 综合征的病原菌为（）。

- A. 表皮葡萄球菌
- B. 痤疮棒状杆菌
- C. 金黄色葡萄球菌
- D. 溶血性链球菌
- E. 白色念珠菌

**正确答案：**C

**参考解析：**葡萄球菌性烫伤样皮肤综合征（SSSS）是由凝固酶阳性、噬菌体 II 组 71 型金黄色葡萄球菌所致的一种严重皮肤感染。

49、单选 弹力过度性皮肤的发病机制主要是（）。

- A. 网状纤维量的缺陷及形态上的异常
- B. 胶原纤维量的缺陷及形态上的异常
- C. 弹力纤维量的缺陷及形态上的异常
- D. 真皮含水量的增加，真皮基质黏性增加
- E. 血清中弹性硬蛋白酶抑制剂水平低下，导致弹力纤维破坏

**正确答案：**B

50、单选 混合性结缔组织病中最有诊断价值的抗体是（）。

- A. 抗 U1-RNP 抗体
- B. 抗 Ro/SSA 或 La/SSB 抗体
- C. 抗 Sm 抗体
- D. 抗 Jo-1 抗体
- E. 抗 PM-1 抗体

**正确答案：**A

51、单选 晚期胎传梅毒的症状多发于（）。

- A. 儿童及青春期
- B. 婴儿期
- C. 中年期
- D. 老年期
- E. 妊娠期

**正确答案：**A

52、单选 桥粒芯蛋白 3 主要位于（）。

- A. 正常复层鳞状上皮的上层
- B. 上皮的下层

- C. 汗腺和毛囊的上皮细胞
- D. 柱状上皮
- E. 表皮

**正确答案：**B

**参考解析：**桥粒芯蛋白分 Dsg1、Dsg2 及 Dsg3 三型。Dsg1 主要分布于正常复层鳞状上皮的上层，Dsg3 主要分布在上皮下层，而 Dsg2 在正常表皮不表达或表达较低，但在皮肤附属器如汗腺、毛囊的上皮细胞中表达。

53、单选 有关 Reiter 综合征，不正确的是（）。

- A. 是男性非淋菌性尿道炎的一种常见的并发症
- B. 除非淋菌性尿道炎外，还有关节炎和结膜炎
- C. 一般发生在尿道炎后 1 周左右
- D. 患者关节液中可分离到衣原体
- E. 患者关节液中分离到支原体

**正确答案：**C

**参考解析：**尿道炎、结膜炎和关节炎三联症可以同时出现，亦可以先后数月甚至数年才出现。

54、单选 用于治疗日光性皮炎的是（）。

- A. 维 A 酸
- B. 烟酰胺
- C. 伊曲康唑
- D. 氯喹
- E. 阿昔洛韦

**正确答案：**D

55、单选 患者，男性，24 岁。主因发现阴茎部皮疹 1 天就诊。患者在洗澡时发现冠状沟处皮疹，不痛不痒，否认不洁性接触史。查体：冠状沟处可见针尖大小、表面光滑的乳白色小丘疹，直径 1~2mm，圆顶状，呈线状排列。本病诊断的主要依据是（）。

- A. 好发于青壮年
- B. 好发于冠状沟处的线状排列针尖大小的小丘疹
- C. 无不洁性接触史
- D. 醋酸白试验阴性
- E. 以上均是

**正确答案：**E

56、单选 患者，女性，20岁。因“全身皮疹伴表皮破溃2天”就诊。患者1周前出现上呼吸道感染，多次给予多种抗生素及退热药物，2天前躯干部出现红色点状皮疹，迅速增多、增大，伴大小不等水疱、破溃。查体：T37.6℃，口腔黏膜轻度糜烂，躯干、四肢弥漫性暗红色斑片，伴大小不等松弛性水疱、大疱，尼氏征（+），部分水疱破溃见表浅糜烂面，水疱及破溃面积约占体表面积的40%。下列方案不适用于该患者的是（）。

- A. 丙种球蛋白
- B. 血浆
- C. 糖皮质激素
- D. 甲氨蝶呤
- E. 抗感染

**正确答案：**D

57、单选 关于嗜酸性筋膜炎的实验室检查指标不正确的是（）。

- A. 外周嗜酸细胞明显增多
- B. ESR降低
- C. 高 $\gamma$ 球蛋白血症
- D. IgG升高
- E. ANA抗体阴性

**正确答案：**B

58、单选 天疱疮的临床表现的描述，不正确的是（）。

- A. 寻常型天疱疮为最严重的一型
- B. 寻常型天疱疮尼氏征阴性
- C. 增殖型天疱疮患者一般是免疫力强的年轻人
- D. 落叶型天疱疮尼氏征阳性
- E. 红斑型天疱疮为落叶型天疱疮的良性型

**正确答案：**B

59、单选 患儿，女，6岁。因右侧面部红斑就诊，皮损出生时即有，随着年龄增加有增大趋势。体格检查：局部大片红斑，表面光滑，边界清楚，压之褪色。本病治疗主要选择（）。

- A. 手术切除
- B. 染料激光
- C. 长波紫外线
- D. 红外线
- E. 硬化剂注射

**正确答案：**B

60、单选 下列不符合白头粉刺的是（）。

- A. 又叫封闭性粉刺
- B. 毛囊开口不明显

- C. 毛囊口明显扩大
- D. 不易挤出脂酸
- E. 愈后不留瘢痕

正确答案：C

61、单选 患者，男性，45岁。主因龟头起皮疹10余天伴瘙痒就诊。否认婚外性接触史。查体：龟头、包皮内板表现为红斑、丘疹、小的点片状的糜烂面，上覆白色点状乳酪状分泌物。对诊断最有帮助的检查是（）。

- A. 血清梅毒学检查
- B. 病理检查
- C. 分泌物滴虫检查
- D. 分泌物真菌镜检和培养
- E. 分泌物细菌培养+药敏

**正确答案：**D

62、单选 患儿，女性，10岁。双手指多发皮疹伴局部瘙痒、破溃就诊。查体见双手背、手指部弥漫性肿胀，手指处多发暗紫红色水肿性红斑、局部糜烂渗液。该患者既往于冬季有类似皮疹发作史。该患者临床鉴别诊断中除外（）。

- A. 变应性皮肤血管炎
- B. 系统性红斑狼疮
- C. 急性湿疹
- D. 冻疮
- E. 多形红斑

**正确答案：**D

63、单选 板层状鱼鳞病的基因定位于（）。

- A. 3q21-q22
- B. 2q33-q35
- C. 1q21
- D. 1q25-1q32
- E. Xq22.3

**正确答案：**B

64、单选 男，43岁。鼻部皮疹5年，初为鼻尖部红斑，对称分布，逐渐出现丘疹、脓疱和结节。最可能的诊断是（）。

- A. 酒渣鼻红斑期
- B. 结节性痤疮
- C. 脂溢性皮炎
- D. 酒渣鼻丘疹脓疱期
- E. 酒渣鼻鼻赘期

**正确答案：**D

**参考解析：**酒渣鼻丘疹脓疱期的临床特点是鼻尖出现丘疹脓疱和结节。

65、单选 下列关于斑块型汗孔角化症的描述，错误的是（）。

- A. 多于儿童期发病
- B. 四肢多见
- C. 黏膜不受累

D. 生殖器和臀部的斑块型汗孔角化症多见于男性

E. 生殖器和臀部的斑块型汗孔角化症有明显瘙痒

**正确答案：C**

66、单选 损害与周围皮肤平起的局限性皮肤颜色损害（）。

- A. 风团
- B. 结节
- C. 斑疹
- D. 水疱
- E. 囊肿

**正确答案：C**

67、单选 患者，男，54岁。头皮损害1个月就诊，自觉轻度疼痛。体检：头皮可见1cm×2cm簇集性毛囊性小脓疱伴断发，枕部淋巴结肿大，无发烧，病史中患者无外伤史，平常养宠物。如分泌物培养为犬小孢子菌，请问最符合（）。

- A. 黄癣
- B. 白癣
- C. 黑点癣
- D. 脓癣
- E. 真菌性肉芽肿

**正确答案：D**

68、单选 患者，男性，63岁。因“腋下与腹股沟部位紧张性大疱2个月”而入院。体检：除腋下和腹股沟外，在胸腹部亦可见数个樱桃大小的大疱，基底略红，疱壁紧张，疱液澄清，尼氏征阴性。化验：皮损处直接免疫荧光检查发现基底膜带有IgG和C3呈线状沉积，诊断为大疱性类天疱疮。患者实验室检查下列说法不正确的是（）。

- A. 组织病理检查示表皮下水疱
- B. 电镜检查发现水疱位于透明板内
- C. 直接免疫荧光检查在90%的患者可见IgG呈线状沉积于基底膜带
- D. 盐裂皮肤检查可见IgG沉积在近表皮侧
- E. 10%~80%的患者血清中有抗表皮基底膜带的循环抗体，其滴度与皮损严重程度及病情活动性之间有平行关系

**正确答案：E**

69、单选 患者，男性，72岁。全身反复瘙痒8个月，伴睡眠欠佳。查体：全身皮肤黏膜无黄染，未见明显风团、结节和丘疹，躯干见散在抓痕。为明确诊断，需要进一步询问病史，并需要排除的基础性疾病是（）。

- A. 糖尿病
- B. 慢性胃炎
- C. 高脂血症
- D. 慢性肾功能不全

E. 以上均是

**正确答案：** E

70、单选 皮肤淀粉样变的特点是（）。

- A. 苔藓状淀粉样变多见于中年妇女
- B. 斑片状淀粉样变多见于中年男性
- C. 苔藓状淀粉样变多发生于双侧胫前
- D. 斑片状淀粉样变多发生于腹部
- E. 两型之间相互独立

**正确答案：** C

71、单选 肠病性肢端皮炎主要临床表现不包括（）。

- A. 肢端和腔口周围的皮炎
- B. 脱发
- C. 腹泻
- D. 骨骼发育迟缓
- E. 表情淡漠

**正确答案：** D

72、单选 亚急性湿疹的表现不正确的是（）。

- A. 红肿减轻
- B. 以鳞屑、结痂为主
- C. 可阵发性加重
- D. 渗出增多
- E. 皮损范围缩小

**正确答案：** D

**参考解析：** 亚急性湿疹以鳞屑、结痂为主，渗出减少。

73、单选 关于点滴状副银屑病下列正确的是（）。

- A. 自觉剧烈瘙痒
- B. 病程缓慢，一般数月或1年可自愈
- C. 皮损有浸润性斑块，厚积鳞屑
- D. 老年人多见
- E. 有点状出血现象

**正确答案：** B

74、单选 患者，女性，20岁。因“全身皮疹伴表皮破溃2天”就诊。患者1周前出现上呼吸道感染，多次给予多种抗生素及退热药物，2天前躯干部出现红色点状皮疹，迅速增多、增大，伴大小不等水疱、破溃。查体：T37.6℃，口腔黏膜轻度糜烂，躯干、四肢弥漫性暗红色斑片，伴大小不等松弛性水疱、大疱，尼氏征（+），部分水疱破溃见表浅糜烂面，水疱及破溃面积约占体表面积的40%。根据其临床表现，诊断考虑为（）。

- A. 中毒性表皮坏死松解症

- B. 重症多形红斑
- C. 剥脱性皮炎
- D. 天疱疮
- E. 家族性慢性良性天疱疮

**正确答案：A**

75、单选 利福平治疗正常成人皮肤结核的用量是（）。

- A. 每日口服 400mg
- B. 每日口服 450mg
- C. 每日口服 500mg
- D. 每日口服 550mg
- E. 每日口服 600mg

**正确答案：E**

76、单选 患者，男性，35岁。双侧下肢、臀部泛发性紫癜、血疱、水疱，部分皮疹呈暗红色结节样，少数溃疡，附血痂、见少数萎缩性瘢痕。病程中伴发热，自觉皮疹疼痛明显，血常规正常，尿常规提示隐血++、RBC2~3/HP。该病发病从免疫学角度分析，属于（）。

- A. I型变态反应
- B. II型变态反应
- C. III型变态反应
- D. IV型变态反应
- E. 不定型变态反应

**正确答案：C**

77、单选 患者，女，16岁。全身皮疹4天伴痒，病程中伴有发热，每天最高体温为38.4℃，同时有四肢大关节的轻度酸痛。皮疹时起时消。既往无异常。体检：咽部充血，扁桃体II度肿大。全身大小不等的风团。如果该患者的皮损不容易消退，且消退后遗留瘀斑或色素沉着斑，应考虑下列哪类疾病（）。

- A. 变应性血管炎
- B. 荨麻疹性血管炎
- C. 药疹（荨麻疹型）
- D. 慢性荨麻疹
- E. 急性荨麻疹

**正确答案：B**

78、单选 患者，男，38岁。包皮溃破伴疼痛5天。既往无类似发作史。体格检查：包皮内板见多个针帽大小的浅溃疡，呈群集排列。该患者诊断应首先考虑（）。

- A. 硬下疳
- B. 扁平湿疣
- C. 软下疳

- D. 性病性淋巴肉芽肿
- E. 生殖器疱疹

**正确答案：** E

79、单选 下列皮肤病通常可自行消退的是（ ）。

- A. 蓝痣
- B. 太田痣
- C. 伊藤痣
- D. 蒙古斑
- E. 皮内痣

**正确答案：** D

80、单选 下列肿瘤早期损害与鳞癌不易鉴别的是（ ）。

- A. 基底细胞癌
- B. 表皮囊肿
- C. 脂溢性角化病
- D. 角化棘皮瘤
- E. 无黑素恶性黑素瘤

**正确答案：** D

81、单选 女性，50岁。因面部出现水肿性紫红色斑伴四肢肌肉酸痛无力半年，吞咽困难10余天就诊。查体发现双手指伸侧对称分布扁平紫红色鳞屑性丘疹，甲周可见毛细血管扩张及瘀点。最可能的诊断为（ ）。

- A. SLE
- B. 皮肌炎
- C. 系统性硬皮病
- D. 重症肌无力
- E. 混合性结缔组织病

**正确答案：** B

82、单选 局部多汗症的临床特点不包括（ ）。

- A. 手足皮肤湿冷
- B. 多汗部位常见皮肤浸渍发白
- C. 多伴有足臭
- D. 局部皮肤易过敏
- E. 易患冻疮

**正确答案：** D

83、单选 我国头部白癣常见的致病菌是（ ）。

- A. 许兰毛癣菌
- B. 紫色癣菌
- C. 白色念珠菌
- D. 红色毛癣菌

E. 犬小孢子菌

**正确答案：** E

84、单选 患者，男性，41岁。上背部及双臂外侧其褐色苔藓样皮疹伴痒1年。1年前患者上背部始出现褐色针头大小的丘疹，瘙痒明显，用抗过敏药治疗能缓解症状，但皮疹继续增多，密集成片，丘疹顶端出现苔藓样改变。皮损组织病理：角化过度，棘层增生肥厚，皮突延长增宽，乳头和真皮上部见嗜红性团块状物质，并见色素失禁现象。该患者应诊断为（）。

- A. 神经性皮炎
- B. 血管萎缩性皮肤异色症
- C. 融合性网状乳头瘤病
- D. 皮肤淀粉样变
- E. 黑变病

**正确答案：** D

**参考解析：**皮肤淀粉样变系指淀粉样蛋白沉积于正常的皮肤组织中而不累及其他器官的一种慢性皮肤病。苔藓样淀粉样变最常见，发病年龄不限。典型皮损为发生于胫前、呈正常肤色到黄褐色的丘疹，大小1~3mm，表面常有少许鳞屑，顶端往往过度角化和粗糙；丘疹密集成片但常不融合，自觉剧痒。有时丘疹沿皮纹呈念珠状排列颇具特征性。也可融合成斑块，表面呈疣状与肥厚性扁平苔藓或慢性单纯苔藓相似，但仍可辨认出斑块。本病临床上应与神经性皮炎、结节性痒疹、肥厚性扁平苔藓、炎症后色素沉着等鉴别。组织病理上应与胶样粟丘疹、皮肤黏膜透明变性、卟啉病鉴别。

85、单选 患者，男，23岁。尿道分泌物伴尿道刺痒3天。发病10天前有不洁性交史。体格检查：尿道口轻度红肿，可挤出少量乳白色稀薄分泌物。该患者采用的下列治疗方案中比较合适的是（）。

- A. 红霉素 2g，一次性顿服
- B. 米诺环素 100mg，每日2次，连续1~2周
- C. 左氧氟沙星 400mg，一次性顿服
- D. 头孢曲松 1g，肌肉注射一次
- E. 头孢拉定 500mg，每日4次，连续1~2周

**正确答案：** B

86、单选 匍行疹的最常受累部位是（）。

- A. 手
- B. 大腿
- C. 小腿
- D. 足
- E. 躯干

**正确答案：** D

87、单选 鳞状毛囊角化病的治疗，不正确的是（）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/845122122332011203>