

手足外科急救训练营考核试题

一、单选题

1.在抢救心搏骤停患者时，医生已完成气管插管，气囊充气并确认插管位置正确，胸外按压持续进行中。在接下来的通气操作中，下列描述正确的是（） [单选题]。

- A.避免高浓度给氧
- B.每次通气可见胸起，通气频率越快越好
- C.每次通气可见胸起，通气频率越慢越好
- D.30次胸外按压后，给予2次通气
- E.每5~6秒钟给予一次通气，胸外按压不停歇 **V**

2.当疑似急性心肌梗死患者发生心搏骤停时，医生的首次口头医嘱最有可能的是立即静脉注射（） [单选题]。

- A.阿托品 1mg
- B.胺碘酮 300mg
- C.利多卡因 100mg
- D.肾上腺素 1mgV
- E.异丙肾上腺素 1mg

3.如果患者存在舌后坠，拟置入口咽气道管，下列叙述正确的是（） [单选题]。

- A.可用于清醒或半清醒的患者

B.适用于意识丧失.无咳嗽和咽反射的患者 ✓

C.应用的目的是将舌推至咽后部

D.可置于舌侧方,从而将舌推向一例

E.不能与球囊-面罩装置一起应用

4.引起心搏骤停的“5Hs”病因中不包括() [单选题]。

A.低钠血症 ✓

B.低血容量

C.低氧血症

D.酸中毒

E.低体温

男性,78岁,心搏骤停行心肺复苏成功后,给予电针在脑保护策略;其作用机制不包括? (1.0分) A.

激活腺苷 A1 受体 [单选题] *

B.激活内源性阿片类受体

C.激活内源性大麻素系统

D.提高机体超氧化物歧化酶 ✓

E.HSP70 表达增强

6.淡水淹溺者血浆电解质变化() [单选题]。

A. | 1/2血钠

B.高血钾

C. | 1/2血钙

D.低钠血症 ✓

7. 海水淹溺者补液不可以用（） [单选题]。

A. 葡萄糖溶液

8. 低分子右旋糖酐

C. 血浆

D. 生理盐水 ✓

8. 人体不同组织电阻不同，由大到小依次为（） [单选题]。

A. 骨. 皮肤脂肪肌肉 ✓

B. 皮肤脂肪肌肉. 骨

C. 皮肤. 肌肉. 脂肪骨

D. 肌肉. 脂肪. 皮肤. 骨

9. 对溺水所致呼吸心搏骤停者，其紧急处理措施是（） [单选题]。

A. 倒水

B. 呼吸兴奋剂的应用

C. 心内注射肾上腺素

D. 人工呼吸和胸外心脏按压 ✓

E. 皮质激素的应用

10. 热射病的典型三联征是（） [单选题]。

A. 头痛. 高热. 呕吐

B. 高热. 无汗. 意识障碍 ✓

C. 高热. 肌肉痉挛. 意识障碍

D. 头痛. 高热. 意识障碍

E. 高热. 无汗. 头

11.中心静脉压监测测量（）压力，反应的（）负荷（） [单选题]。

- A.腔静脉与左心房交接处.左心收缩前
- B.腔静脉与右心房交接处.右心收缩前 ✓
- C.腔静脉与左心房交接处.左心舒张前
- D.腔静脉与右心房交接处.右心舒张前

有创动脉压监测时间不宜超过（） [单选题]。

- A.3天
- B.5天
- C.7天
- D.10天

13.有创动脉压监测时，换能器应放置在（） [单选题]。

- A.腋前线第四肋间
- B.腋中线第四肋间 ✓
- C.腋后线第四肋间
- D.锁骨中线第四肋间

14.挠动脉穿刺进行有创动脉压监测前，需做Allen实验的目的（） [单选题]。

- A.挠动脉循环情况
- B.尺动脉循环情况 ✓
- C.肱动脉循环情况
- D.腋动脉循环情况

15.叹息式呼吸可见于（） [单选题]。

- A.神经质 ✓

B.咳嗽无力

C.颈胸椎疾病

E.胸腔肿瘤

16. 点头式呼吸由于（）所致（） [单选题]。

A.呼吸道大量分泌物

B.胸锁乳突肌收缩 ✓

C.过度疲劳

D.胸膜炎

E.胸腔肿瘤

17. 鼾音呼吸主要见于（） [单选题]。

A.呼吸道大量分泌物 ✓

B.胸锁乳突肌收缩

C.过度疲劳

D.胸膜炎

E.胸腔肿瘤

18. 潮式呼吸是指（） [单选题]。

A.是一种交替出现的阵发性的急促深呼吸及此后出现的一段呼吸暂停 ✓

B.患者呼吸期间可闻及大水泡音

C.呼吸运动浅促，带有弹性

D.胸锁乳突肌收缩所致 E.吸气时下须向上移动，呼气时下须重返原位

19. 气道压指（） [单选题]。

A.气道开口压与胸膜腔压之间的差值

B.指胸膜腔压与体表压力的差值

C.呼吸运动过程中，所需克服的整体压力

D.气道开口处的压力 ✓

E.反应呼吸肌吸气力量的指标

20 .脑血栓形成的常见病因是（） [单选题]。

A.高脂血症

B.动脉粥样硬化?口动脉炎 ✓

C.糖尿病

D.房颤

E.细菌性心内膜炎

21 .蛛网膜下腔出血最常见的病因是（） [单选题]。

A.情绪激动

B.外伤

C.脑动脉瘤 ✓

D.脑动脉炎

E.脑动脉畸形

22 .关于脑梗死的叙述，正确的是（） [单选题]。

A.发病年龄多为 60 岁以下

B.活动中或情绪激动时发病

C.常有头痛. 呕吐. 嗜睡. 打哈欠等高颅压症状

D.多为均等性偏瘫

E.CT 检查脑实质内低密度病灶 ✓

23 .动脉瘤性蛛网膜下腔出血的典型表现是（） [单选题]。

A.突发异常剧烈全头痛 V

B.恶心.呕吐

C.偏瘫

D.吞咽困难

E.眩晕

24 .高血压病最常见的死亡原因是（） [单选题]

A.脑血管意外 ✓

B.心力衰竭

C.心律失常

D.主动脉夹层

E.冠状动脉综合征

25 .不稳定型心绞痛的危险程度分级，对中危组病人的描述正确的是（） [单选题]。

A.发作时 ST 段下移 $\leq 1\text{mm}$

B.胸痛间期心电图正常或无变化

C.有静息心绞痛或绞死性心绞痛 V

D.就诊前 48 小时内反复发作

E.静息心绞痛一过性 ST 段变化 ($>0.05\text{mV}$)

26 .大咯血患者发生窒息时，首要的护理措施是（） [单选题]。

A.止血

B.输血

C.吸氧

D.心理安慰

E.保持气道通畅 ✓

支气管哮喘急性发作时，控制症状首选（） [单选题]。

A.02 受体激动剂 ✓

B.糖皮质激素

C.抗胆碱能药物

D.茶碱类

E.肥大细胞膜稳定剂

临床上最常见的急性肺栓塞是（） [单选题]。

A.脂肪栓塞

B.羊水栓塞

C.空气栓塞

D.肺血栓栓塞 ✓

E.急性肺水肿

29.急性心肌梗死与心绞痛心电图鉴别最有意义的是（） [单选题]。

A.ST 段抬高 ✓

B.病理性 Q 波

C.ST 段压低

D.T 波高尖

E.T 波倒置

30.对于神经系统评估可采用 AVPU 的方法，其中 V 代表（） [单选题]。

A.清醒

B.对语言刺激有反应 ✓

C.对疼痛刺激有反应

D.对疼痛刺激无反应

31.对于神经系统评估可采用 AVPU 的方法，其中 P 代表（ ） [单选题]。

A.清醒

B.对语言刺激有反应

C.对疼痛刺激有反应 ✓

D.对疼痛刺激无反应

32.对于神经系统评估可采用 AVPU 的方法，其中 U 代表（ ） [单选题]。

A.清醒

B.对语言刺激有反应

C.对疼痛刺激有反应

D.对疼痛刺激无反应，

33. RTS（修正的创伤记分）适用于（ ），是目前较常采用的创伤严重度评分（ ） [单选题]。

A.院前 ✓

B.急诊

C.ICU

D.普通外科

34. VIPCO 抢救程序中 V 指（ ） [单选题]。

A.保持呼吸道通畅. 通气和充分给氧 ✓

B.迅速建立 2 条及以上静脉通路，输液. 输血. 扩容

C.监测心电及血压，及时发现和处理休克

D.控制出血普通外科 E.急诊手术治疗

35. VIPCO 抢救程序中 I 指 () [单选题]。

A.保持呼吸道通畅. 通气和充分给氧

B.迅速建立 2 条及以上静脉通路, 输液. 输血. 扩容 ✓

C.监测心电及血压, 及时发现和处理休克

D.控制出血普通外科 E.急诊手术治疗

36.贯通伤指 () [单选题]。

A.既有入口又有出口 ✓

B.只有入口没有出口

C.切割伤

D.刺伤

37. 起搏器治疗术中, 并发症不包括 () [单选题]。

A.心脏穿孔

B.空气栓塞

C.囊袋血肿 ✓

D.锁骨下动静脉瘘

E.心律失常

38.你接到一个紧急求助电话赶到现场, 见一成年患者躺在路边, 没有意识, 颈部、胸部可见挫伤痕, 你在为患者摆放复苏体位、打开气道等操作时应首先注意什么 () [单选题]。

A.将手指放在他的嘴里, 向前推下颌

B.双手固定头部

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/845133211241011102>