

护理三基考试总结

第一篇：护理三基考试总结

三基考核总结

为进一步提高全院医疗人员的基本理论及基础知识，提升医疗工作水平，提高服务质量，按照年初制定的工作计划，护理部于2013年3月进行第一季度护士“三基”理论考试。

本次考试围绕区三基考试的考核内容，旨在让护士平时多些练习机会。与以往不同的是，本次考试的考核对象中，护理人员考试情况汇总分析如下：

1、考试题型结构为为：单选、多选。

2、根据考试成绩结合考场观察评价，大部分护理人员学习态度认真。同时仍存在如下问题，由于医院医务人员数量紧张，临床任务重，忽略了学习，或有时休息不足，没有时间充分学习。

根据上述存在问题，我们提出如下改进措施。加强对新分配人员的管理，理论联系实际，采取多种方式督促进行学习，提高专业理论水平；对个别有能力但未下工夫复习者，加大奖惩力度，使医务人员树立荣誉感；营造良好的学习氛围，巩固三基和相关专科知识，提高医务人员整体素质，提高医疗服务质量。

通过行之有效的“三基”训练与考核，护理人员的“三基”水平和临床工作能力有了明显的提升，全院护理人员“三基”培训合格率达到96%，医疗质量和医疗安全的核心制度得到有效落实，进一步夯实了医院的基础医疗质量，为医院赢得了良好的社会声誉。

护理部

2013-7

第二篇：护理三基考试（范文）

护理三基考试

11. 人体在运动时产热的最主要器官是 ()a 脑

b 肝

c 心脏

d 骨骼肌

12. 使用甘露醇时错误的一项是 ()

a 静滴时不与其他药物混合使用

b 心功能不全及急性肺水肿病人禁用

c 可用作肌肉注射

d 密切观察病人的血压、脉搏和呼吸 以防出现心功能不全.以下哪类病人须处于被迫卧位 ()

a 昏迷病人 b 瘫痪病人 c 支气管哮喘急性发作病人

d 极度衰弱病人

科室

姓名

得分

一、填空题 每空 1 分 共 20 分 ,慢性支气管炎最常见的并发症是。2 ,预防全麻病人发生误吸的主要措施是。3 ,心脏病病人用力排便可能引起的严重意外。4 ,急性心肌梗死的抢救原则

。5, 颅内压增高三大主要临床表现是

。6 ,胸外伤病人急救处理原则是

。7 ,胃大部分切除术后

即可拔除胃管。8 ,脑血栓形成最常见的病因。9 ,咯血窒息病人的第一步骤。 ,脱水的常见主要原因是和。

二、单项选择题 每题 1 分 共 30 分

1.继续护理学教育是 ()a 终身性护理学教育 b 护理学历教育

c 规范化专业培训 d 护理知识培训

2.处理护理纠纷时应做到 ()a 实事求是

b 以病人利益为中心

c 以护士利益为中心

d 以医院利益为中心

3.护患沟通中对建立良好第一印象至关重要 ()a 自我介绍

b 注意外在形象

c 记住病人姓名 d 介绍护理单元

4.护患交谈中护士的语言应除外 ()a 运用医学术语

b 通俗

c 简明

d 易懂

5.关于呼吸机应用时出现低压报警的常见原因不正确的是:()6.a 呼吸机内有水

b 呼吸机管道脱离

c 气管导管的气囊漏气

d 呼吸机管道破裂 6.阑尾位于 ()a 左腹股沟区 b 右腹股沟区

c 左外侧区

d 右外侧区

7.女性腹膜腔的最低部位是 ()a 网膜囊

b 膀胱子宫陷凹

c 直肠子宫陷凹

d 肝肾隐窝

8.对女性尿道的描述 错误的是 ()a 窄

b 短

c 直

d 后方紧临肛门且易发生逆行性尿路感染

9.当给病人大量输液时应该输入 ()a 等渗溶液

b 低渗溶液

c 高渗溶液

d 等渗或低渗溶液

10.心脏的正常起搏点位于 ()a 窦房结

b 房室结

c 房室交界

d 心房肌

14.应采取中凹卧位的病人是 ()

a 胸部手术后病人 b 胃切除术后病人

c 休克病人 d 十二指肠引流后病人

15. 少尿是指 24 小时尿量少于 ()

a 100ml

b 200ml

c 300ml d 400ml 16 肠道梗阻病人的大便可呈: ()

a 黑色

b 暗绿色

c 暗红色

d 白陶土色 以下对留置导尿管病人实施的护理措施正确的一项是 ()

a 每日更换导尿管

b 每周用消毒液清洗尿道口两次 c 鼓励患者喝水

倒尿液时导尿管应高于耻骨联合

18. 王某下楼时不慎踝关节扭伤 2 小时后来医院就诊 正确的处理方法是: () a 局部用热水袋

b 局部用冰袋

c 局部按摩 d 冷热敷交替使用

抢救急性乙醇中毒较理想的药物有 () a 亚甲蓝

b 纳洛酮

c 安易醒

d 阿托品. 确采集痰标本的时间是 ()

a 输液前

b 痰液较多时

c 临睡前

d 清晨

21. 大咯血病人首要的护理措施是 ()

a 保持呼吸道通畅 b 高浓度氧疗

c 防止大出血休克 d 使用呼吸兴奋剂. 腔闭式引流护理措施中错误的是 ()

a 定期挤压引流管 保持通畅 b 限制翻身 以减轻疼痛 d 协助患者采取半卧位 有利于呼吸. 急性心力衰竭急救时是给氧流量为 ()

a 1—2L/min

b 2—4L/min

c 4—6L/min d 6—8L/min 24. 发生心室颤动是最主要的处理措施是 ()

a 静脉注射利多卡因

b 电复律

c 电除颤 d 安装起搏器

25. 关胃镜检查术前准备的描述错误的是 ()

a 检查前禁食、禁水 6 小时 b 检查前 24 小时内避免做消化道钡餐透视

c 幽门梗阻病人禁食 24 小时

d 取左侧卧位. 肾病综合症严重水肿患者禁忌 () a 静脉穿刺

b 肌肉注射

c 口服补液

d 翻身

c 倾

c 每日更换引流瓶

27. 糖尿病患者运动宜选择的时间为 () a 在外源性胰岛素作用高峰时期

b 餐后 1—1.5 小时

c 空腹

d 餐前 1—1.5 小时

28. 腰椎穿刺后病人的体位是 () a 去枕仰卧位 6—8 小时

b 头部垫软枕 抬高约 15—30 度

c 头偏向一侧 口部稍向下

d 去枕平卧 24 小时

29. 腹部术后行胃肠减压的病人 拔管的依据为 () a 术后 48 小时

b 术后 72 小时

c 肛门有排气 d 术后 46—47 小时

30. 小儿高热惊厥的紧急处理错误的是 () a 惊厥发作时立即搬到抢救

救室进行抢救

b 及时清除口、鼻、咽分泌物保持呼吸道

c 密切观察生命体征 d 专人守护 防止坠床和碰伤

三、多项选择 每题 1 分 共 10 分

1、最常见的咯血原因不正确的是()A、支气管扩张 B、慢性支气管炎

C、肺结核

D、支气管肺癌

E、风湿性心脏病二尖瓣狭窄

2、急性肺水肿的护理措施正确的是()A、按医嘱静脉注射西地兰

B、取坐位 两腿下垂

C、持续低流量吸氧

D、遵医嘱吗啡皮下注射 E、遵医嘱静脉注射氨茶碱

3 以下哪些是发生压疮的高危人群 ()A 水肿病人 B 营养不良者 C 大小便失禁者

D 烦躁患者 E 咳嗽病人

下列哪些情况发生瞳孔散大 ()A 颅内高压 B 有机磷中毒

C 吗啡中毒

D 阿托品中毒 E 临死状态

5 促进排痰的措施有 ()A 雾化吸入

B 胸部叩击

C 体位引流

D 气道湿化 E 机械吸痰消化性溃疡的治疗原则有 ()A 消除病因

B 缓解疼痛

C 促进愈合 D 防止复发

E 避免并发症

7 急性胰腺炎的临床表现有 ()A 急性腹痛

B 发热

C 恶心

D 呕吐

E 血和尿淀粉酶升高

8 慢性肾炎病人的饮食应为 ()A 高蛋白

B 低蛋白

C 优质蛋白

D 低磷

E 高磷

9 糖尿病的慢性并发症有 ()A 大血管病变 B 酮症酸中毒

C 微血管病变

D 白内障

E 糖尿病足

10 缺水病人的观察内容有 ()A 体温

B 脉搏

C 呼吸

D 血压

E 尿的改变

四、判断题 10 分

每题 1 分

1 口服葡萄糖耐量试验的方法是空腹抽血 1 次口服葡萄糖 75G 后分别在 30 分钟、60 分钟、120 分钟、180 分钟

时各抽血 1 次测血糖及胰岛素。 ()

2、为了增加心输出量 心脏按压时间应略长于放松时间。 ()

3、预防切口感染最关键的措施是严格执行无菌操作 ()

4、烧伤病人感染创面处理时应完全暴露 ()

5、术前常规胃肠道准备应术前 8 小时禁食、2 小时禁水

6、肠痿非手术治疗期引流的最佳体位是低半卧位。 ()

7、肠梗阻病人有排便困难的症状 ()

8、肺癌的主要临床表现是咯血 ()

9、关节盂空虚是关节脱位的特有体征 ()

10、黄体酮是药物流产最常用的药物 ()五 简答题 每题 10 分

共 30 分

- 1.给患者作保留灌肠 须注意什么?
- 2.护士如何配合急性肺水肿的抢救工作
- 3.简述青霉素过敏急救措施

第三篇：护理三基考试题目

护理三基考试

一、填空题（每空一分，共计 30 分）

- 1.洗手前手都不能佩戴。
- 2.一般洗手应在直接接触病人和无菌操作 进行。3.发现体温和病情不符时，应当 体温。
- 4.铺好的无菌盘应注明铺盘的、。5.使用无菌钳时不能低于身体的 部。
- 6.使用无菌容器时，不可污染 容器边缘及。7.为患者测血压时应采取坐位或卧位，保持血压计零点，肱动脉与心脏同一。
- 8.极度消瘦的患者不宜测。9.补钙时不宜同时吃。
- 10.通常所说的药物“常用量”是针对 岁的成人而言。11.青霉素半衰期为。
- 12.护士在做静脉输液时，要先评估患者穿刺部位的、情况。13.护士在做静脉穿刺时，使针与皮肤呈 角。
- 14.对高热病人用冰袋降温时，应将冰袋置于病人的。
- 15.每次判断患者颈动脉搏动和自主呼吸时，判断的时间不得超过。
- 16.胸外心脏按压的禁忌症有、、。17.患者有颈椎损伤时，若翻身方法不当，可致 麻痹而死亡。18.患者侧卧时，导尿管应置于患者 侧。
- 19.更换胸腔引流瓶时，应先 以防止 进入。20.胸腔闭式引流术后，成人体位应常保持 此体位有利于 和。

二、单选题（每题两分，共计 40 分）

- 1.使用无菌持物钳时下列哪项有误（）。A 取无菌器械 B 传递无菌器械 C 取用无菌敷料 D 传送夹取油纱布 E 传递无菌敷料
- 2.铺无菌盘的目的是（）。

- A 无菌布铺在清洁干燥的治疗盘内 B 形成无菌区 C 放置无菌物品
D 供实施治疗时使用 E 以上均是

3.不同手术患者留置导尿管的时间不同，颅脑手术患者导尿管保持时间一般为（）天。

A 5-7 B 1-3 C 3-5 D 7-9 E 9-11 4. 静脉痉挛导致液体不滴时应（）。

A 更换针头另选血管穿刺 B 调整针头位置 C 抬高输液瓶的位置 D 局部热敷 E 适当变换肢体位置

5.静脉输液持续（）小时以上者，需每天更换输液瓶和输液管。A 12 小时 B 24 小时 C 6 小时 D 18 小时 E 48 小时

6.不属于静脉输液的并发症有（）。A 发热反应 B 肺水肿 C 空气栓塞 D 右心衰竭 E 静脉炎

7.患者出现呼吸和心搏骤停，下列措施哪项错误（）。A 护士立即通知医生 B 护士立即派人通知医生

C 护士不得离开患者 D 立即人工呼吸 E 立即胸外心脏按压 8.心脏复苏的有效特征是（）。

A 瞳孔散大 B 收缩压在 4kpa 以上 C 甲床面色、口唇转红 D 意识转为清晰 E 尿量每小时达到 3ml 9.应用简易呼吸器将简易呼吸连接氧气，氧流量为下列哪项（）A 8-10 升/分 B 6-10 升/分 C 6-8 升/分 D 4-6 升/分 E 2-4 升/分

10.管切开患者所用吸痰盘应（）更换一次 A 24 小时 B 12 小时 C 每班 D 4 小时 E 8 小时

11.气管插管吸痰时，为避免缺氧每次吸痰时间最长不能超过（）A 10 秒 B 15 秒 C 20 秒 D 25 秒 E 30 秒 12.护患沟通的理想距离是（）。

A <50cm B 50-100cm C 1-4M D >4M 13. 护理评估资料来源于（）

A 病人 B 病历 C 医生 D 实验检查 14.青霉素过敏试验阳性患者，应将结果

A 医嘱单 B 注射单 C 床头卡 D 体温单 E 以上都是 15.以下哪项不是胸外按压的并发症（）。A 胸骨、肋骨骨折 B 吸入性肺炎 C 肝脾裂伤 D 血压 >6mmHg E 气胸

16.关于补液下列哪项是错误的（）。

A 先盐后糖 B 先快后慢 C 宁多勿少 D 见尿补钾 E 先晶后胶

进行破伤风抗青霉素脱敏注射时，每次注射间隔时间是（）
A10 分钟 B15 分钟 C20 分钟 D25 分钟 E30 分钟 18.病房发现患者跌倒，值班护士最先应做什么处理（）

A 无陪护时先通知家长 B 报告护理部 C 立即将患者扶起来 D 评估跌倒后患者病情 E 跑去通知医师 19.血氧饱和度的正常值为（）

A75%-100% B85%-100% C90%-100% D95%-100% E93%-100% 20.一般留置导尿管的患者常规多久更换一次导尿管（） A 1 周 B 2 周 C 3 周 D 4 周 E 3 天

三、判断题（每题 2 分，共计 20 分）

- 1.一般情况下，人脑耐受循环停止的临界时限为 8-12 分钟。（）
- 2.呼吸增快常见于颅内压增高。（）
- 3.运动劳累，情绪波动及疼痛都可以使血压增高，但以收缩压升高为主，舒张压多无明显变化。（）
- 4.牙关紧闭着可用开口器强行取其张口。（）
- 5.为女患者导尿，如不小心插入阴道，可拔出后重插。（）
- 6.夹取油纱布须用无菌持物钳。（）
- 7.在湿化瓶里盛 1/2-1/3 的无菌用水，装好氧流量表并连接鼻导管，处于备用状态。（）
- 8.深部的伤口可用生理盐水冲洗，不必放置引流物。（）
- 9.急诊采血 E-4A 时，无须特殊要求随时可采用。（）
- 10.医院各区域工作人员的平均不得检出致病微生物。（）

四、问答题（十分）静脉炎常见症状有哪些？

肛肠科三基训练护士习题 6月份 姓名 得分

1. 危及急性炎症性脱髓鞘性神经病的病人生命体征最常见的情况是 DA 四肢瘫痪 B 发热 C 吞咽困难 D 呼吸困难 E 心动过速 2. 脑出血病人出现昏迷加深与瞳孔不等大，提示 BA 丘脑出 B 脑疝形成 C 脑室出血 D 血流入蛛网膜下腔 E 中脑出血 3. 癫痫大发作最具有特征的表现是 EA 发作性偏瘫 B 发作性肢体麻木 C 发作性意识障碍 D 发作性头痛 E 发作性强直阵挛抽搐及意识障碍

4. 发作性脑疝时，以下哪项抢救是错误的 EA 使用高渗脱水药 B 脑室穿刺引流 C 减少脑血流及降低神经细胞耗氧量 D 颅压监测 E 改变体位

. 以下哪项不是确认蛛网膜下腔出血的指征 E A 剧烈头痛 B 呕吐 C 脑膜刺激性阳征 D 脑脊液为均匀的血性液体 E 意识障碍 6. 脑疝急救首选 A A205 甘露醇 B 地塞米松 C 苯巴比妥钠 D 呋塞米 E 地西洋 7. 脑室穿刺引流术一般每天引流脑脊液量不超过 E A 100ML B200ML C300ML D400ML E500ML 8. 幻觉是 B A 对客观事物歪曲的知觉 B 没有客观事物作用于感官时出现的知觉体验 C 一种想象的知觉体验 D 客观事物去除后留下的印象 E 一种在幻梦中的感觉 9. 妄想是 C A 无法摆脱反复出现的观念 B 一种迷信观念 C 一种在病理基础上产生的, 不能被纠正的, 错误的信念和判断 D 一种成见 E 暂时不能实现的幻想 10. 关于癔症, 下列何种说法不正确 E A 发病, 症状和病情均与病人的病前性性格特征有关 B 发病有明显的心理因素 C 感觉, 运动和意识改变缺乏相应的器质性基础 D 其症状表现具有做作, 夸大, 富有情感色彩, 可由暗示而诱发或终止 E 最有效的治疗方法是镇静 11. 下列哪种病人的可能性大

A 抑郁症 B 焦虑症 C 严重的神经衰弱 D 精神分裂症 E 抑郁性神经症 12. 应隔离治疗的皮肤病是 C A 带状疱疹 B 盘状红斑狼疮 C 疥疮 D 药物性皮炎 E 丘疹样 13. 湿疹急性期皮疹无糜烂渗液者外搽 D A 硼酸软膏 B 氧化锌油 C 水杨酸软膏 D 炉甘石洗剂 E 氧化锌糊剂 14. 疥疮皮损好发于 E A 头部, 面部和颈部 B 胸背部及腰部 C 四肢伸侧 D 臀部及双下肢, 手掌及足背 E 指缝, 腕部屈侧, 下腹部, 股内侧 15. 天疱疮是 A A 慢性大疱性皮肤, 粘膜疾病 B 细菌性疾病 C 过敏性疾病 D 病毒性疾病 E 传染性疾病 16. 口腔真菌感染漱口液选择 B A 1%-2% 的甲紫溶液 B 1%-3% 碳酸氢钠溶液 C 0.1% 依沙丫啶溶液 D 0.02% 呋喃西林 E 多贝尔溶液

17. 病人张某, 右腰背部皮肤疼痛, 且呈带状排列的群集米粒至黄豆大水泡, 皮损局部治疗应选择 B A 软膏 B 湿敷 C 粉剂 D 酊剂 E 洗剂

18. 不符合皮肤病外用药剂型选择原则的是 C A 急性炎症性皮损, 仅有潮红, 斑丘疹而无糜烂, 选用粉剂或振荡剂 B 有水泡选用湿敷 C 糜烂, 渗出时选用软膏 D 亚急性炎症皮损或选用油剂, 糊剂或乳剂 E

19. 皮肤病最常见的局部自觉症状是 E A 疼痛 B 烧灼感 C 皮疹 D 麻木感 E 瘙痒 20. 老年皮质性白内障的最佳手术期限是 B A 未成熟期 B 成熟期 C 初发期 D 过熟期 E 过成熟期 21. 急性虹膜睫状体炎最重要的局部治疗方法是 C A 1%毛果芸香碱缩瞳 B 抗感染 C 1%阿托品扩瞳 D 使用高渗脱水药 E 抗病毒 22. 沙眼是由哪一种微生物所引起的传染性结膜角膜炎 E A 细菌 B 病毒 C 立克次体 D 螺旋体 E 衣原体 23. 对一位正在出鼻血的病人首先采用的治疗方法是 B A 找出血原因 B 局部止血 C 输血 D 补液 E 全身用止血药 24. 下列哪一种为急性扁桃体炎的主要并发症 A A 扁桃体周围脓肿 B 急性喉炎 C 心肌炎 D 关节炎 E 咽旁脓肿 25. 牙本质过敏的主要临床表现 C A 压痛 B 放射痛 C 激惹性痛 D 牙周持续痛 E 灼痛 26. 下列何项不是阿托品在眼病中的应用 C A 用于治疗虹膜睫状体炎 B 解除睫状肌痉挛 C 用于治疗青光眼 D 降低眼内血管壁的通透性 E 防止虹膜与晶状体粘连

27. 下列哪项不是滴眼药水的注意事项 C A 滴眼药水前应洗净双手, 防止交叉感染 B 易沉淀的混悬, 滴药前要充分摇匀 C 同时滴数种药时, 两药之间不需间隔 D 严格执行查对制度, 防止滴错药 E 正常结膜囊容量为 0.02ML, 点眼药每次 1 滴即可

28. 急性化脓性中耳炎早期最有效的处理是 B A 抗生素全身应用及滴耳 B 抗生素全身应用 C 抗生素溶液滴耳 D 2% 酚甘油滴耳 E 咽鼓管吹张

29. 关于急性鼻窦炎, 下列哪项是错误的 E A 常为多窦感染 B 全身症状明显 C 头痛重, 有时间规律 D 处理以全身用抗生素为主 E 立即做上颌窦根治术及筛窦开放术 30. 鼻咽癌的处理首先应选择 C A 手术治疗 B 化疗 C 放疗 D 对症处理 E 中药处理 31. 急性喉梗阻的主要症状是 A A 吸气性呼吸困难 B 喉痛 C 呼气性呼吸困难 D 吞咽困难 阵发性咳嗽与呕吐 32. 舌后坠引起的呼吸困难主要的抢救措施是 C A 清除口腔分泌物 B 头低侧卧位 C 将舌牵向口外 D 环甲膜穿刺 E 气管切开 33. 青春期龈炎的主要病因 E A 刷牙习惯不良 B 牙错合拥挤 C 口呼吸习惯 D 戴各种正畸矫治器 E 青春期内分泌特别是性激素的改变

下列哪种维生素缺乏最易引起牙龈出血 D A 维生素 A B 维生素 B1 C 维生素 B2 D 维生素 C E 维生素 E 35. 下述哪项不属“五味”的内容 E A 酸 B 苦 C 甘 D 辛 E 甜 36.正常的舌色为 D] A 淡白舌, 红舌 B 紫舌 C 淡黄舌 D 淡红舌 E 绛舌 37.何谓中药的四气 C A 是指中药的四种特殊气味 B 寒凉药具有散寒, 助阳的作用 C 是指中药的寒, 热, 温, 凉四种药性 D 是指中药的辛, 咸, 甘, 苦四种味道 38. 中医学的治疗大法不包括 E A 汗, 吐 B 温, 清 C 下, 和 D 消, 补 E 调, 涩 39. 顺从疾病假象而进行护理的方法为 B A 正护法 B 反护法 C 扶正法 D 祛邪法 E 标本同护法 40. 护理吐血病人时, 下列哪项不相宜 E A 静卧少动大会 B 情绪安定 C 忌辛辣食物 D 食易消化食物 E 多饮热水 41.康复医学是一门 D A 研究残疾人和病人的行为学 B 研究残疾人和病人的社会心理学 C 是一门语言矫治学 D 是一门有关促进病, 伤, 列者恢复身体, 精神和社会生活功能为目标的学科 E 是一门有关促进残疾人恢复的特殊教育学 42. 康复的对象是 C A 截瘫, 偏瘫病人 B 智力低下, 语言障碍的病人 C 各种功能障碍的病人 D 心肺功能障碍的病人 E 脊髓灰质炎, 精神病人 43.下列哪项不是康复护理的主要内容 D A 改善功能障碍的护理 B 功能训练的护理 C 心理护理 D 替代护理 E 专业技术护理 44. 高压氧治疗是一氧化碳中毒的主要机制是 A A 血液物理溶解氧量增加 B 血液中结合氧量增加 C 血液中血红蛋白增加 D 氧和血红蛋白的亲合力增加 E 机体的摄氧能力增强 45.高压氧的绝对禁忌症之一是 D A 急性鼻窦炎的病人 B 有颅骨缺损者 C 妇女月经期与妊娠期 D 未经处理的气胸 E 活动性肺结核

46、白细胞计数在什么情况下不增高 D A 新生儿

B.情绪激动

C 激烈运动

D 睡眠

E 妊娠分娩时

47、影响尿相对密度测定的药物是 D A、维生素 C

B、阿司匹林

C、青霉素

、放射造影剂

E 维生素 B2

48、浓盐酸不能用作尿中何种检验的防腐剂 E A、17-酮类固醇

B、17-羟皮质类固醇

C、VMA

D、儿茶酚胺

E、细胞计数

49、关于饮食问题，下列哪项是错误的 C A、进餐可使血液中很多化学成分发生变化 B、进餐可使血糖浓度增高 C、进餐可使转氨酶降低

D、营养不足可影响血中总胆固醇浓度 E、长期饥饿可使尿酮体试验出现阳性

50、口服胆囊造影宜选择下述哪种对比剂 B A、碘化油

B、典番酸

C.碘苯酯

D、碘卡明

E、碘化钠

51、与体层摄影相比较，CT扫描最大的优点是 A A、密度分辨率高

B、空间分辨率高

C、对比度高

D、操作方法简单

E、病人无痛苦

52、枕骨骨折的最佳摄片位置是 D A. 气管分叉部

B、颅骨后前位

C、水平侧位

D、汤氏位

E、颅底位

53、左右倾后斜位支气管体层摄影的目的是为了显示 C A、气管分叉部

- 、左、右主支气管
- C、中叶或舌段气管
- D、上叶支气管
- E、下叶支气管

54、正常静脉肾盂造影、肾盂肾盏显影最浓的时间是静脉内注射对比剂后 **D A**、1-2 分钟

- B、3-5 分钟
- C、6-10 分钟
- D、15-30 分钟
- E60-120 分钟

55、正常胆总管的宽度不超过 **B A**、0.5cm **B**、1.0cm

- C、1.5cm
- D、2.0cm
- E、3.0cm

56、肺癌空洞常见于 **A A**、鳞癌

- B、腺癌
- C、大细胞未分化癌
- D、小细胞未分化癌
- E、细支

57、关于股静脉内血栓脱落引起栓塞的叙述，哪一项是不正确的 **B A**、大多数栓塞于肺

- B、都发生出血性梗死
- C、如栓塞于肺动脉主干常引起猝死
- D、伴左心衰时一定发生相应部位的梗死
- E、如有心间隔缺损亦可栓塞于脑

58、炎症的局部病变是 **D A**、组织病变的变性坏死

- B、组织的炎性充血和水肿
- C、红肿热痛功能障碍 **D**、变质、渗出、增生
- E、周围血液中白细胞增多和炎症区白细胞浸润

59、下列哪一项不是上皮来源的肿瘤 **D A**、基底细胞癌 **B**、乳头

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/846135203223010142>