

## N2 级护理人员理论知识测试题库含答案

1、患儿 6 个月。发热 4 天, 出现皮疹 1 天, 有咳嗽、流涕症状, 现初步诊断为麻疹。下列处理措施不恰当的是()

- A、 拉开窗帘保证室内有足够的光线
- B、 加强护理
- C、 给予降温治疗
- D、 监测体温变化
- E、 积极采取措施预防并发症

答案: A

2、心脏停搏最常见的原因是

- A、 冠心病
- B、 电解质紊乱
- C、 酸碱平衡失调
- D、 意外事件
- E、 药物中毒或过敏

答案: A

3、对口服敌百虫中毒的患者, 处理不正确的是

- A、 用清水洗胃
- B、 用生理盐水洗胃
- C、 服用阿托品
- D、 每次注入洗液量 200~250ml
- E、 用碳酸氢钠洗胃

答案: E

4、患儿男, 生后 10 天。主诉“发热 3 天”入院。查体: 体温 38. 8°, 血压 70/50mmHg, 心率 144 次/min。外周血染色体检查, 诊断为唐氏综合征。下列不是此病特征的是(C)

- A、 眼距宽, 眼裂小, 外眼角上斜, 鼻根低平
- B、 常伴心脏畸形
- C、 女性多于男性
- D、 伸舌样痴呆
- E、 婴幼儿期病死率高

答案: C

5、关于宫内节育器的放置时间, 下列哪项不妥()

- A、 月经干净后 3~7 天
- B、 产后 42 天

- C、 剖宫产术后 6 个月
- D、 哺乳期妇女随时可以放置
- E、 人工流产术后立即放置

答案：D

6、关于健康教育与卫生宣教的主要区别的叙述,下列哪项是错误的()

- A、 健康教育的目标是改善对象的健康相关行为
- B、 健康教育已初步形成了自己的理论和方法体系
- C、 健康教育是有计划、有组织、有评价的系统干预活动
- D、 健康教育是简单的、单一方向的信息传播
- E、 健康教育不是作为辅助方法为卫生工作服务

答案：D

7、妇科子宫全切术后阴道残端出血适用的 护理措施是()

- A、 会阴擦洗
- B、 阴道灌洗
- C、 阴道上药
- D、 会阴湿热敷
- E、 坐浴

答案：C

8、下列哪项是授权需遵循的最根本的准则()

- A、 视能授权
- B、 合理合法
- C、 监督控制
- D、 权责对等
- E、 量力授权

答案：A

9、医院有病床 600 张,根据卫生部 1978 年颁布的《综合医院组织编制原则试行草案》,其护理人员最多可配备的数量是()

- A、 252 人
- B、 296 人
- C、 314 人
- D、 367 人
- E、 403 人

答案：D

10、章女士,24 岁。剖宫产分娩一女活婴,向护士咨询其产假应为()

- A、 98 天

- B、 130 天
- C、 120 天
- D、 113 天
- E、 150 天

答案： D

11、 下列哪项是心力衰竭患儿应用强心苷类药物的正确方法 ()

- A、 配药时应用 1ml 注射器精确抽吸药物, 以 0.9% NaCl 稀释
- B、 每次注射前测量患儿心率 1 分钟
- C、 可同时静脉补钙
- D、 给药时, 静脉速度宜快, 最好在 5 分钟内注射完毕, 以提高药效
- E、 禁食含钾高的食物

答案： B

12、 下列哪项不是剖宫产术的适应证 ()

- A、 漏斗骨盆
- B、 初产臀位
- C、 子痫
- D、 畸形胎儿
- E、 临产后出现胎儿宫内窘迫

答案： D

13、 对门诊病人进行健康教育的内容是 ()

- A、 候诊教育、 入院教育、 健康教育处方、 出院教育
- B、 候诊教育、 入院教育、 健康教育处方、 病房教育
- C、 候诊教育、 健康教育处方、 咨询教育、 出院教育
- D、 候诊教育、 健康教育处方、 出院教育、 病房教育
- E、 候诊教育、 随诊教育、 咨询教育、 健康教育处方

答案： E

14、 最古老、 最简单的组织结构类型是 ()

- A、 直线型组织结构
- B、 职能型组织结构
- C、 直线—参谋型组织结构
- D、 分部制组织结构
- E、 团队结构

答案： A

15、 下列哪项是确诊伤寒的依据 ()

- A、 典型伤寒临床表现

- B、 WBC 减少,嗜酸细胞减少
- C、 血培养阳性
- D、 肥达反应阳性
- E、 氯霉素治疗有效

答案: C

16、惊厥持续状态是指

- A、 惊厥持续时间超过 1 小时
- B、 抽搐间期有清醒期
- C、 惊厥持续时间超过 30 分钟,间期有清醒期
- D、 抽搐超过 1 小时,间歇期无清醒期
- E、 抽搐超过 30 分钟,间歇期无清醒期

答案: E

17、李先生,19 岁。洗浴时无意中触及右大腿下端内侧硬性突起,无疼痛,膝关节运动尚可。最可能的诊断是()

- A、 骨肉瘤
- B、 骨软骨瘤
- C、 骨巨细胞瘤
- D、 骨囊肿
- E、 骨化性肌炎

答案: B

18、引起肝性脑病最常见的原因是

- A、 门体分流手术
- B、 原发性肝癌
- C、 妊娠急性脂肪肝
- D、 肝硬化
- E、 严重胆道感染

答案: D

19、肾癌常见症状为()

- A、 活动后血尿
- B、 无痛性、间歇性全程肉眼血尿
- C、 无痛性、间歇性肉眼血尿、终末加重
- D、 尿痛伴全程肉眼血尿
- E、 血尿、脓尿

答案: B

20、以下哪种清洁手术不需预防性应用抗菌药物()

- A、 高龄或免疫缺陷者
- B、 手术范围大, 时间长
- C、 人造血管移植术
- D、 膝软骨摘除术
- E、 人造关节置换术

答案: D

21、 进行低压阴道灌洗时, 灌洗筒距床沿高度应低于()

- A、 30cm
- B、 40cm
- C、 50cm
- D、 60cm
- E、 70cm

答案: A

22、 弛张热, 易合并脓胸、 脓气胸的是

- A、 腺病毒肺炎
- B、 金黄色葡萄球菌肺炎
- C、 急性感染性喉炎
- D、 支气管哮喘
- E、 肺炎链球菌肺炎

答案: B

23、 额叶病变可以引起

- A、 对侧肢体运动和感觉障碍
- B、 共济失调
- C、 记忆力障碍和精神改变
- D、 耳鸣和幻听
- E、 视幻觉

答案: C

24、 心源性水肿最常见的病因是

- A、 左心衰竭
- B、 右心衰竭
- C、 原发性高血压
- D、 心肌肥厚
- E、 心包炎

答案: B

25、 糖尿病酮中毒最常见的检查结果是

- A、 尿糖++++, 酮体阴性
- B、 尿糖++++, 酮体强阳性
- C、 尿糖阴性, 酮体阳性
- D、 尿糖+, 酮体阳性
- E、 尿糖+, 酮体阴性

答案: B

26、原始心脏起循环作用的时间是

- A、 胚胎第 4 周
- B、 胚胎第 8 周
- C、 胚胎第 4~5 个月
- D、 胚胎第 6 个月
- E、 出生后

答案: A

27、关于化脓性关节炎的说法, 下列正确的是()

- A、 多见于年老体弱人群
- B、 关节常成僵直状态, 拒绝活动和检查
- C、 早期关节周围软组织肿胀, 关节间隙变窄
- D、 持续低热、食欲缺乏, 周身乏力
- E、 好发于髋关节和膝关节

答案: E

28、大量放腹水诱发肝性脑病的原因是()

- A、 增加对氨的吸收
- B、 引起代谢性碱中毒, 促使氨通过血-脑屏障
- C、 蛋白质分解, 肠内产氨增多
- D、 脑组织缺氧降低了对氨的耐受性
- E、 降低血氨的代谢

答案: B

29、儿科患者中, 心脏停搏最主要的病因是

- A、 喉痉挛
- B、 气管异物
- C、 严重心律失常
- D、 急性呼吸衰竭
- E、 心力衰竭

答案: D

30、肝硬化腹水产生的最主要原因是

- A、 血清白蛋白降低
- B、 门静脉压力增高
- C、 肾功能不全
- D、 脾功能亢进
- E、 便秘

答案： B

31、 对心脏呼吸骤停高危因素患儿, 能加重或触发它的临床操作不包括()

- A、 呼吸道吸引
- B、 输血
- C、 不适当的胸部物理治疗
- D、 任何形式呼吸支持的撤离
- E、 使迷走神经兴奋性增加的操作

答案： B

32、 化脓性关节炎好发部位是()

- A、 脊柱
- B、 髋部
- C、 肘部
- D、 踝部
- E、 长骨干骺端

答案： B

33、 6个月以后的小儿开始出现的心理反应是

- A、 认生
- B、 反抗
- C、 失望
- D、 否认
- E、 恐惧

答案： A

34、 患者男性, 57岁。患尿毒症, 精神萎靡, 24小时尿量为100ml。患者的排尿状况属于

- A、 正常
- B、 无尿
- C、 少尿
- D、 尿潴留
- E、 尿量偏少

答案： B

35、关于伤寒杆菌的说法,下列哪项是不正确的()

- A、 伤寒杆菌属沙门菌属
- B、 革兰氏染色阳性
- C、 在含胆汁的培养基中生长良好
- D、 产生的内毒素是致病的主要因素
- E、 对热及一般消毒剂敏感

答案: B

36、诊断直肠癌最重要且简便易行的方法是

- A、 血清癌胚抗原 CEA 测定
- B、 大便潜血试验
- C、 直肠指检
- D、 纤维结肠镜检查
- E、 CT 检查

答案: C

37、出现佝偻病初期症状多发生在

- A、 生后 1~2 个月
- B、 生后 3~4 个月
- C、 生后 6~10 个月
- D、 1 岁左右
- E、 2 岁以后

答案: B

38、下列哪项不是被狂犬咬伤后伤口处理的方法()

- A、 及时用 20%肥皂水彻底冲洗伤口
- B、 不断冲洗和擦拭,至少半小时
- C、 力求去除狗涎,挤出污血
- D、 彻底冲洗伤口后给予包扎
- E、 可用免疫血清注射伤口底部

答案: D

39、硬脑膜外血肿最常见的出血来源是

- A、 板障静脉破裂
- B、 挫裂伤的组织血管破裂
- C、 脑膜中动脉破裂
- D、 静脉窦出血
- E、 脑实质血管出血

答案: C



40、脑出血病人急性期头部抬高的主要目的是()

- A、 有利于口腔分泌物的引流
- B、 促进脑部静脉回流
- C、 防止呕吐
- D、 减轻头痛
- E、 防止脑缺氧

答案： B

41、引发皮质醇症病人高血压的原因是()

- A、 高血钠
- B、 高血钾
- C、 高血糖
- D、 低血钙
- E、 低血钾

答案： A

42、患儿9岁。自述夜间肛门瘙痒明显来诊,检查发现患儿肛周有蛲虫卵,诊断为蛲虫病。对该患儿健康教育内容正确的是()

- A、 告知家长勿在家收集虫卵,应及时到医院由专业人员完成
- B、 按照医嘱不定期驱虫治疗
- C、 患儿睡觉时应穿睡裤,戴手套
- D、 患儿内衣裤被褥使用后应弃去
- E、 婴幼儿避免早穿满裆裤,防止交叉感染

答案： C

43、非手术治疗骨结核最重要的措施是()

- A、 药物治疗
- B、 预防截瘫
- C、 减轻疼痛
- D、 加强功能锻炼
- E、 戒烟戒酒

答案： B

44、中心型椎体结核易发人群是()

- A、 10岁以下儿童
- B、 体弱多病的小儿
- C、 婴幼儿
- D、 成年人
- E、 老年人

答案：A

45、月经初潮是指

- A、 月经第 1 次来潮
- B、 月经期的第 1 天
- C、 月经第 1 天的出血量
- D、 两次月经第 1 日间隔的时间
- E、 月经期下腹部的坠胀感

答案：A

46、为增加体内弱碱类物质的排出应给予的抢救措施是()

- A、 催吐
- B、 酸化尿液
- C、 高压氧治疗
- D、 全肠灌洗
- E、 碱化尿液

答案：B

47、下列哪项是确定蛛网膜下腔出血病因诊断最有意义的检查()

- A、 DSA
- B、 腰椎穿刺
- C、 MRI
- D、 CT
- E、 血液生化检查

答案：A

48、关于宫颈原位癌的说法,正确的是

- A、 好发部位为宫颈鳞状上皮区域内
- B、 病变限于上皮层内,基底膜未穿透
- C、 宫颈上皮内瘤样病变即为宫颈原位癌
- D、 与宫颈重度不典型增生无明显区别
- E、 阴道镜检查多能与镜下早期浸润癌相鉴别

答案：B

49、患者女性,47岁。突然神志丧失,呼吸不规则,判断发生心脏停搏的指标是

- A、 血压
- B、 瞳孔散大
- C、 桡动脉搏动消失
- D、 颈动脉搏动消失

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/847030051030006036>