

口腔医学主治医师：口腔内科学必看题库知识点五

1、单选 以下关于牙本质牙骨质界的说法错误的是（）

- A. 距离根尖孔约 0.5~1.0mm
- B. 是根管最狭窄处
- C. 是牙髓与牙周组织的分界
- D. 在老年患牙中此处距根（江南博哥）尖孔小于 0.5mm
- E. 根管预备应止于此处 **正确答案：D**

2、单选 缘龈炎的临床表现（）

- A. 疼痛明显
- B. 自发出血
- C. 牙周袋形成
- D. 牙排列拥挤
- E. 牙颈部常有牙石、软垢沉积

正确答案：E

3、单选 患者，女性，2岁，口腔溃疡2天，溃疡前1天有低热史。口腔检查可见牙龈广泛充血，腭部、口底、唇内侧黏膜充血、成簇外形不规则浅表溃疡。无皮肤病损。如果要进行辅助检查，可选择（）

- A. 活检
- B. OT 试验
- C. 血常规
- D. 病损区涂片检查
- E. 胸透 **正确答案：D**

4、单选 以下哪项不是糖皮质激素长期使用时易导致的并发症（）

- A. 消化道溃疡
- B. 糖尿病
- C. 骨质疏松
- D. 库欣综合征
- E. 血小板减少症 **正确答案：E**

5、单选 地图舌的病损边缘表现为（）

- A. 丝状乳头片状剥脱
- B. 红色光滑区
- C. 糜烂
- D. 凹陷
- E. 高起 **正确答案：E**

6、单选 人体中最硬的组织是（）

- A. 牙骨质
- B. 牙本质
- C. 牙釉质

D. 头颅骨

E. 颌骨 **正确答案：C**

7、单选 原发性疱疹性口炎的病程不包括（）

A. 感染期

B. 前驱期

C. 水疱期

D. 糜烂期

E. 愈合期

正确答案：A

8、单选 球菌性口炎的致病菌不包括（）

A. 卡他球菌

B. 肺炎双球菌

C. 溶血性链球菌

D. 金黄色葡萄球菌

E. 变形链球菌

正确答案：E

9、单选 患者，男性，26岁，近日口腔黏膜疼痛不适，伴发热、乏力。口腔检查见全口牙龈充血水肿，上下前牙龈边缘呈“虫蚀状”，龈乳头消失变平，上覆灰白色坏死假膜，双颊、舌腹、口底黏膜充血水肿，右下后牙颊移行沟黏膜处有一直径约1.2cm大小的溃疡，形状不规则，上覆灰白色假膜，腐败性口臭。与该病发生关系最密切的微生物是（）

A. 单纯疱疹病毒

B. 金黄色葡萄球菌

C. 梭形杆菌

D. 白色念珠菌

E. 乳酸杆菌

正确答案：C

10、单选 在口腔中被视为细菌微生态环境的是（）

A. 软垢

B. 唾液

C. 龈沟液

D. 牙菌斑

E. 釉质表面的获得性膜

正确答案：D

11、单选 寻常狼疮组织缺损的特点为（）

A. 弹坑状

B. 菜花状

C. 鼠啮状

D. 狼噬状

E. 乳头状

正确答案: D

12、单选 用直接免疫荧光法检查天疱疮病损组织, 可见到荧光抗体出现在 ()

A. 黏膜下层

B. 血管内皮

C. 肌筋膜间隙

D. 上皮棘细胞间

E. 基底膜区 **正确答案: D**

13、单选 我国现行水质标准氟浓度为 ()

A. 0.1~0.4ppm

B. 0.01~0.05ppm

C. 0.5~1.0ppm

D. 1.1~2.0ppm

E. >2ppm **正确答案: C**

14、单选 白斑 ()

A. 癌前病变

B. 癌前状态

C. 既非癌前病变, 也非癌前状态

正确答案: A

15、单选 下列哪项符合牙髓切断术适应证 ()

A. 根尖孔尚未发育完全, 因机械性或外伤性露髓的年轻恒牙

B. 根尖已发育完全, 机械性或外伤性露髓, 穿髓孔直径不超过 0.5mm 的恒牙

C. 龋源性、外伤性或机械性露髓, 根尖未发育完成的年轻恒牙

D. 龋源性露髓的乳牙

E. 根尖已发育完全, 机械性或外伤性露髓, 穿髓孔直径不超过 1.0mm 的恒牙 **正**

确答案: C

16、单选 患儿, 男, 8 个月, 母乳喂养, 舌系带溃烂 1 个月, 进食困难。口腔检查: 下前牙萌出, 舌系带处见 1.0cm×0.8cm 大小的溃疡, 表面有灰白色假膜, 触诊较硬。拟诊断为 ()

A. Riga-Fede 病

B. Bednar 溃疡

C. 腺周口疮

D. 褥疮性溃疡

E. 自伤性溃疡 **正确答案: A**

17、单选 带状疱疹最常见于 ()

A. 面部

- B. 唇颊部
- C. 舌腭部
- D. 胸腹或腰部
- E. 四肢

正确答案：D

18、单选 患者，男性，30岁，近几日突感口腔内多处“牙床”胀痛不适，晨起口中有血腥味。检查：有腐败性口臭，牙龈广泛充血水肿，上、下前牙龈缘如虫蚀状，覆灰白色坏死假膜。下列与本病发生无关的是（）

- A. 存在已久的慢性龈炎或牙周炎
- B. 心身因素
- C. 营养不良或消耗性疾病
- D. 吸烟
- E. 遗传因素

正确答案：E

19、单选 确定慢性增殖型念珠菌病有无异常增生的最有价值的诊断技术为（）

- A. 涂片镜检
- B. 唾液培养
- C. 血 CEA 测定
- D. 活体组织检查
- E. 念珠菌抗体的检测

正确答案：D

20、单选 可考虑手术治疗的疾病是（）

- A. 带状疱疹
- B. 疱疹性口炎
- C. 念珠菌性白斑
- D. 球菌性口炎
- E. 灼口综合征

正确答案：C

21、单选 药物过敏性口炎的临床特征为（）

- A. 皮肤红斑、水疱，口腔大小不等水疱
- B. 皮肤水疱或斑丘疹，口腔为相互融合的透明小水疱
- C. 皮肤结节性红斑，口腔为反复发作的溃疡
- D. 皮肤紫色丘疹，口腔为白色条纹
- E. 皮肤大疱，口腔黏膜白色瘢痕

正确答案：A

22、单选 患者，女性，30岁，不明原因双侧口角区充血、水肿、糜烂、皲裂3天，伴有口内黏膜广泛充血、糜烂及皮肤荨麻疹。诊断考虑为（）

- A. 念珠菌性口角炎
- B. 疱疹性口角炎
- C. 球菌性口角炎
- D. 创伤性口角炎
- E. 毒物性口角炎
- F. 营养不良性口角炎
- G. 接触性口角炎

正确答案： E

23、单选 天疱疮的临床类型 ()

- A. 萎缩型、肥厚型
- B. 皱襞状、海绵状、鳞片状
- C. 斑块状、颗粒状、皱纸状、疣状
- D. 光滑型、结节型
- E. 寻常型、增殖型、落叶型、红斑型

正确答案： E

24、单选?维生素 B2 缺乏症除有口角炎外，还表现为 ()

- A. 鼻炎、唇炎
- B. 舌炎、咽炎
- C. 鼻炎、舌炎
- D. 舌炎、唇炎
- E. 咽炎、唇炎

正确答案： D

25、单选 患者，女性，10岁，咽喉痛、发热3天就诊。检查：体温38℃，咽喉黏膜充血红肿，舌质红，舌面光滑，舌乳头突起，面部皮肤弥漫性充血伴有针尖状丘疹。 首选治疗药物是 ()

- A. 青霉素
- B. 红霉素
- C. 泼尼松
- D. 阿司匹林
- E. 阿昔洛韦

正确答案： A

26、单选 以下描述哪一条不符合副肿瘤性天疱疮 ()

- A. 疾病发生与体内肿瘤的循环体液因子的作用有关
- B. 患者出现天疱疮样损害
- C. 疾病发生与体内肿瘤的代谢性产物作用有关
- D. 尼氏征阳性
- E. 疾病常具有自限性

正确答案： E

27、单选 做桩冠修复，最好使用何种根充方法 ()

- A. 银尖+氢氧化钙糊剂

- B. 氢氧化钙糊剂
- C. 酚醛树脂
- D. 牙胶尖+氢氧化钙糊剂
- E. 碘仿糊剂 **正确答案: D**

28、单选 诊断畸形中央尖，下列哪一项错误（）

- A. 多见于下颌第二前磨牙
- B. 常为对称性发生
- C. 该尖位于面颊、舌尖处
- D. 呈圆锥形突起
- E. 牙尖折断后，易致牙髓坏死

正确答案: C

29、单选 酸蚀刻法复合树脂的粘接机理（）

- A. 螯合
- B. 化学键
- C. 范德华力
- D. 机械粘结
- E. 结合共聚 **正确答案: D**

30、单选 患者，男性，49岁，自觉口咽部溃烂50天。口腔检查左侧舌腭弓中部见一直径约1.0cm×0.8cm大小溃疡，溃疡呈弹坑状，边缘不整齐，基底略硬，有灰白色假膜覆盖，用棉签擦去假膜有轻微触痛，可见基底有颗粒状肉芽，溃疡边缘微隆，呈鼠啮状。该患者两侧磨牙排列咬合良好，无修复体。该病的最佳治疗方案（）

- A. 局部注射激素
- B. 口服异烟肼
- C. 口服维生素B12
- D. 手术切除
- E. 脱敏治疗

正确答案: B

31、单选 白色念珠菌的毒力不包括（）

- A. 菌丝
- B. 磷脂酶A
- C. 分泌型的胞外酸性蛋白酶
- D. 表面受体
- E. 菌毛

正确答案: E

32、单选 患者，男性，30岁，张口受限2个月。长期咀嚼槟榔，否认创伤史、手术史、吸烟史及系统病史。查体示口内黏膜广泛呈灰白色，未见明显糜烂处，翼颌韧带处扪及瘢痕样条索，张口中度受限。

该病的治疗措施中错误的是（）

- A. 活血化淤中药
- B. 停止咀嚼槟榔
- C. 翼颌韧带处糖皮质激素局部注射
- D. 所有病例都应手术切除纤维条索
- E. 口服维生素 A, E

正确答案：D

33、单选 关于急性根尖周炎应急处理操作注意点不正确的是（）

- A. 局部浸润麻醉要避免开脓肿部位
- B. 正确开髓并尽量减少钻磨震动
- C. 用 3%过氧化氢溶液和次氯酸钠交替冲洗根管
- D. 开髓后要开放引流 2~3 天
- E. 如时间紧急，可在服用大量抗生素的情况下，一次性根管充填 **正确答案：E**

34、单选 存在瘻管的残冠，根管充填后桩冠修复的最佳时机是（）

- A. 根管充填当天
- B. 根管充填后 1 周
- C. 根管充填后 2 周
- D. 根管充填后 3 周
- E. 瘻管愈合后 **正确答案：E**

35、单选 最常出现口腔损害的是哪一型天疱疮（）

- A. 寻常型天疱疮
- B. 增殖型天疱疮
- C. 落叶型天疱疮
- D. 大疱型天疱疮
- E. 红斑型天疱疮 **正确答案：A**

参考解析：暂无解析

36、单选 感染根管久治不愈的消毒剂为（）

- A. 樟脑酚
- B. 甲醛甲酚
- C. 木馏油
- D. 抗生素+激素
- E. 碘仿糊剂

正确答案：D

37、单选 青少年牙周炎的致病菌是（）

- A. 牙龈类杆菌
- B. 黏性放线菌
- C. 伴放线放线杆菌
- D. 梭形杆菌

E. 中间型类杆菌 **正确答案：C**

38、单选 因急食擦伤引起的血疱易发生于（）

- A. 软腭
- B. 硬腭
- C. 舌背
- D. 牙龈

E. 口角区域 **正确答案：A**

39、单选 直接免疫荧光法显示天疱疮组织中最常见的免疫沉积物是（）

- A. IgA
- B. IgM
- C. IgE
- D. IgG

E. C4 **正确答案：D**

40、单选 不属于与内分泌因素有关的牙周病为（）

- A. 青春期龈炎
- B. 青少年牙周炎
- C. 妊娠期龈炎
- D. 妊娠性龈瘤

E. 糖尿病型牙周炎 **正确答案：B**

41、单选 游走性舌炎病损区突出的病理变化的是（）

- A. 丝状乳头萎缩
- B. 菌状乳头增生
- C. 轮廓乳头增生
- D. 叶状乳头增生

E. 以上均是 **正确答案：A**

42、单选 PC 活髓切断术时 FC 小棉球应放置的时间为（）

- A. 1 分钟
- B. 2 分钟
- C. 3 分钟
- D. 5 分钟
- E. 8 分钟

正确答案：A

43、单选 患者，男性，65 岁，蓄电池厂退休职工，因牙龈发黑就诊。检查：口腔卫生较差，前牙牙龈龈缘呈蓝黑色，左颊、下唇黏膜亦有棕黑色色素沉着斑。患者长期神经衰弱，并有头痛、头晕等症状。下列哪项可用于治疗该病（）

- A. EDTA-CaNa₂
- B. NaCl

- C. 5%二巯磺钠
- D. FeSO₄
- E. Li₂CO₃

正确答案: A

44、单选 患者，男性，20岁，双侧口角湿白、糜烂、皲裂、结痂，伴阴囊瘙痒、鳞屑，可能是缺乏（）

- A. 维生素 A
- B. 维生素 B₁
- C. 维生素 B₂
- D. 维生素 C
- E. 维生素 D

正确答案: C

45、单选 患者女性，20岁，因龋坏牙就诊，查：右下7点隙龋，探质软，卡探针，冷热测同对照牙，口内多个牙因龋坏充填治疗，该患牙最好的处理为（）

- A. 银汞充填龋坏涉及的部位
- B. 玻璃离子充填龋坏涉及的部位
- C. 预防性扩展，银汞合金充填
- D. 预防性扩展，玻璃离子充填
- E. 预防性扩展，复合树脂充填

正确答案: C

46、单选 淋病的治疗应首选（）

- A. 甲硝唑
- B. 阿昔洛韦
- C. 青霉素
- D. 氟康唑
- E. 头孢曲松钠 **正确答案:** E

47、单选 可以导致牙龈出血的系统性疾病不包括（）

- A. 维生素 C 缺乏
- B. 肝脏疾病
- C. 血友病
- D. 特发性血小板减少性紫癜
- E. 艾迪生病 **正确答案:** E

48、单选 哈钦森三联症是指（）

- A. 佩刀胫、神经性耳聋、哈钦森牙
- B. 桑葚牙、神经性耳聋、哈钦森牙
- C. 神经性耳聋、实质性角膜炎、桑葚牙
- D. 哈钦森牙、神经性耳聋、间质性角膜炎

E. 佩刀胫、实质性角膜炎、哈钦森牙

正确答案：D

49、单选 对于特发性血小板减少性紫癜患者描述错误的是（）

- A. 皮肤、黏膜瘀点、瘀斑、血肿
- B. 牙龈自发性出血
- C. 血小板减少
- D. 出血时间长
- E. 凝血时间延长

正确答案：E

50、单选 以下选项中哪项不是影响牙咀嚼磨损的原因（）

- A. 牙的硬度
- B. 食物的硬度
- C. 咀嚼习惯
- D. 咀嚼肌张力
- E. 夜磨牙 **正确答案：E**

51、单选?患者，男性，48岁，2周前发现左侧舌缘偏腹侧有1.5cm²鲜红色区域，病损区域内有散在的白色斑点，吃热、咸食时有疼痛感觉，触诊病损区，质地尚软，临床考虑为间杂型红斑。由社区医院转入口腔专科医院进行诊治。局部检查重点应是（）

- A. X线检查
- B. 免疫荧光检查
- C. 涂片检查
- D. 局部切取活检
- E. 唾液流量检查

正确答案：D

52、单选?患者25岁，左下后牙反复肿痛而就诊，查：无龋，面磨损可见牙本质暴露，探（-），叩（+），X线：根尖区病变，根尖孔成喇叭口状。其病因最有可能是（）

- A. 磨损
- B. 牙隐裂
- C. 畸形中央尖
- D. 创伤
- E. 发育不全

正确答案：C

53、单选 患者，3天来下后牙遇冷水痛，吐出后痛持续10秒，平时无明显不适。该患者最可能的牙病是（）

- A. 慢性牙髓炎
- B. 楔状缺损

- C. 可复性牙髓炎
- D. 急性牙髓炎
- E. 邻面中龋

正确答案：C

54、单选 下列患者不适合牙髓电测者是（）

- A. 冠心病患者
- B. 高血压患者
- C. 装心脏起搏器者
- D. 癫痫病患者
- E. 糖尿病患者

正确答案：C

55、单选 30岁女性，突眼，甲状腺肿大，多龋齿，舌纤细震颤，灼痛，可能罹患疾病为（）

- A. 呆小症
- B. 垂体性侏儒症
- C. 甲状腺功能亢进症
- D. 肢端肥大症
- E. 甲状旁腺功能减退症

正确答案：C

56、单选 牙内陷最严重的一种是（）

- A. 畸形舌侧尖
- B. 双生牙
- C. 畸形根面沟
- D. 畸形舌侧窝
- E. 牙中牙

正确答案：E

57、单选 患者，2.5岁。以高烧3天、口腔溃疡2天，啼哭、流涎、拒食来诊。体检发现患儿全口牙龈红肿，上腭及舌背黏膜可见汇集成簇的针头大小透明水疱，部分已破溃为浅表溃疡，周围黏膜充血水肿广泛。本病例感染的病原体可能为（）

- A. 金黄色葡萄球菌
- B. 柯萨奇病毒A
- C. 单纯疱疹病毒
- D. 肺炎链球菌
- E. 白色念珠菌

正确答案：C

58、单选 下列关于镍钛非ISO标准根管器械的说法正确的是（）①非ISO标准设计的大锥度器械②变形能力次于不锈钢器械③抗扭曲能力优于不锈钢器械④多采用逐步深入技术预备⑤多采用逐步后退技术预备⑥适应弯曲根管

- A. ①③④⑥

B. ①②⑤⑥

C. ①②④⑥

D. ②③⑤⑥

E. ②③④⑥ **正确答案：A**

59、单选 患者，男性，4岁，发热伴唇红干燥、皲裂、出血一周就诊。检查：体温 39℃，唇红干燥、结痂，舌菌状乳头突起，眼结膜充血，全身皮肤荨麻疹样皮疹，颈部淋巴结肿大。最可能的诊断是（）

A. 败血症

B. 猩红热

C. 皮肤黏膜淋巴结综合征

D. 药物过敏性口炎

E. 多形性红斑

正确答案：C

60、单选 患者，女性，39岁，1年来下唇反复糜烂，并伴有多处皮肤的不规则红斑，户外劳动后上述症状加重。查体示：下唇唇红盘状糜烂面，上覆血痂，周围放射状白纹，皮肤界限清楚；头皮、耳旁、颈、前胸、双侧手背均见大小不等的不规则红斑伴萎缩，表面有黏着性鳞屑覆盖。按照上述诊断，全身治疗首选药物是（）

A. 异烟肼、利福喷丁、乙胺丁醇

B. 沙利度胺

C. 大剂量糖皮质激素 [泼尼松：1mg / (kg/D.)]

D. 环磷酰胺

E. 羟氯喹

正确答案：E

61、单选?失活剂 As₂O₃ 封药时间（）

A. 24~48 小时

B. 1~7 天

C. 10~12 天

D. 30~40 分

E. 2~4 天

正确答案：A

62、单选 念珠菌性口炎和球菌性口炎区别不包括（）

A. 病原菌不同

B. 临床表现为假膜，念珠菌病假膜不容易撕脱，撕脱后容易留下出血创面

C. 治疗首选药物都是抗生素的应用

D. 疗程要足够长

E. 疼痛感不明显 **正确答案：C**

63、单选 梅毒黏膜斑发生在（）

- A. 先天梅毒
- B. 后天梅毒
- C. 一期梅毒
- D. 二期梅毒
- E. 三期梅毒

正确答案：D

64、单选 患者，男性，出生 5 天，啼哭拒食，口腔颊黏膜出现微凸的柔软白色针头大小斑点，擦去后可露出红色糜烂出血面。该患儿局部治疗通常选用（）

- A. 2%四环素溶液
- B. 3%硼酸溶液
- C. 1.5%过氧化氢溶液
- D. 2%碳酸氢钠溶液
- E. 0.05%甲紫水溶液

正确答案：D

65、单选 梅毒黏膜斑表现为（）

- A. 灰白色光亮斑块
- B. 白垩色斑块
- C. 珠光白色斑块
- D. 红色斑块
- E. 天鹅绒样斑块

正确答案：A

66、单选 沟纹舌以沟纹或裂纹为特征，它的裂纹最深可及（）

- A. 黏膜层
- B. 固有层
- C. 穿通舌体
- D. 基层层
- E. 黏膜下层或肌层

正确答案：E

67、单选 全口义齿人工牙折断的修理方法是（）

- A. 只磨除折断的人工牙
- B. 磨除折断的人工牙，并将近远中相邻的塑料牙邻面磨粗糙，磨去舌侧基托
- C. 磨除折断的人工牙，并将近远中相邻的塑料牙邻面磨粗糙
- D. 磨除折断的人工牙和唇、颊侧基托
- E. 磨除折断的人工牙和唇、颊、舌侧基托

正确答案：B

68、单选 下列哪项不是慢性龈缘炎的临床表现（）

- A. 牙龈充血肿胀
- B. 探诊龈沟出血

- C. 龈沟深度超过 3mm
- D. 牙周附着丧失
- E. 无牙槽骨吸收

正确答案： D

69、单选 与口角糜烂无关的因素（）

- A. B 族维生素缺乏，导致营养不良
- B. 细菌感染
- C. 先天遗传
- D. 真菌感染
- E. 老年无牙患者，颌间距缩短

正确答案： C

70、单选 全口义齿的固位是指（）

- A. 吃东西时义齿不掉
- B. 打哈欠时义齿不掉
- C. 从口内取下义齿时有阻力
- D. 说话时义齿不掉
- E. 吐痰时义齿不掉

正确答案： C

71、单选 焙烧铸圈时，铸圈在电烘箱内应（）

- A. 先向上，再横放
- B. 先向下，再横放
- C. 先向下，再向上
- D. 先向上，再向下
- E. 一般向上 **正确答案：** C

72、单选 患者，女性，10 岁，舌背反复出现红色斑片 1 年，病损形态时常变换，一般无疼痛。检查：舌背及舌缘有一红色区域，丝状乳头萎缩，周边为黄白色的围线，界限分明。该病的治疗可采用以下措施，除了（）

- A. 本病预后良好，一般不需治疗
- B. 做好解释，消除患者恐惧心理
- C. 伴发白色念珠菌感染者，应用局部治疗
- D. 冷冻或激光治疗
- E. 保持口腔清洁，控制继发感染 **正确答案：** D

73、单选 患者，仪表工人，近期发现口炎明显，口腔内明显金属味，唾液量多而黏，伴发明显精神症状，可能罹患（）

- A. 铋中毒
- B. 磷中毒
- C. 乙醇中毒
- D. 汞中毒

E. 铅中毒

正确答案： D

74、单选 牙本质敏感症对下列哪项刺激最敏感（）

A. 刷牙

B. 冷热

C. 酸甜

D. 机械刺激

E. 吃硬物 **正确答案：** D

75、单选 下列除哪一项外均可能引起舌背丝状乳头萎缩（）

A. OLP

B. B 族维生素缺乏

C. 口腔念珠菌感染

D. 地图舌

E. 灼口综合征

正确答案： E

76、单选 患者，男性，48 岁，确诊为口腔黏膜下纤维性变 5 年，患者确诊后边治疗边咀嚼槟榔、吸烟，因右颊黏膜溃疡、疼痛 2 个月来医院就诊。口腔黏膜下纤维性变癌变，下列哪项是错误的（）

A. 应及时解除槟榔、烟、酒刺激

B. 口腔黏膜下纤维性变合并口腔白斑者，更易癌变

C. 病理上伴有上皮异常增生者，癌变率增加

D. 口腔黏膜下纤维性变伴长期溃疡不愈者，应及时活检

E. 在流行咀嚼槟榔地区，口腔黏膜下纤维性变与口腔鳞癌发生无明显相关性

正确答案： E

77、单选 患者，男性，65 岁，蓄电池厂退休职工，因牙龈发黑就诊。检查：口腔卫生较差，前牙牙龈龈缘呈蓝黑色，左颊、下唇黏膜亦有棕黑色色素沉着斑。患者长期神经衰弱，并有头痛、头晕等症状。最可能的诊断是（）

A. 砷中毒

B. 汞中毒

C. 铋中毒

D. 铅中毒

E. 磷中毒 **正确答案：** D

78、单选 与急性坏死性龈炎关系最密切的细菌为（）

A. 伴放线放线共生杆菌与螺旋体

B. 梭形杆菌与牙龈卟啉菌

C. 梭形杆菌与螺旋体

D. 黏性放线菌与螺旋体

E. 以上均不是 **正确答案：** C

79、单选 梅-罗综合征（）

- A. 以唇部水肿、水疱、糜烂、结痂和剧烈瘙痒为主要临床特征
- B. 以唇部黏膜增厚、干燥、秕糠样白色鳞屑为主要临床特征
- C. 病理以唇部小腺体明显增生肿胀为主要特征
- D. 以口唇弥漫性反复肿胀不能恢复，扪诊有垫褥感为主要临床特征
- E. 以唇部局限性损害、反复发作的剧烈瘙痒、淡黄色黏液流出和结痂为主要临床特征
- F. 以唇红浅表溃疡、结痂、痂皮下集聚脓性分泌物，去痂后露出潮红基底为主要临床特征
- G. 以复发性口面部肿胀、复发性周围性面瘫、裂舌为主要临床症状
- H. 以唇部瘙痒、灼热痛、随之迅速肿胀致唇肥厚、表面光亮如蜡为主要临床症状

正确答案：G

80、单选 淋病主要通过哪种途径传播（）

- A. 产道
- B. 性接触
- C. 输血
- D. 胎盘
- E. 污染的物品

正确答案：B

81、单选 关于根分叉病变的分度，哪项描述不正确（）

- A. 1度：可及分叉外形，X线片示：无异常表现
- B. 2度：只有一侧可探入分叉区，X线片示：骨密度略降低
- C. 2度：只有一侧或双侧可探入分叉区，但不能穿通，X线片示：骨密度略降低
- D. 3度：探针能通过分叉区，但有牙龈覆盖，X线片示：骨密度降低区
- E. 4度：探针能通过分叉区，且无牙龈覆盖，X线片示：骨密度降低区

正确答案：B

82、单选 患者，男性，50岁。近来感觉口腔黏膜粗糙，涩感，偶然发现舌右侧黏膜有1cm²大小白色斑块状改变，白斑表面有小颗粒，稍微隆起高出黏膜面。检查见局部为非均质性白色斑块，触诊白色斑块基底稍微发硬，黏膜尚无破溃。口腔白斑主要与哪些疾病鉴别（）

- A. 白色角化症
- B. 疱疹性口炎
- C. 腺周口疮
- D. 红斑狼疮
- E. 白塞病

正确答案：A

83、单选 患者，女性，50岁，牙周治疗后右上后牙咬合疼痛1天，自感该牙有松动、伸长。检查：见右下7颊侧牙龈充血水肿，呈椭圆形肿胀突起，叩痛（++），松动Ⅰ度，牙周探诊6mm，X线片示根分叉区暗影。此时不宜采取的治疗手段是（）

- A. 牙髓-牙周联合治疗
- B. 牙周冲洗上药
- C. 彻底的龈下刮治
- D. 口服抗生素
- E. 调磨早接触点

正确答案：A

84、单选 不能治疗牙本质过敏症的是以下哪种药物（）

- A. 0.76%单氟磷酸钠凝胶
- B. 碘化银
- C. 激光
- D. 碘甘油
- E. 75%氯化锶甘油

正确答案：D

85、单选 急性牙龈脓肿无哪项症状（）

- A. 多数牙间乳头的红肿和跳动
- B. 患牙及邻牙均对叩诊敏感
- C. 外周血白细胞计数升高
- D. 口腔黏膜往往普遍红肿，出现溃疡和假膜
- E. 体温升高，局部淋巴结肿大

正确答案：D

86、单选 患者，2.5岁。以高烧3天、口腔溃疡2天，啼哭、流涎、拒食来诊。体检发现患儿全口牙龈红肿，上腭及舌背黏膜可见汇集成簇的针头大小透明水疱，部分已破溃为浅表溃疡，周围黏膜充血水肿广泛。本病例最可能的诊断为（）

- A. 鹅口疮
- B. 急性坏死性龈口炎
- C. 疱疹性龈口炎
- D. 口炎型口疮
- E. 手-足-口病 **正确答案：C**

87、单选 以下描述哪一项更符合天疱疮的临床表现（）

- A. 黏膜表面出现白色网状条纹
- B. 黏膜发红萎缩
- C. 黏膜表面呈白色斑块状
- D. 黏膜下质地较硬的肿块

E. 黏膜表面出现不易愈合的糜烂 正确答案： E

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/848136071031006055>