

药源性过敏性休克急救与护理知识测试

一、选择题

1、氨基糖式类药物中过敏性休克发生率最高的是 [单选题] *

A 庆大霉素

B 链霉素✓

C 新霉素

D 卡那霉素

E 安布雾素

2、链霉素过敏性休克抢救静脉注射（ ） [单选题] *

A 西地兰

B 氢化可的松

C 异丙肾上腺素

D 去甲肾上腺素

E 10%葡萄糖酸钙✓

3、注射青霉素引起过敏性休克，血压下降，是由血管活性物质引起的生物学效应，这种休克的发生是由哪种效应所致。（ ） [单选题] *

A 支气管平滑肌收缩

B 腺体分泌增加

C 毛细血管扩张

D 血管通透性增加

E 以上全是✓

4、抗休克治疗时下列哪项药物对改善肾缺血有利 () [单选题] *

A 去回肾上腺素

B 肾上腺素

C 多巴胺✓

D 麻黄碱

E 去氧肾上腺素(新福利)

5、下列进行破伤风抗毒素脱敏注射，正确的一项是: () [单选题] *

A 分 2 次，剂量一样，平均每隔 20 分钟一次

B 分 2 次，剂量一样，平均每隔 30 分钟一次

C 分 2 次，剂量一样，平均每隔 10 分钟一次

D 分 4 次，剂量由小到大，平均每隔 20 分钟一次✓

E 分 4 次，剂量由大到小，平均每隔 20 分钟一次

6、休克病人使用血管扩张药，必须具备的条件是 () [单选题] *

A 纠正酸中毒

B 心功能正常

C 补足血容量✓

D 先用血管收缩药

E 与皮质激素同用

7、破伤风抗毒素过敏试验的阳性体征 () [单选题] *

A 硬结小于 0.5cm,红晕小于 2cm

B 硬结大于 0.5cm，红晕小于 4cm

C 硬结小于 1cm , 红晕小于 4cm

D 硬结小于 1cm , 红晕大于 2cm

E 硬结大于 1.5cm,红晕大于 4cm✓

8、关于休克护理下列哪项不妥 () [单选题] *

A 平卧位

B 常规吸氧

C 给热水袋保暖✓

D 观察每小时尿量

E 每 15 分钟测血压、脉搏

9、休克的主要致死原因是 () [单选题] *

A、心功能衰竭

B、肺间质水肿

C、DIC

D、肾小管损坏

E、多系统器官衰竭 (MSOF) ✓

10、成人经静脉补充钾离子时 , 要求尿量每小时不得少于 () [单选题] *

A20ml

B 30ml✓

C 40ml

D 50ml

E60ml

11、休克病人经积极治疗 , 每小时尿量大于多少即表明休克纠正 [单选题] *

A 10ml

B 15ml

C 20ml

D 25ml

E 30ml✓

12 所谓有效循环血量是指 [单选题] *

A 全身总血量

B 单位时间内通过心血管系统进行循环的血量✓

C 在动脉内的血量

D 在微循环内的总血量

E 在静脉内的血量

13、休克时应用低分子右旋糖酐的主要作用是 [单选题] *

A 扩容

B 供热

C 供蛋白质

D 纠正脱水

E 降低血液粘稠度✓

14、病人做药物过敏性试验时，常用的皮肤消毒剂是 [单选题] *

A 2%碘酒溶液

B 0.2%碘伏溶液

C 75%酒精溶液✓

D 0.1%新洁尔灭溶液

E 0.02%洗必泰溶液

15、青霉素过敏性休克的相关叙述，正确的是 [单选题] *

A 可在皮试后数秒钟闪电式产生✓

B 主要表现为皮肤瘙痒

C 过敏性休克主要发生在注射给药的过程中

D 过敏性休克可在半小时后自行缓解

E 引起过敏性休克的主要原因是使用的注射液在室温下放置太久

16、有关药物过敏皮试浓度的叙述不正确的是 [单选题] *

A 青霉素皮试液的注入浓度为 0.1ml 含 50 单位

B 链霉素皮试液的注入浓度为 0.1ml 含 250 单位

C 破伤风抗毒素皮试液的注入浓度为 0.1ml 含 150IU✓

D 细胞色素 C 的皮试液配制只重稀释一次即可(0.1ml 药物加 0.9ml 生理盐水)

E 碘过敏试验时，可直接取 0.1ml 碘造影剂皮内注射，无需稀释

17、关于皮试过程的叙述不正确的是 [单选题] *

A 皮试前应评估病人的用药史、药物过敏有

B 查对姓名、床号、皮试的药物

C 常用部位为前臂掌侧下 1/3 处

D 无自觉反应即可判断皮试阴性✓

E 皮丘隆起变大，直径超过 1cm 是皮试阳性的表现

18、青霉素过敏性休克时出现头晕眼花、烦躁不安、大小便失禁等症状的原因是 [单选题] *

A 支气管平滑肌痉挛

B 有效循环血量减少

C 毛细血管通透性增加

D 脑组织缺氧✓

E 血清病反应

19、导致过敏性休克时出现面色苍白，发绀、血压下降等症状的原因是 [单选题] *

A 支气管平滑肌痉挛

B 脑组织缺氧

C 腺体分泌增加

D 有效循环血量减少✓

E 血管神经性水肿

20、抢救链霉素过敏反应时，为了减轻链霉素的毒性可以静脉注射 [单选题] *

A 氯丙嗪

B 扑尔敏

C 乳酸钙

D 10%葡萄糖酸钙✓

E 异丙肾上腺素

21、细胞色素 C 过敏试验皮内注射剂量为 [单选题] *

A 0.075mg✓

B 0.75mg

C 750mg

D 75mg

E 0.75ug

22、下列青霉素皮试结果，哪一种情况可以注射青霉素 [单选题] *

- A 局部红晕直径 1 厘米以上，无自觉症状闷、
- B 局部红晕直径 0.5 厘米以上，有胸闷、头晕
- C 局部红晕直径 0.5 厘米以上，周围有伪足，有痒感
- D 局部红晕直径 0.7 厘米，无自觉症状✓
- E 以上都不能注射

23、下列皮试液 1ml 含量错误的是 [单选题] *

- A 青霉素 500U
- B 链霉素 2500U
- C 破伤风抗毒素 150IU
- D 细胞色素 C 7.5mg✓
- E 普鲁卡因 2.5mg

24、王某，男 25 岁，患化脓性扁桃体炎，在注射青霉素数秒钟后出现胸闷、气促、面色苍白、出冷汗及濒死感、血压 75/45mmHg，护士首先采取的急救措施是 [单选题] *

- A 给予氧气吸入
- B 针刺人中、内关等穴位
- C 停止注射青霉素，皮下注射盐酸肾上腺素 1mg✓
- D 给予静脉输液 E 报告医师

25、关于四环素的不良反应，叙述错误的是 [单选题] *

- A 空腹口服引起胃肠道反应
- B 可导致婴幼儿乳牙釉质发育不全，牙齿发黄✓
- C 可引起二重感染
- D 长期大量口服或静脉给予大剂量，可造成严重肝脏损伤

26、下列哪项不属于氨基糖甙类药物的不良反应 [单选题] *

- A 变态反应
- B 神经肌肉阻断作用
- C 肾毒性
- D 骨髓抑制✓
- E 耳毒性

27、某儿童患者，经 1 个疗程链霉素治疗后，听力明显下降，虽然停药几周后听力仍未恢复，此现象属于 [单选题] *

- A 药物的副作用
- B 药物的毒性反应✓
- C 药物引起的变态反应
- D 药物的后遗效应
- E 停药反应

28、用药前应做皮肤过敏试验的局麻药是 [单选题] *

- A 普鲁卡因✓
- B 利多卡因
- C 丁卡因
- D 布比卡因
- E 罗哌卡因

29、糖皮质激素常见的不良反应不包括 [单选题] *

- A 长期服用可出现柯兴综合征
- B 长期服用可发生尿糖阳性，血糖升高

C 长期应用可体内潜在病灶扩数

D 长期应用可抑制胃酸、胃蛋白酶分泌✓

30、青霉素过敏性休克在抢救时首先采取的措施是 [单选题] *

A 立即通知医生抢救

B 静脉注射 0.1%盐酸肾上腺素 1ml

C 立即停药，平卧，皮下注射盐酸肾上腺素✓

D 立即吸氧,胸外心脏按压

E 氢化考的松静脉输液

31、休克时病人的体位 [单选题] *

A 俯卧位

B 半卧位

C 头低脚高

D 上身下肢各适当抬高 15 度-30 度✓

E 截石位

32、休克病人补液一般首选 [单选题] *

A 全血

B 血浆

C 10%葡萄糖液

D 右旋糖

E 平衡盐溶液✓

33、经抢救治疗后，反应补充血容量成功的最好的临床指标是 [单选题] *

A 血压回升

B 尿量增加✓

C 体温回升

D 精神平衡

E 脉压下降

34、青霉素皮试液要求现配现用主要目的是为了防止 [单选题] *

A 污染

B 出现沉淀

C 产生青霉烯酸✓

D 产生致热物质

E 出现结晶

35、做破伤风抗毒素脱敏注射时应将 1ml 抗毒血清稀释至 [单选题] *

A 2ml

B 4ml

C 6ml

D 10ml✓

E 20ml

36、破伤风抗毒素脱敏注射时，中间应间隔 [单选题] *

A 5 分钟

B 10 分钟

C 20 分钟✓

D 30 分钟

E 60 分钟

37、青霉素皮内试验观察结果的时间 [单选题] *

A 10 分钟

B 20 分钟 ✓

C 30 分钟

D 60 分钟

E 100 分钟

38、使用破伤风抗毒素()天，需再次使用时需再次做过敏试验 [单选题] *

A 1 天

B 3 天

C 5 天

D 7 天 ✓

E 14 天

39、青霉素过敏性休克时，立即皮下注射肾上腺素的目的 [单选题] *

A 增加心输出量 ✓

B 减少外周阻力

C 减少心输出量

D 兴奋呼吸中枢

E 收缩支气管平滑肌

40、链霉素过敏性休克时，使用葡萄糖酸钙的目的是 [单选题] *

A 收缩血管，增加外周阻力 ✓

B 松弛支气管平滑肌

C 使链霉素毒性症状减轻

D 兴奋呼吸中枢 E 缓解皮肤瘙痒。

1、发生青霉素过敏性休克时临床上最早出现的症状常是 () [单选题] *

A 烦躁不安、血压下降

B 四肢麻木、头晕眼花

C 腹痛、腹泻

D 发绀、面色苍白

E 皮肤瘙痒、呼吸道症状✓

2、做破伤风抗毒素脱敏注射时应将 1ml 抗毒血清稀释至 () [单选题] *

A 2ml

B 4ml

C 6ml

D 10ml✓

E 20ml

3、下列药物在使用前需要做过敏试验的是 () [单选题] *

A 细胞色素 C✓

B 庆大霉素

C 利多卡因

D 红霉素

E 丁胺卡那

4、破伤风抗毒素脱敏注射时，中间应间隔() [单选题] *

A 5 分钟

B 10 分钟

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/855313140314011110>