

皮肤与性病学主治医师：相关专业知识与专业知识考试试题

1、单选 患儿，男性，15岁。2年前两臂出现针尖到粟粒大小与毛孔一致的坚硬丘疹，不融合，顶端有褐色角质栓，内含卷曲的毛发，皮损冬重夏轻。曾服用维生素A治疗，（江南博哥）症状无改善。其父年轻时有同样病史，现已减轻。该患儿应诊断为（）。

- A. 维生素A缺乏症
- B. 毛周角化症
- C. 小棘苔藓
- D. 鱼鳞病
- E. 痒疹

正确答案：B

2、单选 弹力过度性皮肤的发病机制主要是（）。

- A. 网状纤维量的缺陷及形态上的异常
- B. 胶原纤维量的缺陷及形态上的异常
- C. 弹力纤维量的缺陷及形态上的异常
- D. 真皮含水量的增加，真皮基质黏性增加
- E. 血清中弹性硬蛋白酶抑制剂水平低下，导致弹力纤维破坏

正确答案：B

3、单选 寻常狼疮（）。

- A. 玻片压诊法
- B. 皮肤划痕试验
- C. Wood灯检查
- D. 醋酸白试验
- E. 真菌镜检

正确答案：A

4、单选 不是免疫抑制剂的是（）。

- A. 环磷酰胺
- B. 甲氨蝶呤
- C. 硫唑嘌呤
- D. 氨苯砞
- E. 他克莫司

正确答案：D

5、单选 急性接触性唇炎（）。

- A. 唇红边缘持续性脱屑
- B. 唇红及口唇皮肤红肿、水疱、糜烂
- C. 口唇干燥、皲裂、结痂
- D. 下唇黏膜呈半透明象牙色，表面有光泽
- E. 唇红边缘浸润，中央萎缩有鳞屑附着

**正确答案：B**

6、单选 关于鳞状毛囊角化症下列不正确的是（）。

- A. 好发于青壮年
- B. 可能与鱼鳞病属同类病
- C. 为角化性皮肤病
- D. 在少数病例中家族中有相同患者
- E. 为常染色体显性遗传

**正确答案：E**

7、单选 有关痛风的叙述正确的是（）。

- A. 原发性的具有隐性遗传特征
- B. 男女发病率比约 10：1
- C. 患者尿酸浓度一般在  $214 \mu\text{mol} / \text{L}$  以上
- D. 肾功能受损时一般首先血内肌酐升高，继而尿素氮增高
- E. X 线检查关节面附近骨损不明显

**正确答案：D**

8、单选 下列痤疮愈后不留瘢痕的是（）。

- A. 聚合性痤疮
- B. 结节性痤疮
- C. 囊肿性痤疮
- D. 坏死性痤疮
- E. 以上都不是

**正确答案：E**

9、单选 掌跖角化病的共性有（）。

- A. 主要累及掌跖
- B. 无特效口服药物治疗
- C. 局部治疗为主
- D. 大多为先天性，有家族史
- E. 以上都是

**正确答案：E**

10、单选 表皮或黏膜上皮的缺损而形成的湿润面（）。

- A. 糜烂
- B. 溃疡
- C. 瘢痕
- D. 裂隙
- E. 苔藓样变

**正确答案：A**

11、单选 对人而言，HLA 抗原属于（）

- A. 异种抗原

- B. 改变的自身抗原
- C. 同种异型抗原
- D. 隐蔽抗原
- E. 异嗜性抗原

**正确答案：C**

12、单选 患者，男性，45岁。主因龟头起皮疹10余天伴瘙痒就诊。否认婚外性接触史。查体：龟头、包皮内板表现为红斑、丘疹、小的点片状的糜烂面，上覆白色点状乳酪状分泌物。最可能的诊断是（）。

- A. 坏疽性龟头炎
- B. 干燥闭塞型龟头炎
- C. 念珠菌性包皮龟头炎
- D. 浆细胞性包皮龟头炎
- E. 环状糜烂性包皮龟头炎

**正确答案：C**

13、单选 患者，女，30岁。发热3周伴皮疹。体温呈弛张热，中毒症状轻，抗生素治疗2周无效。非甾体消炎药及糖皮质激素退热效果佳。发热时皮疹呈水肿性红斑样，伴有四肢关节酸痛，热退时皮疹不明显。体格检查：体温39.6℃，一般情况尚可，颌下、腋下数个蚕豆大小淋巴结，活动。心肺无异常。面及躯干见散在水肿性红斑。实验室检查：WBC $21.3 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞占82.3%；RBC $300 \times 10^{12}/L$ ，Hb90g/L；尿及大便常规检查正常；ESR42mm/h；血培养3次均阴性；血抗ANA抗体全套阴性；骨髓穿刺细胞学检查为增生性骨髓象；骨髓细菌培养阴性，肥达反应阴性；淋巴结病理为反应性增生。诊断该病临床上需要做的检查是（）。

- A. 血培养及骨髓培养
- B. 骨髓细胞学检查
- C. 淋巴结穿刺细胞学或活切病理检查
- D. 外周血抗ANA抗体检测
- E. 以上检查均需要做

**正确答案：E**

14、单选 患者，男，36岁。面、手部皮疹1年，1年前冬季开始出现皮疹，皮疹轻度痒，日晒后加重，不伴有其他症状。体格检查：一般情况尚可，系统检查无异常。颧、鼻、外耳、手背部见暗红色斑块，表面覆黏着性鳞屑，皮损中央萎缩，毛细血管扩张，境界清楚，下唇有类似病损。实验室检查：血、尿常规正常；肝功能正常；血抗ANA抗体阳性，滴度1:100。该患者最可能的诊断为（）。

- A. 多形红斑
- B. 冻疮
- C. 盘状红斑狼疮

- D. 扁平苔藓
- E. 系统性红斑狼疮

**正确答案：C**

15、单选 患儿，女性，10岁。双手指多发皮疹伴局部瘙痒、破溃就诊。查体见双手背、手指部弥漫性肿胀，手指处多发暗紫红色水肿性红斑、局部糜烂渗液。该患者既往于冬季有类似皮疹发作史。该患者临床鉴别诊断中除外（）。

- A. 变应性皮肤血管炎
- B. 系统性红斑狼疮
- C. 急性湿疹
- D. 冻疮
- E. 多形红斑

**正确答案：D**

16、单选 痣细胞可分为下列几种，错误的是（）。

- A. 透明痣细胞
- B. 上皮样痣细胞
- C. 淋巴细胞样痣细胞
- D. 泡沫样痣细胞
- E. 纤维样痣细胞

**正确答案：D**

**参考解析：**痣细胞根据组织病理图像可分为透明痣细胞、上皮样痣细胞、淋巴细胞样痣细胞、纤维样痣细胞，没有泡沫样痣细胞。

17、单选 可引起固定型药疹的常见药物是（）。

- A. 维生素 E
- B. 氟康唑
- C. 环孢素 A
- D. 磺胺类
- E. 氯雷他定

**正确答案：D**

18、单选 女，20岁。因掌跖皮肤出现红斑、增厚 18年伴部分末端指（趾）节畸形、溃疡 8年余。系统查体未见明显异常。皮肤科检查：手部见弥漫性红斑、增厚伴手指畸形外观，中指伸侧有蜂窝状凹陷。双手拇指关节处见海星状角化。双足跖弥漫性角化增厚并有皲裂、糜烂伴恶臭，角化增厚边缘附黄色厚鳞屑，第一趾和第二趾可见甲变形、甲分离和混浊。组织病理示：表皮明显角化过度，颗粒层、棘层肥厚，表皮突延长，真皮可见少量炎性细胞浸润，皮下脂肪组织大致正常。引起该病的基因突变是（）。

- A. 角蛋白 1
- B. 连接蛋白 26
- C. 角蛋白 9

- D. 跨膜蛋白
- E. 桥粒斑蛋白

**正确答案：** B

19、单选 遗传性寻常型鱼鳞病的遗传方式是（ ）。

- A. 性连锁隐性遗传
- B. 常染色体显性遗传
- C. 常染色体隐性遗传
- D. 性连锁显性遗传
- E. 多基因遗传

**正确答案：** B

20、单选 有关疱疹样皮炎的临床特征的描述不正确的是（ ）。

- A. 多发于青年人
- B. 表现为疱壁厚、易破的大疱
- C. 好发于四肢伸侧
- D. 尼氏征阴性
- E. 口腔黏膜损害少

**正确答案：** B

**参考解析：** 疱疹样皮炎疱壁厚、不易破的大疱，尼氏征阴性；口腔黏膜一般不受累；多见于中青年。故选 B。

21、单选 患者，女，28岁。白带增多5天，伴有外阴阴道瘙痒。其丈夫在1周前有不洁性交史。体格检查：外阴阴道弥漫性潮红，阴道内见较多豆腐渣样分泌物，宫颈口见大量黄色脓性分泌物。该患者诊断应首先考虑（ ）。

- A. 急性淋病
- B. 非淋菌性尿道炎
- C. 外阴阴道念珠菌病
- D. 急性淋病合并外阴阴道念珠菌病
- E. 阴道毛滴虫病

**正确答案：** D

22、单选 患者，男性，30岁。颈项、双侧肘关节伸侧皮疹伴阵发性瘙痒反复发作4年。专科检查：颈后、双侧肘关节伸侧见扁平隆起性斑丘疹，大小不等，表面粗糙，部分苔藓化。皮损局限。该病最常见的鉴别诊断是（ ）。

- A. 扁平苔藓
- B. 慢性湿疹
- C. 原发性皮肤淀粉样变
- D. 局限性瘙痒症
- E. 慢性单纯性苔藓

**正确答案：** B

23、单选 患者，男，20岁。龟头新生物半年。体格检查：龟头边缘见较多环形排列的淡红色小丘疹。既往有不洁性交史。该患者诊断应首先考虑（）。

- A. 尖锐湿疣
- B. 阴茎珍珠状丘疹
- C. 梅毒
- D. 传染性软疣
- E. 皮脂腺异位症

**正确答案：**B

24、单选 天疱疮患者皮损中可见表皮细胞间失去粘连而呈松解状态，出现表皮内裂隙或水疱，这种皮肤组织病理学变化称为（）。

- A. 棘层肥厚
- B. 表皮水肿
- C. 微脓肿
- D. 棘层松解
- E. 基底细胞液化变性

**正确答案：**D

**参考解析：**棘层松解指表皮细胞间失去粘连而呈松解状态，出现表皮内裂隙或水疱，如天疱疮。

25、单选 患者，女性，32岁。全身泛发性风团3个月，难自行消退，触之有浸润感，皮损消退后遗留色素沉着，自觉局部有烧灼感，伴有不规则发热、关节疼痛，血常规提示WBC $9 \times 10^9/L$ 、N92%、L7%、PLT $230 \times 10^9/L$ 。ESR42mm/h，血清C3、C4低于正常水平。如此病持续发展，迁延不愈，最容易累及的脏器是（）。

- A. 心
- B. 肝
- C. 肺
- D. 肾
- E. 脑

**正确答案：**D

26、单选 患者，男性，20岁。主诉面部皮疹反复发作4年余，时轻时重。查体：面部油脂分泌较多，可见红色丘疹、粉刺、脓疱、结节，凹陷性瘢痕。最可能的诊断是（）。

- A. 痤疮
- B. 脂溢性皮炎
- C. 酒渣鼻
- D. 口周皮炎
- E. 毛囊炎

**正确答案：**A

27、单选 患者，男性，34岁。因全身红斑，继发水疱和大疱1周入院。皮疹发生前2个月车祸伤致外伤性癫痫，口服卡马西平2周。T38.9℃，血压110/76mmHg，心率108次/分。专科检查：面、颈、躯干和四肢大片状红斑、丘疹，并见密集分布于躯干和四肢的水疱和大疱，并见部分血疱。尼氏征阳性。眼结膜、口腔黏膜、肛门和外生殖器黏膜见糜烂，阴囊糜烂渗出明显。该病的治疗中，除积极应用糖皮质激素外，应加强支持、对症治疗。关于激素的起始量的使用原则是（）。

- A. 小剂量起始
- B. 中等剂量起始
- C. 大剂量起始
- D. 冲击剂量起始
- E. 以上都不正确，应该遵循个体化治疗原则

**正确答案：C**

28、单选 药物引起的红斑狼疮，其皮损主要表现为（）。

- A. 蝶形红斑
- B. 慢性荨麻疹
- C. 光敏感
- D. 血管炎
- E. 盘状红斑狼疮皮损

**正确答案：D**

29、单选 患者，男性，25岁。面部、躯干部起白斑1个月，无明显诱因。其父亲曾有同样病史。查体：面部、躯干部可见大小不等不规则的色素脱失斑，白斑周围有色素沉着。该病的发病机制可能是（）。

- A. 遗传因素
- B. 免疫功能异常
- C. 神经精神因素
- D. 内分泌紊乱
- E. 以上因素均可能参与该病的发生

**正确答案：E**

30、单选 患者，男，20岁。龟头新生物半年。体格检查：龟头边缘见较多环形排列的淡红色小丘疹。既往有不洁性交史。该患者处理上应采取的下列方法比较合适的是（）。

- A. PUVA
- B. UVB
- C. 阿昔洛韦乳膏局部外用
- D. 冷冻
- E. 不需要任何治疗

**正确答案：E**

31、单选 患者，女性，17岁。右侧面部起皮疹3年。3年前无明显诱因下于右侧眼睛周围出现褐青色斑，逐渐扩大。查体：右侧上下眼睑、额头部、颧部青灰色斑片，右侧巩膜轻度变蓝。最可能的诊断是（）。

- A. 黄褐斑
- B. 蓝痣
- C. 太田痣
- D. 咖啡斑
- E. 蒙古斑

**正确答案：**C

32、单选 患者女，32岁。小阴唇内侧密集小丘疹，表面光滑，不融合，呈“鱼子状”，自觉症状缺如，醋酸白试验（-），应诊断为（）。

- A. 尖锐湿疣
- B. 扁平湿疣
- C. 生殖器疱疹
- D. 女阴假性湿疣
- E. 鳞癌

**正确答案：**D

**参考解析：**女性假性湿疣表现为小阴唇内侧密集小丘疹，呈鱼子状，无自觉症状，醋酸白试验阴性。

33、单选 患者，女，30岁。白带增多伴阴道瘙痒3天。体格检查：阴道壁充血明显，表面覆有较多大量豆腐渣样分泌物，宫颈口见少量浆液性分泌物。该患者处理上采取的下列方法比较合适的是（）。

- A. 头孢曲松钠 1g，静脉滴注一次
- B. 阿奇霉素 1g，一次性顿服
- C. 米诺环素 100mg，每日2次，连服1周
- D. 甲硝唑 500mg，每日2次，连服1周
- E. 伊曲康唑 200mg，每日2次，服用1天；联合咪康唑阴道栓剂 400mg，每晚一次，连续3天

**正确答案：**E

34、单选 尖锐湿疣在诊断时应依据下列项目，但是不包括（）。

- A. 婚外性接触史或配偶感染史
- B. 生殖器或肛门部位单个或多个乳头状赘生物，表面粗糙
- C. 血液病毒抗体检测
- D. 必要时组织病理检查
- E. 醋酸白试验阳性

**正确答案：**C

**参考解析：**尖锐湿疣在诊断时不依据血液病毒抗体检测。

35、单选 关于点滴状副银屑病下列正确的是（）。



A. 自觉剧烈瘙痒

- B. 病程缓慢，一般数月或1年可自愈
- C. 皮损有浸润性斑块，厚积鳞屑
- D. 老年人多见
- E. 有点状出血现象

**正确答案：**B

36、单选 患者，女性，20岁。反复头面、四肢皮疹伴痒2个月余，加重3天。患者反复于头面、四肢出现红斑、丘疹、丘疱疹等皮疹，自用激素类药膏外涂后可减轻，但易反复。3天前饮酒后皮疹再次加重伴剧烈瘙痒。查体：头面、四肢、手等部位对称性红斑、丘疹、丘疱疹、抓痕，耳垂、手部大量渗出。根据患者的临床表现，最可能的诊断是（）。

- A. 急性湿疹
- B. 自身敏感性皮炎
- C. 传染性湿疹样皮炎
- D. 异位性皮炎
- E. 湿疹样皮炎

**正确答案：**A

37、单选 患者，男性。右腰部红斑、大疱1天。患者5天前因右侧腰痛开始局部贴敷活血止痛膏，2天前局部出现红斑，伴瘙痒感，今日红斑基础上出现水疱。查体：右腰部见一长方形红斑，边界清楚，红斑基础上见一枚直径约2cm张力性大疱，疱壁紧张。为进一步判明病因可采取的检查方法是（）。

- A. 斑贴试验
- B. 狼疮带试验
- C. 疱液培养
- D. 真菌直检
- E. 过敏原检查

**正确答案：**A

38、单选 关于接触性皮炎正确的是（）。

- A. 具有自限性
- B. 愈后不留色素沉着
- C. 无再发
- D. 均在较高浓度时才致病
- E. 无水疱形成

**正确答案：**A

**参考解析：**接触性皮炎分为原发性刺激反应和接触性致敏反应，有些物质在低浓度时是致敏物质，在高浓度时是刺激物和毒性物质。接触性皮炎有自限性，愈后可留色素沉着，有不同的临床表现，可有水疱发生。

39、单选 儿童口服苯海拉明，剂量按照每次每公斤体重（）。

- A. 0.25mg

- B. 1mg
- C. 1.5mg
- D. 2mg
- E. 2.5mg

**正确答案：**B

40、单选 有关 Reiter 综合征，不正确的是（）。

- A. 是男性非淋菌性尿道炎的一种常见的并发症
- B. 除非淋菌性尿道炎外，还有关节炎和结膜炎
- C. 一般发生在尿道炎后 1 周左右
- D. 患者关节液中可分离到衣原体
- E. 患者关节液中分离到支原体

**正确答案：**C

**参考解析：**尿道炎、结膜炎和关节炎三联症可以同时出现，亦可以先后数月甚至数年才出现。

41、单选 患者，女性。反复手掌处皮疹数年伴痒，每于夏季加重，冬季缓解，病程中不伴有甲损害及脓疱发生。查体：双手掌对称性角化、脱屑、肥厚，边界不清。排除真菌感染，患者最可能的诊断是（）。

- A. 掌跖脓疱病
- B. 光化性皮炎
- C. 慢性湿疹
- D. 胼胝
- E. 掌跖角化病

**正确答案：**C

42、单选 患儿，女，10 岁。主因下唇中部唇红，干燥脱屑，结痂，经久不愈。自觉干燥疼痛，与季节无关。家长述患儿爱舔口唇。最可能的诊断是（）。

- A. 光化性唇炎
- B. 接触性唇炎
- C. 剥脱性唇炎
- D. 肉芽性唇炎
- E. 腺性唇炎

**正确答案：**C

43、单选 先天性梅毒是指（）。

- A. 生产时由阴道病损感染
- B. 母亲哺乳时感染
- C. 子宫内感染
- D. 生产时由医药感染
- E. 生产时手术过程感染

**正确答案：C**

44、单选 天疱疮的治疗首选（）。

- A. 糖皮质激素
- B. 氨苯砞
- C. 免疫抑制剂
- D. 伊曲康唑
- E. 少量多次输血

**正确答案：A**

45、单选 早期梅毒（包括一期、二期及早期潜伏梅毒）推荐普鲁卡因青霉素G治疗总量（一疗程）应是（）。

- A. 1500 万单位
- B. 600 万单位
- C. 800 万~1200 万单位
- D. 1200 万~1800 万单位
- E. 2400 万单位

**正确答案：C**

46、单选 下列关于尿布皮炎错误的是（）。

- A. 粪便中的细菌分解湿尿布上的尿而产生的氨刺激发生
- B. 发生于1~4个月的婴儿
- C. 尿布接触部位的红斑、水肿、丘疹、丘疱疹、糜烂，严重者可发生浅溃疡
- D. 勤用肥皂和热水清洗
- E. 需与念珠菌性皮炎鉴别

**正确答案：D**

47、单选 患者，女性，38岁。躯干、四肢反复皮疹3年。无全身不适，偶痒。皮疹初发时呈绿豆至甲盖大小，后渐扩大，渐呈周边隆起的暗红斑。皮疹常持续数天或数周。专科检查：躯干和四肢见散在分布的暗红色斑疹，大小不等。少许皮疹呈同心环状。根据临床表现和专科检查结果，该患者最可能的诊断是（）。

- A. 多形红斑
- B. 离心性环状红斑
- C. 结核样型麻风
- D. 亚急性环状红斑狼疮
- E. 体癣

**正确答案：B**

48、单选 男，22岁。前额、胸背部起皮疹2年，丘疹中央为明显扩大的毛囊口，可挤出黄白色内容物。最可能的诊断是（）。

- A. 酒渣鼻
- B. 玫瑰糠疹

- C. 痤疮
- D. 花斑癣
- E. 痤疮样药疹

**正确答案：**C

49、单选 草莓状血管瘤开始自然消退的时间为（）。

- A. 半岁以后
- B. 1 岁以后
- C. 1.5 岁以后
- D. 2 岁以后
- E. 3 岁以后

**正确答案：**B

50、单选 关于重症多形红斑，下列正确的是（）。

- A. 低热
- B. 黏膜损害
- C. 蛋白尿
- D. 无肝功能异常
- E. 心电图异常

**正确答案：**B

**参考解析：**通过临床观察重症多形红斑除皮肤黏膜损害外，一般引起高热、血液系统损害和肝损害比较常见，但是很少引起肾损害，也无心电图异常。

51、单选 下列关于黑毛舌的临床特征，描述不正确的是（）。

- A. 黑毛舌常发生在丝状乳头最稠密的人字沟前方
- B. 早期在舌中央的两侧出现两条长形的病灶，逐渐向前后蔓延，但不累及舌缘
- C. 多半发生于舌背的中央，愈近边缘时其染色愈深，愈近中央时染色愈浅
- D. 有时可见舌面变黑不长毛的情况，常见于长期使用抗生素而继发真菌生长者
- E. 舌面变黑不长毛的患者，除口苦或口干外，一般无自觉症状

**正确答案：**C

**参考解析：**黑毛舌多半发生于舌背的中央，愈近中央时其染色愈深，愈近边缘时染色愈浅。

52、单选 患者，男性，19 岁。因“腹泻 1 天余，口唇部皮疹半天”就诊。患者 1 天前出现腹泻、低热，自行口服诺氟沙星、泻痢停，半天前口唇部觉瘙痒，随即出现红色皮疹，追问患者，多年前有磺胺类药物过敏史。专科检查：下唇皮肤黏膜交界处见一枚指甲大水肿性红斑，边界清楚。既往药物过敏史者，再次应用同类药物的发病时间为（）。

- A. 6 小时以内
- B. 12 小时以内
- C. 24 小时以内
- D. 36 小时以内

E. 48 小时以内

**正确答案：C**

53、单选 皮脂分泌适度，皮肤滋润、富有弹性的是（）。

- A. 油性皮肤
- B. 干性皮肤
- C. 混合性皮肤
- D. 中性皮肤
- E. 敏感性皮肤

**正确答案：D**

54、单选 维生素 B2 缺乏症（又称核黄素缺乏病），何部位皮肤损害表现最为突出（）。

- A. 舌炎
- B. 阴囊炎
- C. 唇炎
- D. 口角炎
- E. 脂溢性皮炎

**正确答案：B**

55、单选 患者，女，34 岁。四肢反复起水疱伴瘙痒 2 年，身体易受摩擦部位易发生水疱。体格检查：四肢末端、肘膝关节伸侧见绿豆大小水疱，基底不红，疱壁厚，尼氏征（-），皮损愈合处见瘢痕。皮损组织病理示：表皮下水疱，疱内可见中性粒细胞浸润。该病 IgG 沉积于（）。

- A. 表皮细胞间网状沉积
- B. 表真皮连接处呈带状沉积
- C. 表真皮连接处，偏真皮侧线状沉积
- D. 表皮真皮连接处，偏表皮侧线状沉积
- E. 真皮乳头部颗粒状沉积

**正确答案：C**

56、单选 患者，男性，72 岁。全身反复瘙痒 8 个月，伴睡眠欠佳。查体：全身皮肤黏膜无黄染，未见明显风团、结节和丘疹，躯干见散在抓痕。该患者最具可能的诊断是（）。

- A. 全身性瘙痒症
- B. 皮肤干燥症
- C. 慢性荨麻疹
- D. 疥疮
- E. 皮肤病疑病症

**正确答案：A**

57、单选 患者，女性，40岁。右足趾部色素斑35年，糜烂、渗出2个月。患者5岁时即发现其右足趾部有一针尖大小的黑点，随年龄逐渐长大至直径为5mm的色素斑。2个月前，患者干农活时，不慎扎破脚，正好为色素斑处，外用抗生素软膏，创面不愈合，且见色素斑扩大。无其他系统性疾病史。查体：右足趾前部有一直径2cm大小圆形糜烂面，表面少量渗液，中央有一大致呈圆形、直径约1cm的黑色斑；未触及浅表淋巴结肿大。本病例应首先考虑的诊断为（）。

- A. 色素痣继发感染
- B. 色素型基底细胞上皮瘤
- C. 鳞状细胞癌合并色素痣
- D. 创伤性湿疹合并色素痣
- E. 色素痣恶变

**正确答案：**E

58、单选 我国规定统计上报的性传播疾病不包括（）。

- A. 软下疳
- B. 梅毒
- C. 淋病
- D. 艾滋病
- E. 滴虫性阴道炎

**正确答案：**E

**参考解析：**我国规定统计上报的性传播疾病不包括滴虫性阴道炎。

59、单选 患者，女性，40岁。面部、上肢等部位散在分布暗红色的坚韧丘疹、结节，表面光滑、境界清楚，组织病理学示：真皮内上皮样细胞肉芽肿，可见上皮样细胞裸结节，无干酪样坏死。该患者诊断应首先考虑（）。

- A. 环状肉芽肿
- B. 异物肉芽肿
- C. 结节病
- D. 皮肤纤维瘤
- E. 麻风病

**正确答案：**C

60、单选 患者，男性，34岁。因全身红斑，继发水疱和大疱1周入院。皮疹发生前2个月车祸伤致外伤性癫痫，口服卡马西平2周。T38.9℃，血压110/76mmHg，心率108次/分。专科检查：面、颈、躯干和四肢大片状红斑、丘疹，并见密集分布于躯干和四肢的水疱和大疱，并见部分血疱。尼氏征阳性。眼结膜、口腔黏膜、肛门和外生殖器黏膜见糜烂，阴囊糜烂渗出明显。应该注意该病常伴有内脏的损害，其中最常见的是（）。

- A. 继发性肺部感染
- B. 肝脏损害

- C. 心脏损害
- D. 肾脏损害



E. 胃肠道损害

**正确答案：** B

61、单选 患者女，23岁，未婚，有性生活史。发现外阴赘生物7天。无痒，无痛。查体：外阴，阴道及宫颈可见多数淡红色的菜花状赘生物，触之易出血。阴道中量黄色分泌物。本病最可能的诊断是（）。

- A. 尖锐湿疣
- B. 扁平湿疣
- C. 生殖器鲍温样丘疹病
- D. 假性湿疣
- E. 宫颈癌

**正确答案：** A

62、单选 “皮肤咖啡牛奶色斑”可见于（）。

- A. 玫瑰糠疹
- B. 神经纤维瘤病
- C. 恶性黑素瘤
- D. 太田痣
- E. 皮内痣

**正确答案：** B

63、单选 有关臭汗症，下列不正确的是（）。

- A. 小汗腺分泌引起的臭汗症是皮肤表面的角蛋白、脂质因浸渍可被寄生菌分解而产生
- B. 可为全身性臭汗症
- C. 食用大蒜、生葱等后某些成分可由小汗腺随汗液排出而产生臭味
- D. 足臭受性激素的影响
- E. 可为局部性臭汗症

**正确答案：** D

64、单选 尖锐湿疣（）。

- A. 玻片压诊法
- B. 皮肤划痕试验
- C. Wood灯检查
- D. 醋酸白试验
- E. 真菌镜检

**正确答案：** D

65、单选 患者，男性。平素体健，半个月前因手工制作时出现左手食指外伤，伤口愈合后出现外伤部位一肿块，呈棕红色，且逐渐增大，触压有疼痛感，质软，破溃后出血明显。该病的治疗方案最佳为（）。

- A. 手术切除+组织病理
- B. 激光

- C. 电凝
- D. 放射
- E. 无须治疗，临床观察

**正确答案：**A

66、单选 尖锐湿疣好发于（）。

- A. 足跖部
- B. 甲缘处
- C. 头面部
- D. 双手背
- E. 皮肤与黏膜交界处

**正确答案：**E

67、单选 患者，女性。系口腔溃疡3个月余，双侧小阴唇出现对吻性溃疡，溃疡呈椭圆形，疼痛明显皮损境界清楚，中心淡黄色坏死基底，周围为鲜红色晕。双侧双下肢、躯干部见散在的毛囊炎样皮损，部分痤疮样改变。实验室检查提示血常规、尿常规正常。ESR34mm/h。结合其病史特点，该患者的诊断为（）。

- A. Behcet 病
- B. Wegener 肉芽肿
- C. SLE
- D. 坏疽性脓皮病
- E. Sweet 综合征

**正确答案：**A

68、单选 关于跖疣的特征，错误的是（）。

- A. 是发生于足跖部的扁平疣
- B. 皮疹可一个或多个
- C. 皮疹表面粗糙不平，质地硬
- D. 自觉明显触压痛
- E. 病程慢性，可自然消退

**正确答案：**A

69、单选 硬肿病与硬皮病的鉴别错误的是（）。

- A. 前者初发部位颈部，躯干；后者以面部及四肢远端为多
- B. 前者皮肤色泽正常或棕黄或带苍白；后者增生或杂以色素减退斑
- C. 前者无毛细血管扩张性红斑；后者则较多见
- D. 前者表皮正常；后者萎缩
- E. 前者皮损炎症细胞浸润较多见；而后者较少见

**正确答案：**E

70、单选 下列梅毒螺旋体检查方法中正确的是（）。

- A. 暗视野法

- B. 培养
- C. 涂片做 PAS 染色
- D. 苛性钾法
- E. 荧光染色

**正确答案：**A

71、单选 与淋球菌致病性不相关的是（）。

- A. 菌毛的黏附分子
- B. 内毒素
- C. 外膜脂多糖
- D. 荚膜
- E. 补体

**正确答案：**D

72、单选 皮肤黄瘤病的临床分型中不包括（）。

- A. 结节性黄瘤
- B. 发疹性黄瘤
- C. 扁平黄瘤
- D. 幼年黄色肉芽肿
- E. 播散性黄瘤

**正确答案：**D

73、单选 患者，男，40岁。已婚，健康检查发现血 RPR 阴性，TPPA 阳性。该患者采取的下列方法比较适当的是（）。

- A. 不需要任何处理
- B. 苄星青霉素 240 万 U，肌内注射一次
- C. 阿奇霉素 1.0g，一次性顿服
- D. 通知患者与其配偶性生活时不需要使用安全套
- E. 2~3 周复查血 RPR+TPPA

**正确答案：**E

74、单选 患者，女性，20岁。因“全身皮疹伴表皮破溃 2 天”就诊。患者 1 周前出现上呼吸道感染，多次给予多种抗生素及退热药物，2 天前躯干部出现红色点状皮疹，迅速增多、增大，伴大小不等水疱、破溃。查体：T37.6℃，口腔黏膜轻度糜烂，躯干、四肢弥漫性暗红色斑片，伴大小不等松弛性水疱、大疱，尼氏征（+），部分水疱破溃见表浅糜烂面，水疱及破溃面积约占体表面积的 40%。下列方案不适用于该患者的是（）。

- A. 丙种球蛋白
- B. 血浆
- C. 糖皮质激素
- D. 甲氨蝶呤
- E. 抗感染

**正确答案：D**

75、单选 以下有关黑变病的描述正确的是（）。

- A. 好发于青年女性
- B. 分布于面部的灰褐色色素沉着斑
- C. 病程分为炎症期、色素沉着期、恢复期
- D. 皮损表面无糠秕状鳞屑
- E. 边界清楚

**正确答案：B**

**参考解析：**黑变病多见于中年妇女，皮损分布于额、颧部、耳后、颈侧、臂部及其他曝光部位，可为淡棕色、铜红色、灰褐色或紫褐色，边界不清，逐渐扩展，表面覆以薄层粉状鳞屑。病程分为炎症期、色素沉着期、萎缩期。

76、单选 与毛周角化症不符的是（）。

- A. 常见于青少年
- B. 冬重夏轻
- C. 与毛孔一致的坚硬角化性丘疹
- D. 发病与维生素 A 缺乏有关
- E. 好发于上臂、股外侧和臀部

**正确答案：D**

77、单选 患者，女性，45岁。反复外阴瘙痒，伴睡眠欠佳3年余。查体：全身皮肤黏膜无黄染，未见风团、结节。两侧大阴唇和小阴唇皮肤和黏膜略粗糙肥厚，轻度苔藓化。该病的常见发病原因不包括（）。

- A. 接触化纤类衣物
- B. 阴道炎、宫颈癌等妇科病
- C. 内分泌失调、性激素水平下降
- D. 感染
- E. 情绪不稳定、长期失眠

**正确答案：D**

78、单选 下列组织病理特征性改变有表皮内 Paget 细胞的疾病是（）。

- A. 基底细胞癌
- B. 鲍温病
- C. 蕈样肉芽肿
- D. 黏膜白斑
- E. 湿疹样癌

**正确答案：E**

79、单选 一般通过输血而感染 HIV 的患者出现血清抗体阳性的时间为（）。

- A. 1 周内
- B. 2~8 周
- C. 3 个月

D. 6 个月

E. 1 年

**正确答案：B**

80、单选 患者，女性，45 岁。面、颈、四肢出现结节样皮损 1 个月，夏季发作。皮损呈扁平隆起，边界清楚，表面似有假水疱样损害，触之有结节感，颜色深红，压之疼痛明显。病程中伴发热、关节疼痛。尿常规检查提示蛋白（++）、隐血（++）、见颗粒管型。血常规提示 WBC $9 \times 10^9/L$ 、N92%、L7%、PLT $230 \times 10^9/L$ 。针对此病最具有特征性的检查手段为（）。

A. 血常规

B. 尿常规

C. 24 小时尿蛋白定量

D. 皮损组织病理检查

E. 双肾 B 超

**正确答案：D**

81、单选 与关节病型银屑病有关的 HLA 抗原是（）。

A. HLA-B17

B. HLA-B13

C. HLA-B27

D. HLA-CW6

E. HLA-BW16

**正确答案：C**

82、单选 患儿男性，2 岁。生后 2 月开始出现一侧阴囊内肿物，活动后略大，平卧后略小，但不能完全消失。该肿物透光试验阳性。肿物侧睾丸触诊不清 该病可能的诊断是（）

A. 腹股沟斜疝

B. 睾丸鞘膜积液

C. 阴囊肿瘤

D. 可回缩性睾丸

E. 以上都不是

**正确答案：B**

83、单选 含有液体或分泌物及细胞成分的腔隙性损害（）。

A. 风团

B. 结节

C. 斑疹

D. 水疱

E. 囊肿

**正确答案：E**

84、单选 患者，男性，50岁。主因口唇部皮疹4周伴刺痒就诊。患者既往夏季曾发生同样皮损，秋冬季好转，无关节痛、脱发、口腔溃疡等不适，查体：上下唇黏膜轻度增厚，角化变硬、皴裂。处理原则是（）。

- A. 3%硼酸湿敷
- B. 外用红霉素软膏
- C. 外用糖皮质激素乳膏
- D. 口服抗生素
- E. 外用莫匹罗星乳膏

**正确答案：C**

85、单选 患者，女性，43岁。面部、肩背部、双侧前臂皮肤肿胀发硬2个月。发病前无发热、咽痛病史。病程中无关节痛，无肌肉酸痛，无张口困难和呼吸受限。既往体健，无糖尿病病史。有躯干、四肢“湿疹”1个月，予“皿治林、去炎松尿素霜”治疗后皮疹消退。家族中无类似病史。皮肤科专科检查：面部、肩背部、双侧前臂皮肤明显肿胀发硬，肿胀为非凹陷性，与周围皮肤界限不清。皮损表面为正常肤色，无萎缩和溃疡，捏压皮肤时可发皱。肩背部对称性、充血性红斑，散在抓痕、结痂。结合其病史特点，该患者的诊断为（）。

- A. 系统性硬皮病
- B. 湿疹
- C. 硬肿病
- D. 皮炎
- E. 淋巴水肿

**正确答案：C**

86、单选 患者，男，25岁。前胸部暗红色丘疹，数年内逐渐扩大连接为片状斑块，暗红色，质地坚韧，表面光滑无毛，病程慢性，偶有痛痒感。本病与肥厚性瘢痕的主要鉴别要点为（）。

- A. 皮损是否柔软
- B. 皮损范围是否超过原有损害范围
- C. 皮损表面是否有毛发生长
- D. 是否有自觉症状
- E. 皮损表面是否光滑

**正确答案：B**

87、单选 下列关于腺性唇炎临床表现的说法，错误的是（）。

- A. 该病以唇部异位唾液腺的增大和继发性炎症性改变为其特征，好发于下唇
- B. 多数患者自觉唇部肿胀，绷紧感，有时有触痛和感觉过敏
- C. 单纯型腺性唇炎为后天性，病情较轻，多数无自觉症状
- D. 化脓型腺性唇炎炎症反应较明显，被认为是癌前期病变
- E. 化脓型腺性唇炎多为后天性，如用致敏的牙膏，漱口水，或外伤所致

**正确答案：E**

参考解析：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/856101113232010125>